

MİYASTENİYA GRAVIS TANILI OLGULARDA HLA TIPLMESİ*

**Mehmet Ali AKALIN, Ayşe ALTINTAŞ, Erkan YILMAZ,
Gökhan ERKOL, Ergun ERDOĞAN, Perihan BASLO**

- ▼ [Giriş](#)
- ▼ [Yöntem-Gereç](#)
- ▼ [Bulgular](#)
- ▼ [Tartışma](#)
- ▼ [Özet](#)
- ▼ [Kaynaklar](#)

Background and Design.- The aim of this study was to investigate HLA phenotype frequencies and associations in myasthenia gravis patients considering sex, antibody titer, thymic pathology, age of onset, clinical type and try to understand immunogenetic basis for myasthenia gravis in Turkey. HLA phenotypes were studied in 30 patients (18 female, 12 male) with myasthenia gravis (MG) and 214 healthy controls, using standard microcytotoxicity assay.

Results.- When compared with the control group, all MG patients showed significant increase in HLA-B38(16) (odds ratio (OR): 8.08 and p< 0.005), HLA-DR1 (OR:3.31 and p< 0.05) HLA-DQ2 (OR:14.07, p<0.005), DQ4 (OR:2.47, p<0.05) and DQ7(3) (OR: 3.35, p<0.005), but these results lost significance when corrected p value used. No association with HLA phenotypes was found considering level of antibody titer, thymic pathologies, and age of onset.

Conclusion.- These findings may provide some information for future studies on the immunogenetic basis of myasthenia gravis.

Akalın MA, Altıntaş A, Yılmaz E, Erkol G, Erdoğan E, Baslo P. HLA phenotypes in myasthenia gravis. Cerrahpaşa J Med 2000; 31 (3): 134-139.

GİRİŞ ▲

Miyasteniya gravis (MG), nöromüsküler bileşkenin en sık rastlanılan hastalığıdır. Olguların çoğu edinsel immüโนlojik bir bozukluk sonucu ortaya çıkar.¹ Edinsel MG, günümüzde en iyi tanımlanmış ve anlaşılmış olan otoimmün nörolojik hastalıktır.² MG'deki otoantijen, çizgili kas asetilkolin reseptörüdür.^{1,3} Otoimmün cevabının ortaya çıkmasında her ne kadar çevresel faktörlerin önemli bir tetkileyici rolü varsa da, gerek geniş popülasyon çalışmaları gerekse aileler ve ikizler üzerinde yapılan çalışmalar genetik faktörlerin de otoimmün hastalık gelişmesine yatkınlık oluşturduğunu göstermektedir.^{4,5} Bununla beraber diğer oto-immün hastalıklar gibi MG de kalitsal bir hastalık değildir. Ailevi MG edinsel MG'lerin ancak %2 ile 4'ünü oluşturmaktadır.⁶

Deney hayvanlarının sistemik veya bir organa spesifik otoimmün hastalıkları normal hayvanlara lenfoid doku veya bunların prekürsörlerinin aşlanması ile geçirilebilir.² Aynı şekilde otoimmün hastalık eğilimi olan deney hayvanlarına normal kemik iliği hücreleri nakledilerek hastalığın ortaya çıkması engellenemektedir.^{5,7} McDevitt ve arkadaşları 1970'lerde farenin taşıdığı major doku uyuşum kompleksi (major histocompatibility complex= MHC) tipi ile değişik antijenlere karşı geliştirdiği immün cevabının şiddeti arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu yolla farenin kendi (self) antijenlerine ya da yabancı (non-self) antijenlere yanıt verme kabiliyetinin kısmen de olsa MHC allellerinin aminoasit dizileri tarafından

belirlendiği anlaşılmıştır. Bugün, MHC allelini tanımlayan polimorfik yapıların, antijen peptid bağlanma bölgelerinde kümelendikleri bilinmektedir. Öyleyse, otoimmün hastalığa yatkınlıkta önemli rolü olan genetik faktörlerin araştırılmasında immün sistemle ilişkili genler ön plana çıkmaktadır.^{5,7,8}

Çalışmalar, MHC'nin (MHC insanda HLA olarak adlandırılmaktadır), populasyondaki genetik dağılımı ve fonksiyonları hakkında geniş bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. MHC sınıf I ve II molekülleri son derece polimorfik hücre yüzey glikoproteinleridir, immün cevaptaki temel fonksiyonları, kısa antijenik peptid parçalarını, antijen spesifik T hücrelerine görünürlük hale getirmek ve sunmaktr. Bu özellikleri nedeniyle bireyler arasındaki MHC allelik farklılıklarının organ allograft rejeksiyonlarını başlatan immüโนlojik süreçte kilit rolü oynadığı anlaşılmıştır.^{5,7} Daha sonra bu bölgede yerleşen genlerin fizyolojik rollerinin, allotransplantasyondaki fonksiyonlar ile sınırlı olmadığı gösterilmiştir.

HLA antijenlerinin hastalıklara yol açış mekanizmalarına ilişkin çeşitli teoriler öne sürülmektedir.⁹ Bunlar;

- 1- HLA antijenlerinin hastalığa yol açan etmene yapısal benzerlik göstermesi (HLA-B27, ankilozan spondilit)
- 2- HLA antijenleri tarafından kontrol edilen immün yanıt genlerinin aşırı ya da zayıf reaksiyon göstergeleri (HLA DR, multipl skleroz¹⁰)
- 3- HLA bölgesindeki proteinlerde defektler oluştu ya da bu proteinlerin yokluğu (HLA-A3, idiyopatik hemokromatozis)
- 4- HLA sınıf III bölgesindeki genlerle ilgili kompleman sisteminde varolan defektler (C2, C4 yetersizliği, sistemik lupus eritematozus)
- 5- İnsan farklılaşım genleri (Human differentiation genes)'in anormal allellerinin söz konusu olması (HLA-Dw7, testiküler teratokarsinom)
- 6- HLA sınıf II antijenlerinin anormal ekspresyonu
- 7- HLA antijenlerinin patojen için reseptör özelliği göstermesi

Türk toplumunda MG'lilerin taşıdıkları HLA antijenlerinin saptanmasına yönelik çalışmalar kısıtlıdır.^{11,12} Bu çalışmada MG ile HLA antijenleri arasındaki ilişkinin HLA antijenlerinin dağılımı, cins, hastalığın başlangıç yaşı, klinik tipi, tedaviye alınan yanıt, antikorların varlığı ve timik patolojiler açısından ülkemizdeki yönlendiriciliği değerlendirilecektir.

YÖNTEM VE GEREÇLER ▲

Çalışmamızda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kas Hastalıkları polikliniğinde izlenmekte olan miyastenia gravis tanısı konmuş 30 hasta [18 kadın (%60), 12 erkek (%40)] değerlendirilmiştir. Ortalama yaş 44.3'tür. Ortalama hastalık süresi 3.2 yıldır. Hastaların 7'si (%23.33) oküler miyastenik, 23'ü (%76.67) jeneralize miyasteniktir. Asetilkolin reseptör antikorları 23 hasta pozitif, 4 hasta negatif bulunmuş, 3 hasta bu yönden incelenmemiştir. Timus dokusu 3 hasta, timoma 1 hasta tespit edilmiştir (Tablo I).

Tablo I. Miyasteni Gravis'li Hastalara Ait Bilgiler

KADIN	18
ERKEK	12
OKÜLER	7
JENERALİZE	23
40 YAŞ<	15
40 YAŞ>	15
TİMUS VAR	3
TİMUS YOK	23
TİMOMA	1
BİLİNMEYEN	3
ANTİKOR VAR	23
ANTİKOR YOK	4
BİLİNMIYOR	3
ANTİKOLİNESTERAZ TEDAVİ	9
İMMÜNMODÜLATÖR TEDAVİ	14
BELLİ OLМАYAN	7

Transplantasyon donörü olan sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubunda 214 (127 kadın, 87 erkek) HLA sınıf I ve HLA sınıf II抗原larının dağılımı incelenmiştir. HLA-A, B, DR ve DQ gruplarına ilişkin test edilen alel sayısı sırasıyla 20, 29, 16 ve 7 olup toplam 72'dir. Her iki grupta da rastlanmayan抗原ler değerlendirmeye alınmamıştır (Tablo II).

Tablo II Test Edilen HLA Gruplarına Ait Alleller

A1	B5	B51(5)	DR1	DQ2
A10	B7	B52(5)	DR10	DQ3
A11	B8	B53	DR11	DQ4
A19	B12	B57(17)	DR11(5)	DQ6
A2	B13	B60(40)	DR12(5)	DQ6(1)
A23(9)	B14	B62(15)	DR13(6)	DQ7
A24(9)	B15	B63(15)	DR14(6)	DQ7(3)
A25(10)	B16	B65(14)	DR15(2)	
A26(10)	B17	B67	DR18(3)	
A28	B18		DR2	
A29(19)	B21		DR3	
A3	B22		DR4	
A30(19)	B27		DR5	
A31	B35		DR7	
A31(19)	B37		DR8	
A32	B38(16)		DR9	
A32(19)	B40			
A33(19)	B41			
A69	B44(12)			
A9	B50(21)			

Miyastenik hastalardaki HLA allellerinin dökümü Tablo III'de verilmiştir.

Tablo III. Myasthenia Gravisli Hastalara Ait HLA Dökümü

HLA	A1	A2	A3	A9	A10	A11	A19	A23 (9)	A24 (9)	A25 (10)	A28	A29 (19)	A30 (19)	A32 (19)
MG toplam n:30	9	12	4	2	3	5	5	2	7	2	3	1	1	1
MG kadın n:18	6	8	2	1	3	5	2	1	3	0	1	1	0	1
MG erkek n:12	3	4	2	1	0	0	3	1	4	2	2	0	1	0
HLA	A34 (10)	A66 (10)	A68 (28)	B5	B7	B8	B12	B14	B17	B18	B21	B22	B27	B35
MG toplam n:30	1	1	1	1	5	11	1	1	1	1	1	4	2	7
MG kadın n:18	0	1	1	1	2	7	0	1	0	1	1	2	1	5
MG erkek n:12	1	0	0	0	3	4	1	0	1	0	0	2	1	2
HLA	B38 (16)	B42	B44 (12)	B51 (5)	B52 (5)	B57 (17)	B60 (40)	B62 (5)	B62 (15)	B67	DR1	DR4	DR7	DR8
MG toplam n:30	4	1	4	9	1	1	1	1	2	1	7	11	2	2
MG kadın n:18	2	1	2	6	0	1	1	1	1	1	4	6	1	1
MG erkek n:12	2	0	2	4	1	0	0	0	1	0	3	5	1	1
HLA	DR9	DR10	DR11 (5)	DR12 (5)	DR13 (6)	DR14 (6)	DR1 5(2)	DR16 (3)	DQ2	DQ3	DQ4	DQ6 (1)	DQ7 (3)	
MG toplam n:30	1	6	12	2	3	4	9	2	6	2	19	14	20	
MG kadın n:18	0	4	6	2	1	3	6	2	2	1	18	6	14	
MG erkek n:12	1	1	6	0	2	1	3	0	3	1	6	8	6	

Klinik muayene ile MG ön tanısı konan hastalara EMG (repetitif stimülasyon ile miyastenik test), asetilkolin reseptör antikor düzey tayini, gereğinde prostigmin testi uygulanarak tanı kesinleştirilmiştir. Elektrofizyolojik inceleme Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji ABD EMG laboratuvarında, asetilkolin reseptör antikor düzey tayini İstanbul Tıp Fakültesi Nörofizyoloji Bilim Dalı laboratuvarında yapılmıştır. İlk başvuruda başka laboratuarlarda yapılmış antikor incelemeleri olanlar da çalışma kapsamına alınmıştır. Uygun tedavi ile en az bir ay izlendikten

sonra hastalara HLA doku tipi tayini yapılmıştır.

Hasta ve kontrol grubunun HLA doku tipi tayinlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi Doku Tipi Tayini laboratuvarında standart mikrositotoksisite yöntemi kullanılmıştır. Hasta ve kontrol grubunu oluşturan bireylerden alınan 20 cc heparinli kan örneği ficoll üzerine yayılıp, santrifüj edilerek lenfositler ayrılmış, Lymphokwik-MN* kullanılarak lenfosit dışındaki hücreler uzaklaştırılmış, T ve R lenfositlerin bir grubu sınıf I HLA doku tipi plajına ekilerek HLA-A ve B antijenlerinin tayininde kullanılmıştır. Kalan lenfositlerden lymphokwik B1 cell ve B2 CELL (one lambda-USA) kullanılarak B lenfositler ayrılmış bunlar da sınıf II HLA doku tipi plajına ekilerek, HLA-DR ve DQ抗原lerinin tayininde kullanılmıştır. Değerlendirme invert ışık mikroskobunda çukurlardaki ölü hücre oranlarına bakılarak yapılmıştır.

Kullanılan skorlama yöntemine göre; %0-10 skor 1: Negatif, %11-20 skor 2: Şüpheli pozitif, %21-50 skor 4: Zayıf pozitif, %51-80 skor 6: Pozitif, %81-100 skor 8: güçlü pozitif olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma sonuçlarının istatistikî değerlendirmesinde odds ratio ve uygun olgularda Fisher's exact test ve ki kare yöntemleri kullanılmıştır. Araştırılan parametrelerin çok sayıda olması nedeniyle her test için bulunan p değeri (düzeltmemiş p) test edilen toplam HLA antijen sayısı ile çarpılarak düzeltilmiş p değeri elde edilmiştir.

BULGULAR ▲

HLA-A lokus antijenlerinin tetkikinde HLA-A1 MG'li grupta sağlıklı kontrol grubuna göre daha sık saptanmış (odds ratio= OR:2.27), ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p>0.05$). Diğer HLA-A lokus antijenlerinin sıklığında MG'li grupta kontrol grubu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

HLA-B lokusunda HLA-B38(16) MG'li grupta kontrol grubuna göre 8 kat daha fazla rastlanmaktadır (OR:8.08). Bu bulgu istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0.05$), düzeltmiş p değeri kullanıldığında anlamlılık kaybolmaktadır. Diğer HLA-B antijenlerinin MG'li hastalardaki rastlanma sıklığı kontrol grubundan farklı değildir.

HLA-DR lokusunda DR1 (OR: 3.31, $p<0.05$) antijeni MG'li hastalarda istatistiksel olarak anlamlı sıklıkta bulunmuş, düzeltmiş p değeri kullanıldığından anlamlılık kaybolmuştur. Diğer HLA-DR antijenlerinin MG'li hastalardaki rastlanma sıklığı kontrol grubundan farklı değildir.

HLA-DQ lokusunda DQ2 (OR:14.07, $p<0.005$), DQ4 (OR:2.47, $p<0.05$), DQ7(3) (OR:3.35, $p<0.005$) antijenlerine MG'li hastalarda kontrol grubuna göre daha sık rastlanmakla beraber değerler düzeltildiğinde istatistik anlamlılık kalmamaktadır. (Tablo IV) .

**Tablo IV. Miyasteni Gravis Hastalarında Kontrol Grubuna
Göre Farklılık Gösteren HLA Sonuçları
(Tetkik edilen tüm HLA sonuçları yer almamaktadır)**

HLA	ODDS RATIO	RELATİF RİSK	p	Düzeltilmiş p değeri
A1	2.27	1.89	0.057	
B38(16)	8.08	7.13	0.009	
DR1	3.31	2.77	0.020	
DQ2	14.07	11.89		0.057
			0.0008	
DQ4	2.47	1.54	0.021	
DQ7(3)	3.35	1.78	0.002	

Oküler MG'li hastaların HLA alleleri ile jeneralize MG'li hastaların HLA alleleri karşılaştırıldığında HLA-A2 antijenine oküler MG'li hastalarda anlamlı ($p<0.008$) oranda daha sık (OR=17.00) rastlandığı görülmüş düzeltilmiş p değeri anlamlılığa çok yakın (0.057) olarak tespit edilmiştir. Aynı şekilde B44(12) de sık (OR=16.50) görülmekte ancak düzeltilmiş p değeri ile anlamlı olmadığı görülmektedir.

Sadece antikolinesteraz ilaç kullanan grup ($n=9$) ile bir immünmodülatör ilaç kullanan hastaların ($n=14$) HLA抗jenleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tedavisi bilinmeyen veya düzensiz ilaç kullanan 7 hasta değerlendirmeye alınmamıştır.

Cinsiyete, hastalığın başlangıç yaşına (40 yaşından önce ve sonra olmak üzere 2 grupta değerlendirilmiştir), antikorun pozitif olup olmamasına, timik patolojinin varlığına göre yapılan karşılaştırmalarda da anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

TARTIŞMA ▲

Yapılan çalışmalarda MG'ye yatkınlık ile HLA, Ig, ve TCR genleri arasındaki ilişkiler araştırılmış, bazı HLA alleleri dışında diğerleri ile ilişki kurulamamıştır.¹ HLA ile MG arasındaki ilişki ilk kez 1970'li yılların başlarında gösterilmiştir. İlk olarak HLA-B8 alleli sonra HLA-A1, DR3, ve DW3 ile ilişki bildirilmiştir. Timoma ile birlikte olan MG'de HLA DR15dw2'ye, penisilaminin neden olduğu MG'de DR1 ve Bw35'e daha sık rastlanmaktadır. HLA DQ tiplemesi ile yapılan bazı çalışmalarda MG'in HLA sınıf II bölgesi içindeki bazı gen alleleri ile ilişkisi kanıtlanmış ve HLA DR'ye göre HLA DQ ile daha yakın bir bağlantı olduğu gösterilmiştir.¹

Etnik gruplar arasında MG ile HLA ilişkisi farklılıklar göstermektedir. Afrika, Amerika ve Kafkas ırkından olanlarda HLA B8 önemli bir rol oynarken,^{13,14} Çinlilerde jeneralize MG HLA Bw46 ile ilişkilidir. Oküler MG Çinlilerde sık görülür ve DRw9 ile bağlantılıdır.¹⁵ Asya, Afrika ve Amerikalıarda DR3'ün MG ile ilişkisi yoktur.¹⁴

Bu çalışmalar MG'nin bazı HLA tipleri ile ilişkili olduğunu göstermekte, ancak HLA bağlantısının zayıf olması, etnik gruplar ve MG'in klinik tipleri arasında değişiklik göstermesi nedeniyle, MG'i özel bir HLA allele'ine bağlamak mümkün olmamaktadır.¹¹⁻¹⁸

Değişik ırklarda farklı bulgular elde edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmanın bulgularını literatürdeki verilerle karşılaştırmak olası değildir. Ancak miyasteni gravisle HLA-DQ gen alleleri arasında yakın bir bağlantı olduğunu gösteren önceki çalışmaların sonuçlarına benzer şekilde Türk toplumunda da DQ antijenine daha fazla rastlanmıştır. Yurdumuzda Bilgen ve ark. tarafından yapılan 56 hastalık benzer bir çalışmada HLA-A28 ve B8 kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, anlamlı olarak yüksek oranda bulunmuştur.¹¹ Bu çalışmaların istatistiksel değerlendirmelerinde düzeltilmemiş p değeri kullanılmıştır. Çalışmalarda saptanan farklı sonuçlar, hasta sayısının azlığından kaynaklanmış olabilir.

Bu çalışma sonucunda, HLA alleleri ile hastalık ve hastalığın özellikleri arasında istatistiksel olarak bir bağlantı kurulması mümkün olmamıştır. Doku tiplemesi ile miyasteni gravis hastalığına yaşınlık, hastalığın başlangıç yaşı, tipi, seyri, tedaviye yanıtı ve eşlik eden patolojilerle ilişkisinin ortaya konabilmesi bu tür çalışmalara alınan hasta sayısının, geniş toplumsal kesimleri kapsayacak şekilde, artırılması ile mümkün olabilecektir.

Bu bulgular miyastenia gravis hastalığının immünogenetik temelini anlamada ilerde yapılacak çalışmalara yardımcı olacaktır.

ÖZET ▲

Bu çalışma, miyastenia gravisi hastalarda; HLA抗原lerinin dağılımının araştırılması ve bu dağılımın hastanın cinsi, hastalığın başlangıç yaşı, klinik tipi, tedaviye yanıtı, hastada antikorların varlığı ve timik patolojiler açısından ülkemizdeki verilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. HLA fenotipleri 30 miyasteni hastasında (18 kadın, 12 erkek) ve 214 sağlıklı kontrolde mikrositotok-sisite yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında miyastenili hasta grubunda HLA-B38(16) (odds ratio(OR): 8.08, p< 0.05), HLA-DR1 (OR:3.31, p< 0.05) ve HLA-DQ2 (OR:3.35, p<0.005), HLA-DQ2 (OR:14.07, p<0.005), HLA-DQ4 (OR:2.47, p<0.05), HLA-DQ7(3) (OR:3.35, p<0.005) daha sık rastlandığı bulunmuş ancak düzeltilmiş p değeri kullanıldığından anlamlılık kaybolmuştur. Cinsiyete, hastalığın başlangıç yaşına, antikorun pozitif olup olmamasına, timik patolojinin varlığına göre yapılan karşılaştırmalarda anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgular miyastenia gravis hastalığının immünogenetik temelini anlamada ilerde yapılacak çalışmalara yardımcı olacaktır.

KAYNAKLAR ▲

- Conti-Fine BM, Protti MP, Bellone M, Howard JF. Myasthenia Gravis: The immunobiology of an autoimmune disease. RG Landes Comp, 1996.
- Burges J, Vincent A, Molenaar PC, Newsom-Davis J, Peers C, Wray D. Passive

- transfer of seronegative myasthenia gravis to mice. *Muscle Nerve* 1994; 17: 1393-1400.
3. Manfredi AA, Yuen MH, Moiola L, Protti MP, Conti-Tronconi BM. Human acetylcholine receptor presentation in myasthenia gravis. DR restriction of autoimmune T epitopes and binding of synthetic receptor sequences to DR molecules. *J Immunol* 1994; 152: 4165-4174.
 4. Leslie RD, Haws M. Twin studies in auto-immune disease. *Acta Genet Med Gemellol Roma* 1994; 43: 71-81 (Abstract)
 5. Robinson MA, Kindt TJ. Major histocompatibility complex antigens and genes. *Fundamental Immunology*. Ed. Paul WH. Second ed. New York, Raven Press Ltd. 1989; 489-539.
 6. Bergoffen J, Zmijewski CM, Fischbeck KH. Familial autoimmune myasthenia gravis. *Neurology* 1994; 44 (3 Pt 1): 551-554.
 7. Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS. Antigen processing and presentation to lymphocytes. *Cellular and molecular immunology*. Second ed. USA, WB Saunders Comp. 1994, 115-135.
 8. Olseneberg JR. Immunogenetics and heterogeneity in MS. *Ann Neurol*, 1996; 40: 557-558.
 9. Yilmaz E. Monoklonal HLA klas I doku tipi plakozum babbuk tayımlarında kullanılabilirliğinin araştırılması ve diğer konvansiyonel sistemlerle karşılaştırılması. Fen Bilimleri Doktora Tezi, 1996.
 10. Link J, Fredriksson S, Soderstrom M, Olsson T, Hojeberg B, Ljungdahl A, Link H. Organ-specific autoantigens induce transforming growth factor-beta mRNA expression in mononuclear cells in multiple sclerosis and myasthenia gravis. *Ann Neurol* 1994; 35: 197-203.
 11. Bilgen H, Özdemir C, Serderoglu P, Deymiser F, Sönmez G, Çoxin M. Myasthenia Gravis'te HLA antijenleri. 1. Nöroloji Kongre Kitabı 1988 (15-18 Ekim) Sayfa: 428-432.
 12. Sağduyu A. Miyastenia Gravisde HLA Tiplemesi. Bge Üniversitesi Nöroloji Uzmanlık Tezi, YÖK Tez Kataloğu Sayı: 17669
 13. Matsuki K, Juji T, Tokunaga K, Takemizawa M, Maeda H, Soda M, Nomura Y, Segawa M. HLA antigens in Japanese patients with myasthenia gravis. *J Clin Invest* 1990; 86: 392-329.
 14. Christiansen PT, Pollack MS, Garlepp MJ, et al. Myasthenia Gravis and HLA Antigens in American blacks and other races. *J Neuroimmunol* 1984; 7: 121-129.
 15. Hawkins BR, Ip MSM, Lam KSL, et al. HLA antigens and acetylcholine receptor antibody in the subclassification of myasthenia gravis in Hong Kong Chinese. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1986; 49: 316-319.
 16. Morita K, Morimachi J, Inoko H, Tsuji K, Arimori S. HLA class II antigens and DNA restriction fragment length polymorphism in myasthenia gravis in Japan. *Ann Neurol* 1991; 29: 168-174.
 17. Mantegazza R, Olseneberg JR, Beggi F, Antozzi C, Illeni MT, Pellegrini G, Cornello F, Steinmann L. Increased incidence of certain TCR and HLA genes associated with myasthenia gravis in Italians. *J Autoimmun*. 1990; 3: 431-440.
 18. Tola MR, Canetti LM, Casetta I, Granieri E, Conighi C, Quattrone R, Monetti VC, Paolino E, Govoni V, Pasocrella R, et al. Immunogenetic heterogeneity and associated autoimmune disorders in myasthenia gravis: a population-based survey in the province of Ferrara, northern Italy. *Acta Neurol Scand* 1994; 90: 318-323.

- Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonuına desteklenmiştir. Proje No: G-799 (791/131295); *Arahtar Kelimeler:* İnsan leukosit antijeni (HLA), Miyastenia Gravis; *Key Words:* Human leucocyte antigen (HLA), Myasthenia Gravis; *Araatığı Tarih:* 11 Mayıs 2000; Uzm Dr. Mehmet Ali Akalm, Doç. Dr. Ayşe Akıncaş, Uzm Dr. Gökhan Erdol, Prof. Dr. Perihan Baslo: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana-Bilim Dah; Dr. Esra Yılmaz PhD, Prof. Dr. Ergun Erdogan: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi ve Doku Tipi Laboratuvarı; *Yanıuma Adresi (Address):* Dr. MA Akalm, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dah, 34303, Cerrahpaşa, İstanbul.

