

PREOPERATİF HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRME

Tanju ATAMER *

Preoperatif dönemde hastaların hematolojik yönünden konsültasyonu rutin olmayıp, daha çok kanama öyküsü ya da anormal bir laboratuvar sonucu olan hastalarda, bazı elektif cerrahi girişimlerden önce, ameliyat sırasında ya da postoperatif dönemde ortaya çıkan kanamalarda gerekli olmaktadır. Cerrahi girişimler hemostaz yönünden birbirine zıt olan iki duruma da yol açabilirler: kanama ve derin ven trombozu. Bu bozukluklar cerrahi girişim sırasında olabildiği gibi sıkılıkla postoperatif dönemde de ortaya çıkabilirler. Hastalarda cerrahi girişim öncesinde eskiden tarama amacıyla yapılan kanama zamanı ve pihtlaşma zamanı testleri kesinlikle duyarlısı ve yetersiz olacağından terk edilmelidir. Kanamaya eğilimle ilgili olarak tek tek ele alınması gereken başlıca inceleme öğeleri, ⁽¹⁾ hastanın hemostaz ile ilgili öyküsünün alınması; ⁽²⁾ fizik muayene bulgularının değerlendirilmesi; ⁽³⁾ cerrahi indikasyonu oluşturan neden ve uygulanacak cerrahinin tipinin belirlenmesi; ve ⁽⁴⁾ laboratuvar testlerinin yorumu olmalıdır.

Hemostaz öyküsü: Hastanın anamnesi yanı sıra hemostaz ile ilgili öyküsünün ayrıca alınması yukarıda sayılan öğeler içinde en önemlisi olarak bilinmelidir. Hastada bir hemostaz kusurunun az ya da yüksek olasılıklı olup olmadığı, bu kusurun ortaya konmasını sağlayacak laboratuvar incelemelerinin seçimi, ve bu kusura yönelik alınacak önlem ve tedavilerin belirlenmesi de yine hemostaz öyküsüne dayalı olacaktır ⁽¹⁶⁾. Hemostaz öyküsü alınırken bazen hastanın çocukluk yıllarına (sünnet, tonsillektomi, yara iyileşmesinde gecikmeler) hatta yenidoğan dönemine (göbek kordonu iyileşmesi) kadar gitmek gerekebilir. Daha önce dış çekimi, ameliyat

ya da biyopsi olmuş hastalarda, bu girişimlerden sonra aşırı kanama olduğunun belirtilmesi önemli olmakla beraber, bu kanamanın daha da şiddetli olduğunu ve hastada anemi geliştiğini belirten bir kan sayımı raporu; kan ya da plazma transfüzyonu yapıldığının belirtilmesi daha somut deliller olarak alınmalıdır (Tablo 1). Anamnez hastada bir kanama eğiliminin varlığını kuvvetle destekleyebilir ve kusurun konjenital ya da edinsel olup olmadığı hakkında da bilgiler verir.

Tablo 1. Hastada kanama öyküsünün varlığını destekleyen bulgular:

- kanama sorunları nedeniyle başka doktorlara yapılan başvurular
- kanama dönemlerinde transfüzyon tedavisi yapılması (kan, plazma, trombosit)
- kanama sonrasında anemi oluştuğunun belgelenmesi, ya da demir tedavisinin verilmesi
- yara iyileşmesinde gecikmeler
- küçük cerrahi girişimlerden sonra aşırı kanama (sünnet, dış çekimi, tonsillektomi apandektomi) ve/veya kan transfüzyonu gereklmesi
- diğer aile bireylerinde kanama öyküsünün olması

Bunlardan başka hastanın halen ya da yakın zamana kadar almakta olduğu ilaçlar sorulmalıdır. Bu ilaçlar içinde aspirin, antiinflamatuar ilaçlar, kumarin, heparin, sefalosporin grubu antibiyotikler özellikle sorularak aranmalıdır. Birçok hastanın aspirini ilaçtan saymayı söylemeyeceği de akılda tutulmalıdır. İlaçlar trombosit işlevini bozarak, trombositopeni yaparak, ya da pihtlaşmayı etkileyerek kanamaya neden olabilirler ⁽⁷⁾. Bitkisel tıbbı dayalı bazı çay ve tedavilerin antikoagülant etkileri olabilir ve kullanan

hastalarda bunların doz sınırını belirlemek çok zordur.

Hastanın hemostaz öyküsü bakımından değerli olabilecek bilgiler soygeçmişinde de aranmalıdır. Bu amaçla en az bir iki kuşak geri giderek yakın aile bireylerinde kanama öyküsü, ölen yakınlarındaki ölüm nedenleri, anne ile baba arasında akraba evliliği konuları araştırılmalıdır. Hemostaz öyküsü alınırken sadece kanama değil, trombofili yönünden de alınacak bilgiler değerlidir. Sonuç olarak bir hastanın öyküsünde pozitif olarak alınacak bilgiler, preoperatif değerlendirme yapılırken kanamaya eğilim ya da trombofili bakımından yaklaşımında büyük kolaylık sağlar. Bazan rastlanan ve sadece elde bir kesik olduğunda kanamanın uzun sürmesi ve aşırı olması öyküsü genellikle kanamaya eğilimle ilgili olmayıp, yetersiz bir bilgidir. Bu nedenle yukarıda belirtildiği gibi öykü alınırken dikkat ve çaba harcanması, hemostaz öyküsünü almanın bir özellığıdır.

Fizik muayene bulguları: Hastalarda mutlaka tam bir fizik muayene yapılmalı ve bulgular bir arada değerlendirilmelidir. Bunlar peteşi, ekimoz, hematom, injeksiyon yerlerinden kanama gibi bulgular olduğunda klinik yaklaşım pek zorluk göstermez. Peteşlerle birlikte ekimozlar ve mukoza kanamalarının olması trombositopenili hastalarda sıkılıkla saptanır. Çok geniş ekimozlar, hematom oluşumu, geç tipte kanamalar ise pihtlaşma sisteminde kusur olduğunu gösterir. Yaygın damarıçi pihtlaşması gibi bazı durumlarda hem trombositopeni hem de pihtlaşma kusuru bulguları bir arada olabilir. Hastalarda infeksiyon ya da sistemik bir hastalığın varlığını düşündüren ipuçları (örneğin karaciğer parenkim hastalığı, böbrek yetersizliği ya da sistemik bir hastalığa ait bulgular) dik-

katle değerlendirilmelidir⁽⁶⁾. Bu hastalıkların, laboratuvar testlerinin belirlenmesi ya da yorumlanmasında ayrıca önemi vardır.

Cerrahi indikasyon ve cerrahinin tipi: Cerrahi girişime yol açan hastalık ya da durum, lokal ya da geniş alanda, basit ya da komplikasyonlu (örneğin infekte, nekrozlu, travmalı, neoplastik), yüzeysel ya da derin yerleşimli olabilir. Buna göre uygulanacak cerrahinin tipi de kanama riski bakımından preoperatif dönemde bazı ön bilgiler verir (Tablo 2). Cerrahi tipinin, minör (diş çekimi, sünnet) ya da majör olması; zaten bir hemostaz kusurusuna yol açabilecek özellikle olması (açık kalb cerrahisi, beyin cerrahisi); yerel fibrinoliz beklenen bir dokuda yapılması (prostatektomi, tonsillektomi, ağız ya da burun cerrahisi); yerel hemostaz yapma olanağının olmaması (karaciğer ya da böbrek biyopsisi) gibi etkenler, preoperatif dönemde kanama riskini belirlerken büyük önem taşırlar.

Laboratuvar testlerinin değerlendirilmesi: Bu testlerin gerekli olup olmadığını, gerekliyse nelerden oluşacağını belirlerken hastanın hemostaz öyküsü ve cerrahi girişimin tipi veya özellikleri göz önünde bulun-

Tablo 2. Cerrahi girişim tipinin kanama riski üzerine etkisinin belirlenmesi

ETKENLER	KANAMA RİSKİ	
	DÜŞÜK	YÜKSEK
Cerrahinin tipi	Minör	Majör
Hemostaz kusuru	Beklenmez	Beklenir -açık kalb cerrahisi -prostat cerrahisi
Yerel fibrinoliz	Yok	Var -ağtz, burun cerrahisi -tonsillektomi -prostatektomi
Yerel hemostaz olasılığı	Var	Yok -karaciğer biyopsisi -böbrek biyopsisi

durulmalıdır. Testlerin seçimi kadar kan örneğinin alınma ve laboratuvara gönderilme koşulları, uygulanan laboratuvar yöntemi, ve sonunda alınan sonuçların yorumu da dikkat ve deneyim gerektirir^(6,12,13). Hangi durumda hangi laboratuvar testinin seçilmesi konusunda Rapaport tarafından önerilen, öyküye ve uygulanacak olan cerrahi girişim tipine dayalı bir yaklaşım planı Tablo 3'de gösterilmiştir⁽¹⁵⁾. Bu tablodan da anlaşılabileceğ gibi, öykü negatif ve cerrahi girişim minör ise laboratuvar testi gereksiz bulunmaktadır. Diğer durumlarda istenmesi gereken testler tabloda özetlenmiştir. Uzamiş aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ve protrombin zamanı (PZ) karşısında, pihtlaşma kusurunun yerini bulmak için daha ayrıntılı çalışmalar gereklidir^(11,14). Anormal bir test sonucu ile karşılaşıldığında bu test yinelenmeli ve ondan sonra daha ileri incelemelere geçilmelidir. Seyrek olarak bazı insanlarda rastlanan EDTA'ya bağlı psödotrombositoopeni durumlarında ise test defalarca yinense de trombositoopeni saptanacağı unutulmamalıdır⁽⁶⁾. Aslında tüm trombositoopeni durumları çevre kanı yaymasında da kontrol edilip doğrulanmalıdır.

Bu bilgilere göre, güncel uygulamada sık karşılaşduğumuz biçimde istenen preoperatif

kanama zamanı (KZ) ve pihtlaşma zamanı testlerinin bir değeri bulunmamaktadır. Ayrıca KZ'nın normal bulunması ile cerrahi girişim sırasında kanamanın şiddeti arasında bir koşutluk da beklenmemelidir⁽⁹⁾. KZ uygun bir yöntemle (template, Ivy) yapıldığında, bunu etkileyen başlıca etkenler trombositlerin sayısı ve işlevsel yönünden nitelikleri, kapiller kan damarlarının bütünlüğü ve deridir. Bu nedenle KZ trombositler için özgül değildir, bununla birlikte kalitsal bir trombosit hastalığının ve von Willebrand hastalığının araştırılmasında çok yararlar sağlar⁽³⁾. KZ'nın yorumlanmasıyla ilişkin bazı kurallar Tablo 4'de özetlenmiştir. Parmak ucundan yapılan kanama zamanı (Duke yöntemi) nadir olarak hala kullanılmakta olup, değerlendirilmeye alınmamalıdır.

Tablo 4. Kanama zamanının değerlendirilmesi

- * Etkileyenler: trombositler (sayısı ya da nitelik kusurları), kapiller damarların bütünlüğü, deri.
- * Trombosit işlevi bakımından özgül değildir.
- * Mukoza, doku kanamaları ya da cerrahi girişime bağlı kanamalar için yakından ya da yansıtıcı bir ilişki göstermez.
- * Başlıca kullanım yeri von Willebrand hastalığı ve kalitsal trombosit kusurunun taranması amacıyladır. Bunlarda bile değişkenlik olabilir.

Tablo 3. Preoperatif dönemde hemostazın değerlendirilmesiyle ilgili testlerin seçimi

Düzey	Kanama Öyküsü	Cerrahi girişimin tipi	Laboratuvar testleri
1	Negatif	Minör	Gerekli değil
2	Negatif	Majör	aPTZ, trombosit sayısı
3	Düşündürücü veya:	Tümünde Kardiyopulmoner bypass Açık prostatektomi MSS cerrahisi	aPTZ, PZ, template KZ, Pihtı çözünürlüğü testi (F XIII eksikliği taraması)
4	Pozitif veya Kesin	Tümünde	Düzey 3'dekilere ek olarak: F VIII ve F IX ölçümü, Trombin Z, dolaşan inhibitör

Kısaltmalar: aPTZ, aktive parsiyel tromboplastin zamanı; PZ, protrombin zamanı; KZ, kanama zamanı; MSS, merkez sinir sistemi.

Hemostaz testlerinin sonuçlarını etkileyen ve hastadan kaynaklanmayan bazı etkenler de vardır. Bunlar kan örneğinin alınması sırasında yapılan hatalarla başlar ve son derecede önemlidir. Böyle bir durumda elde edilen hemostaz testinin değerlendirilmesi doğru değildir ve test ya da testlerin tekrarlanması gereklidir. Bu hataların sık karşılaşılanları şunlardır (2,11,12,13,14):

- Kan örneğinin damara tek girişte alınamaması ve cilt altı dokusunun zedelenmesi durumlarda, PZ ve aPTZ testlerinin daha kısalmış bulunacağı unutulmamalıdır. Özellikle küçük çocuklarda ve damaları zor bulunan erişkinlerde karşılaşılan bir durumdur (2,12).

- Kanın sitratlı tüpe yeteri kadar doldurulması sonucu 9/1 olan kan/sitrat oranının bozulması (12),

- Kan alındıktan sonra antikoagüllerle karışması için tübü uygun biçimde sallanmaması,

- Testlerin uzun süre (> 4 saat) beklemiş kan örneğinden yapılması (2),

- Kateterli hastalarda kan örneğinin kateter ucundan alınması (heparin bulaşması kesinlikle önlenemez) (11). Özellikle yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda bu sorunla sık karşılaşılır.

- Kanın doğrudan damardan değil, bir serum ya da transfüzyon setinden alınması,

- Hemostaz testlerinin deneyimsiz bir laboratuvar çalışanı tarafından yapılması (seyrek rastlanır).

Bazı klinik sorunlarda cerrahi hemostaz:

Trombositopeni ve trombositoz

Trombositopeni hastanede yatırılan hastalarda sık karşılaşılan bir sorundur. Sayım veya örnek hatalarına bağlı olanları ve EDTA'ya bağlı psödotrombositopenileri dışlayabilmek için çevre kanı yaymasının (formül prepara-

ti) incelenerek trombositopeninin doğrulanması gereklidir (6). Cerrahi girişimin biçimini, trombosit sayısı, trombositopenili hastalıkta trombosit işlevlerinin de bozulmuş olması gibi çeşitli etkenler bazen bir arada bulunabilir. Birçok cerrahi girişim sırasında trombosit sayısının $80,000/mm^3$ den fazla olması kanama riskini en aza indirger (5). Buna karşılık $20,000/mm^3$ den daha az sayıda olduğunda trombositopeni ciddi kanama riskini taşırlar. Bunun ayrıcalık taşıyan örneği idyopatik trombositopenik purpura olup, bu hastalarda görülen genç ve büyük trombositlerin hemostatik etkinlikleri normalden fazladır. Bu nın dışında trombosit sayısı $50,000/mm^3$ den az olan hastalarda trombosit transfüzyonu gereklidir. Kardiyopulmoner baypas ameliyatlarında ise trombosit sayısı $100,000/mm^3$ ün üzerinde tutulmalıdır. Trombosit konsantresi transfüzyonu, ilik yetersizliğine bağlı trombositopenilerin tedavisinde kullanılabilirse de bazı durumlarda olumlu ya da yeterli bir yanıt alınamayabileceği unutulmamalıdır. Bunlar yüksek ateş, infeksiyon, splenomegali, kanamanın devam ediyor olması ve trombositlere karşı oto- veya alloantikorların varlığı gibi durumlardır. Trombosit sayısının düşük değil de yüksek olduğu durum veya hastalıklarda da kanama eğilim olabilir. Trombositozla seyreden miyeloproliferatif hastalıklarda görülen bu durumda minör (epidural ponksiyon) ya da majör cerrahi girişimlerinden sonra ciddi kanamalar görülebilir. Trombosit sayısı normal bile olsa, üremide ve aspirin almış hastalarda kanama riski vardır. Son olarak nadir görülebilir, trombosit sayısı tamamen normal ya da hafif düşük olarak bulunan bazı kalitsal trombosit hastalıklarında (Glanzman hast, Bernard - Soulier sendromu, v.d.) da kanama eğiliminin olacağı unutulmamalıdır (6).

Karaciğer hastalığı

Hemostaz anormallığının birçok nedeninin bir arada bulunabileceği karmaşık bir durum

da karaciğer hastalığıdır. Burada trombositopeni, trombosit işlev bozukluğu, pihtilaşma faktörlerinin sentezlerinin azalmış olması, fibrinojenin anormal yapıda olması, aktive olmuş pihtilaşma faktörlerinin karaciğer tarafından dolaşımından temizlenmesi, fibrinolitik aktivitenin artmış olması ve bazen yaygın damarıçi pihtilaşmasına bağlı kanama gibi birden fazla etkenin varlığı söz konusudur. Bütün bu bozukluklar karaciğer hastalığının ciddilik derecesi ile paralellik gösterir. Karaciğer hastalığına bağlı bu bozuklukları en iyi ortaya koyan testler PZ ve trombosit sayımıdır. Bundan başka yaygın damarıçi pihtilaşması düşünülen hastalarda uygun testler planlanmalıdır. Ciddi karaciğer hastalığı olan hastalarda cerrahi girişim büyük risk taşıdığından ancak yaşamı tehdit eden bir durumda başvurulmalıdır.

Üremi

Üremili hastalarda trombosit işlevlerinin bozulduğu, kanama zamanının uzadığı iyi bilinmektedir. Bu hastalara uygulanan DDAVP (desmopressin) tedavisile çok başarılı sonuçlar alınır⁽¹⁰⁾. Desmopressin intravenöz ya da ciltaltı yoluyla 0,3mg/kg doza, 15-30 dakikada uygulanır. DDAVP'nin düzeltici etkisi 30-60 dakikada başlar ve yaklaşık 4 saat kadar sürer.

Gebelik

Gebelik sırasında seyrek olmayarak trombositopeni ile karşılaşılabilir. Bazı normal gebelerde gebeliğin geç dönemlerinde trombosit sayısı 100,000/mm³'ün altında saptanabilir⁽⁶⁾. Gebelik trombositopenisi adı verilen bu selim durum asemptomatik olup trombosit sayısı 70,000/mm³'ün üzerindedir ve doğumdan sonra giderek düşer⁽¹¹⁾. Gebenin anamnesi, kanama bulgularının olup olmaması, kan basıncının ölçümü ve gerekirse yapılacak ileri incelemeler ile immun trombositopeni, eklampsi, trombotik trombosito-

penik purpura, yaygın damarıçi pihtilaşması, akut lösemi ve aplastik anemi gibi patolojik nedenlerle ayırcı tanı yapılabilir.

İtraoperatif ve postoperatorif kanama

Cerrahi girişim sırasında aşırı kanama ile karşılaşıldığında olası nedenler süratle gözden geçirilmeli, kanamanın lokal damarsal bir nedene ya da hemostaz sisteminde bir yetersizliğe bağlı olup olmadığı ortaya konmalıdır. Lokal nedene bağlı kanamalar tek yerden olur ve genellikle kanama hızı fazladır. Bu hastaların pihtilaşma testleri normal ya da minimum değişiklikler gösterir. Hemostaz bozukluğuna bağlı kanamalar ise multipl yerden kanar ve pihtilaşma testleri çeşitli anormallikler gösterir. Bunun yanı sıra hastanın yakın aile bireyleri ile görüşülmeli ve ailedede kanamaya eğilim olup olmadığı araştırılmalıdır. Hemostaz bozukluğu bazı hastalarda hafif derecede hemofili (faktör VIII veya IX eksikliği), seyrek olarak doğumsal ya da edinsel faktör XI, faktör XIII veya (2-plasmin inhibitör eksikliği gibi nedenlere bağlı olabilir. FVIII, FIX ve FXI'in hafif eksiklikleri aPTZ testinde anamlı bir uzamaya yol açmadığından, FXIII ise ne PZ, ne de aPTZ'yi etkilemediğinden, hastalarda preoperatif yapılan testler de normal gözükebilir. Hastanın özgeçmişinde ameliyat öyküsü varsa aşırı kanama olduğuna dair bilgi alınabilir, yoksa hastalar tamamen normal gözükebilirler. Ameliyat sırasında aşırı kanaması olan hastalarda injeksiyon yerlerinden de kanamanın görülmesi sistemik bir bozukluğun (yaygın damarıçi pihtilaşması, fibrinoliz) habercisi olabilir. Böyle bir durum örneğin yanlış gruptan kanın transfüze edilmesiyle de gelişebilir.

Bazı cerrahi girişimlerde sık olarak aşırı deprecede lokal ya da sistemik kanamalar görülür. Bu kanamaların bir kısmından lokal olarak gelişen aşırı fibrinoliz sorumludur. Prostatektomi, karaciğer transplantasyonu, aort

anevrizması onarımı buna örnek olarak sayılabılır^(4,17). Kan kaybını karşılamak için beklemiş banka kaniyla massif transfüzyon (erişkin bir hastada 24 saat içinde 5 litreden fazla) uygulanması ve kristaloid çözeltisi tedavileri, hastanın dolaşımındaki pihtlaşma faktörlerinin sularmasına yol açarak kanamaya katkıda bulunabilir⁽⁸⁾. Kardiyopulmoner bypass ameliyatının daha başlarında hematokrit, trombosit sayısı ve pihtlaşma faktörleri %50 oranında kayba uğrar⁽¹⁷⁾. Burada kısmen kanın yapay yüzeylerle karşılaşmasının, kısmen de cerrahi girişime bağlı açığa çıkan doku faktörü sonucu pihtlaşma faktörlerinin harcanmasının rolü vardır.

Sonuç olarak preoperatif ve gerektiğinde intraoperatif dönemde aşırı kanayan bir hastada durumu değerlendirirken, kanamanın şekli, altta yatan sistemik hastalık, ameliyatın ya da cerrahi girişimin tipi, hemostaz testleri ve hastanın kanamaya eğilim yönünden dikkatlice alınacak öyküsü bir arada ele alınmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Anteby E, Shalev O: Clinical relevance of gestational thrombocytopenia of 100,000/. *J Am J Hematol* 47:118 (1994).
2. Brozovic M: Investigation of acute haemostatic failure, "Practical Haematology", editör: Dacie JV, Lewis M, Churchill Livingstone" sayfa: 279 (1991).
3. Burns ER, Lawrence C: Bleeding time: a guide to its diagnostic and clinical utility. *Arch Pathol Lab Med* 113: 1219, (1989).
4. Dzik WH, Arkin CF, Jenkins RL, Stump DC: Fibrinolysis during liver transplantation in humans: role of tissue-type plasminogen activator. *Blood* 71: 1090, (1988).
5. Francis CW and Kaplan KL: Hematologic problems in the surgical patient: bleeding and thrombosis. "Hematology basic principles and practice", editör: Hoffman R, Benz EJ, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE, McGlave P. Churchill Livingstone, Philadelphia", sayfa: 2381 (2000).
6. George JN: Platelets. *Lancet* 355:1531, (2000).
7. George JN, Raskob GE, Shah SR: Drug-induced thrombocytopenia: a systematic review of published case reports. *Ann Intern Med* 129:886, (1998).
8. Leslie SD, Toy PTCY: Laboratory hemostatic abnormalities in massively transfused patients given red cells and crystalloid. *Am J Clin Pathol* 96: 770, (1991).
9. Lind SE: The bleeding time does not predict surgical bleeding. *Blood* 77: 2547, (1991).
10. Manucci PM: Desmopressin (DDAVP) in the treatment of bleeding disorders: the first 20 years. *Blood* 90: 2515 (1997).
11. Miletich JP: Activated partial thromboplastin time. "Williams Hematology", editör: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, McGraw-Hill, New York", sayfa L82 ve L85 (1995).
12. Peterson P, Gottfried EL: The effects of inaccurate blood sample volume on prothrombin time (PT) and partial thromboplastin time (aPTT). *Thromb Haemostas* 47:101 (1982).
13. Rapaport SI: Preoperative hemostatic evaluation: which tests, if any? *Blood* 61: 229, (1983).
14. Sahud M: Coagulation tests in differential diagnosis. *Clin Lab Haematol* 22 Suppl 1: 2, (2000).
15. Suchman AL, Mushlin AI: How well does the activated partial thromboplastin time predict postoperative hemorrhage? *JAMA* 256: 750 (1986).
16. Wahlberg T, Blomback M, Hall P, Axelsson G: Application of indicators, predictors and diagnostic indices in coagulation disorders. I. Evaluation of a self-administered questionnaire with binary question. *Methods Inf Med* 19:194 (1980).
17. Woodman RC, Harker LA: Bleeding complications associated with cardiopulmonary bypass. *Blood* 76: 1680 (1990).