



Tarım Bilimleri Dergisi
Tar. Bil. Der.

Dergi web sayfası:
www.agri.ankara.edu.tr/dergi

Journal of Agricultural Sciences

Journal homepage:
www.agri.ankara.edu.tr/journal

Değişik Yöntemlerle İslah Edilen Meralarda Bazı Toprak Kalite Özelliklerinin Değişimi

Cafer TÜRKMEN^a, Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU^a, Yasemin KAVDIR^a

^a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale, TÜRKİYE

ESER BİLGİSİ

Araştırma Makalesi — Bitkisel Üretim https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001250

Sorumlu Yazar: Cafer TÜRKMEN, E-posta: turkmen@comu.edu.tr, Tel: +90 (0 286) 218 00 18/1316

Geliş Tarihi: 02 Ağustos 2013, Düzeltmelerin Gelişi: 25 Eylül 2013, Kabul: 25 Eylül 2013

ÖZET

Bu çalışma; farklı yöntemler uygulanarak ıslah edilen mera alanında ıslah uygulamalarının bazı toprak kalite özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 2008 ve 2009 yılları Mayıs ayının ikinci haftasında 5 farklı ıslah yöntemi uygulanan mera alanından ve herbir ıslah uygulama alanının sekiz farklı yerinden 0–15 ve 15–30 cm derinliklerinden toprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde; toprak reaksiyonu, toprak tuzluluğu, kireç içeriği, toplam karbon, toplam azot, agregat stabilitesi, kuru hacim ağırlığı, tane yoğunluğu, katalaz enzim aktivitesi, üreaz enzim aktivitesi ve mezofil aerobik mikroorganizma sayıları tekrarlanan ölçümlerle incelenmiştir. Elde edilen verilerin istatistik analizlerine göre ıslah uygulamalarının; toprak reaksiyonu, toprak tuzluluğu, kireç yüzdesi, toplam azot, agregat stabilitesi, katalaz enzim aktivitesi ve mezofil mikroorganizma sayıları özelliklerine etkisinin önemli düzeyde ($P<0.01$) olduğu bulunmuştur. Ayrıca uygulamaların, toplam karbon miktarı ile üreaz enzim aktivitesine etkisinin önemli ($P<0.05$) olduğu görülmüştür. Toprak derinliğinin tuzluluk, toplam karbon, katalaz ve üreaz enzim aktiviteleri özelliklerine $P<0.01$ düzeyinde önemli etki yaptığı belirlenmiştir. Toprak derinliğinin toprak reaksiyonu, toplam azot, agregat stabilitesi, kuru hacim ağırlığı, tane yoğunluğu ve mezofil mikroorganizma sayısı özelliklerine $P<0.05$ düzeyinde etkili olduğu görülmüştür. İncelenen özelliklerin hiçbirinde uygulama ve derinliğin birlikte etkisinin (interaksiyon etkisi) önemsenecek düzeylerde olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mera; Mera ıslahı; Toprak; Toprak kalitesi

Change of Some Soil Quality Characteristics under Different Pasture Reclamation Methods of Rangelands

ARTICLE INFO

Research Article — Crop Production

Corresponding Author: Cafer TÜRKMEN, E-mail: turkmen@comu.edu.tr, Tel: +90 (0 286) 218 00 18/1316

Received: 02 August 2013, Received in Revised Form: 25 September 2013, Accepted: 25 September 2013

ABSTRACT

The present study was conducted to investigate the effects of different pasture reclamation methods on soil characteristics. For this purpose, soil samples were taken from 0–15 and 15–30 cm depths of the pasture lands subjected to 5 different

reclamation processes from 8 different locations of each process during the second week of May of 2008 and 2009. Soil reaction, soil salinity, lime content, total carbon, total nitrogen, aggregate stability, bulk density, particle density, catalase and urease enzyme activities and mesophyllic aerobic microorganism count tests were carried out on soil samples for two years. Effects of reclamation processes on soil reaction, soil salinity, lime content, total nitrogen, aggregate stability, catalase enzyme activity and mesophyllic microorganism counts found to be significant at $P<0.01$ level. Effects of treatments on total carbon and urease enzyme activity were found to be significant at $P<0.05$ level. Effects of soil depth on soil salinity, total carbon, catalase and urease enzyme activities were found to be significant at $P<0.01$ level; soil reaction, total nitrogen, aggregate stability, bulk density, partical density and mesophyllic microorganism counts were found to be significant at $P<0.05$ level. Interactions of treatments and depth were not significant at any level.

Keywords: Pasture; Pasture reclamation; Soil; Soil quality

© Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1. Giriş

Dünyada karaların yaklaşık % 25'ini meralar kaplamaktadır (Ojima et al 1993). Türkiye'de bu oran % 18.8'dir. Çanakkale ise 22153.6 ha (% 2.22) çayır ve mera alanı ile oldukça az meraya sahip illerdendir (ÇOB 2007). Dünya gıda üretiminin % 16'sının meralardan sağlandığı belirtilmektedir (Holechek et al 2004). Meraların dünya hayvansal üretimindeki kaba yem ihtiyacının yaklaşık % 70'ini temin ettiği tahmin edilmektedir (Lund 2007).

Meralarda uygun olmayan otlamalar sonucunda, özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda, tek yıllık bitki türleri ile karaçalı (*Paliurus spina-cristi*), aptesbozan (*Sarcopoterium spinosum*) gibi dikenli çalılar ve dikensi yapraklı ardiç (*Juniperus oxycedrus*) vejetasyonunda önemli artışlar gözlemlendiği birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir (Montalvo et al 1993; Seligman 1996; Lavorel et al 1999; Sternberg et al 2000; Gökkuş et al 2001; Özaslan Parlak 2011). Keçi otlatılmayan bölgelerde ise yoğun olarak karaçalı bulunmaktadır. Aşırı otlatmanın mera bitkileri türlerine olan baskısı (Şekercioğlu et al 2011; Fıncıoğlu et al 2007; Heady 1973; Stoddart et al 1975) yanında topraklara da baskısı olmaktadır (Özaslan Parlak et al 2011a; Oğuz, 2012; Mikhailova et al 2000; Langdale et al 1992; Nael et al 2004).

Türkiye'de son yıllarda çıkarılan 4342 sayılı mera kanunu ve ilgili yönetmelikler mera konusunun önemine işaret etmektedir (RG 1998). Bu kapsamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde mera ıslah çalışmaları tüm Türkiye çapında

başlatılmıştır. Meralarda bitki örtüsü ıslahında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Çalılarının yok edilmesinde mekanik ve kimyasal mücadele önemli bir yere sahiptir (Gökkuş et al 2001). Mera ıslah çalışmalarının sonucunda kısmen gözle görülür başarılar elde edilmiş, ancak sonuçlar birçok mera ıslah alanında gözleme dayalı olarak kalmış ve bilimsel olarak ele alınan araştırma sayısı (Mülayim 1980; Fidan 2002; Kökten 2005; Kadioğlu 2007; Çetiner 2009) sınırlı olmuştur. Bu konuda 8500'den fazla yabancı yayına rastlanmış ancak, İngilizce anahtar kelimelerle; tarama ıslah yöntemleri, toprak kalitesi, şeklinde sınırlandırıldığında bazı münferit toprak özelliklerinin incelendiği birkaç çalışma dışında (Öztaş et al 2003; Nael et al 2004; Liu et al 2010; Zavala et al 2011; Lal 2011) genel anlamda doğrudan ıslah metodları ile toprak kalite parametrelerinin ilişkisini sorgulayan çalışmalara rastlanmamıştır.

Bu çalışmada; Çanakkale ili meralarının % 40'ına ve büyükbaş hayvanların % 34'üne sahip olan Biga ilçesinde (Çetiner 2009), Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından değişik yöntemlerle ıslah edilmiş bir mera olan Hacıpehlivan köyü merasında yapılan ıslah çalışmalarının bazı toprak kalite özelliklerine etkilerinin bilimsel olarak değerlendirilmesi kurgulanmıştır. Bu amaçla; iki farklı derinlikten ve iki yıllık dönemden elde edilen verilerle mera ıslah ve yönetim uygulamalarının toprak özelliklerine ve toprak kalitesine olumlu ya da olumsuz etkilerin boyutu tespit edilmeye çalışılmıştır.

2. Materyal ve Yöntem


2.1. Materyal

Deneme materyali olarak kullanılan mera alanı Biga (Çanakkale–Türkiye) ilçesi doğusunda, ilçeye 17 km ve Çanakkale’ye 120 km uzaklıkta bulunan Hacıpehlivan köyünün 113.2 hektarlık mera alanıdır. Mera alanı kuzey–güney doğrultusunda yaklaşık 2 km uzunluk ve doğu–batı doğrultusunda 0.5 km genişliktedir. Mera alanı köy yerleşim yerine bitişik ve köyün kuzeyinde doğu–batı hattı boyunca uzanmaktadır. Sınırları; kuzeyden (40° 15’ 09” K / 27° 24’ 24” D) - (40° 15’ 16” K / 27° 24’ 58” D) ve güneyden (40° 14’ 20” K / 27° 25’ 27” D) - (40° 14’ 25” K / 27° 25’ 36” D) koordinatları ile çevrilmektedir (Şekil 1). Ölçümler “Magellan 310” el tipi coğrafi konum belirleme Global Positioning System (GPS) cihazı ile yapılmıştır. Merada 40 büyükbaş, 55 keçi ve 40 koyun olmak üzere 95 küçükbaş hayvanın otlatıldığı belirtilmiştir (Çetiner 2009).

Mera alanındaki çalıların (*Paliurus spina-christi* Mill.) farklı yöntemlerle uzaklaştırılarak bertaraf edilmesi ve ıslah uygulamalarına göre mera

alanı beş guruba ayrılmıştır. Bunlar: hiçbir çalı mücadelesi yapılmayan (ıslah uygulanmayan doğal olarak bırakılan çalılık mera alanı), kontrol merası (A), 1989 yılında sürülüp mera bitkileri ekimi yapılan alan (B), Glyphosate içeren ot öldürücülerle (Roundup) münferiden ilaçlanarak öldürülen çalılarının uzaklaştırılması sonrası mera bitkileri ekimi yapılan alan (C), 2004 yılında Dozer + Ripper aleti ile çalılar kökünden sökülerek (yaklaşık 25–30 cm) uzaklaştırılmasından sonra mera bitkileri ekimi yapılan alan (D) ve uzun yıllar (15 yıl) tarla olarak kullanıldıktan sonra yeniden mera bitkisi ekimi yapılan alan (E) gruplarıdır.

Mera alanlarına ıslah amacıyla yapılan ekimler, dörtlü karışım olarak % 40 baklagil, % 60 buğdaygil yem bitkileri şeklinde yapılmıştır. Ekimden sonra bir yıl süreyle merada otlatma yapılmayarak ekilen türlerin kuvvetli kök oluşturmaları temin edilmiştir. Kontrol dışındaki alanlarda ekim sırasında gübre kullanılmamış, gübreleme 2005 ve 2007 yıllarında 3 kg da⁻¹ azot (N), 3 kg da⁻¹ fosfor (P) ve 3 kg da⁻¹ potasyum (K) olacak şekilde 15–15–15 kompoze gübresi ile yapılmıştır. Takip eden yıllarda gübreleme yapılmamıştır.



Şekil 1- Araştırma sahası

Figure 1- Reserach site

2.2. Deneme alanının iklim özellikleri

Marmara geçit iklimi özellikleri gösteren mera alanının uzun yıllar iklim verileri ile deneme zamanına ait iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir (MGM 2013). Çalışma alanının iklim verilerine bakıldığında (Çizelge 1) çalışmanın yürütüldüğü her iki yılda da ortalama sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretmiştir. Yağışlar ise 2008 yılında oldukça düşükken 2009 yılı yağışları uzun yıllar ortalamasından fazla olmuştur.

2.3. Toprak özelliklerinin incelenmesi ve verilerin elde edilmesi

Merada her bir ıslah uygulama alanı için, o alanın sekizer yerinden ve ikişer derinlikten (0–15, 15–30 cm) toprak örnekleri alınmıştır. GPS yardımıyla yerleri saptanan noktalardan ertesi yıl da aynı yer

ve derinliklerden örnekleme yapılmıştır. Alınan örnekler polietilen torbalarla laboratuvara nakledilmiş ve hava kuru toprak haline getirilerek 2 mm’lik elekten elenmiş (Jackson 1958) ve Çizelge 2’deki yöntemlere göre toprak analizleri yapılmıştır. Mikrobiyal amaçlı örnekleme ise Winogradsky (1952) metoduna göre; her noktadan el burgusuyla alınan en az beş örneğin homojenize edilerek havadar koşullarda arazi tip soğutucularla muhafaza altına alınarak, örneklerin laboratuvara nakledilmesi şeklinde yapılmıştır. Örneklemede değişik derinlik ve uygulamalardan alınan farklı örnekler arasında kullanılan ekipmanlar % 96’lık etil alkol ile dezenfekte edilmiştir. Bozulmamış toprak örnekleri ise 100 cm³’lük çakma silindirleri kullanılarak (Blake & Hartge 1986) her ıslah uygulama alanının sekizer noktasından ve ikişer derinlikten alınmıştır.

Çizelge 1- Deneme yeri iklim verileri (Biga-Çanakkale)

Table 1- Climate data for research site (Biga-Çanakkale)

Aylar	Yıllar					
	2008	2009	1970-2013*	2008	2009	1970-2013*
	Sıcaklık (°C)			Yağış (mm)		
Ocak	4.5	7.8	5.2	22.0	80.2	88.8
Şubat	5.5	7.2	5.5	9.4	110.9	75.1
Mart	11.3	8.8	7.8	34.2	80.1	62.8
Nisan	13.7	12.2	12.1	48.0	40.3	55.4
Mayıs	17.7	18.4	16.7	0.2	17.9	38.6
Haziran	23.4	22.7	21.5	6.3	16.1	25.1
Temmuz	25.8	26.4	23.6	0.6	1.2	11.5
Ağustos	26.1	25.3	23.3	34.1	0.0	14.6
Eylül	20.5	20.6	19.3	32.2	39.8	28.4
Ekim	16.4	17.6	14.9	55.5	63.6	55.8
Kasım	13.1	12.5	10.0	43.2	58.8	96.5
Aralık	8.6	11.0	7.0	58.2	176.7	104.4
<i>Ortalama</i>	15.6	15.9	13.9	343.9	685.6	657.0

*; Uzun yıllar ortalaması

Çizelge 2- Deneme topraklarının analizleri ve kullanılan metotlar

Table 2- Analyses and methods for experimental soils

Analizler	Açıklama	Metotlar
Toprak reaksiyonu (pH)	Toprak-Su karışımında (1:2.5)	Jackson (1958)
Toprak tuzluluğu	Toprak-Su karışımında (1:2.5)	Richards (1954)
Toplam C ve N	LECO C-N elementel analiz cihazı ile	Kirsten (1983)
Kireç	Scheibler kalsimetresinde volümetrik olarak	Allison & Moodie (1965)
Kum-Silt-Kil	Organik maddesi ve kireci giderilen örneklerde	Bouyoucos (1951)
Bitkiye yararılı P	0.5 M NaHCO ₃ (pH=8.5) ile çözeltiye alınan P'dan	Olsen et al (1954)
Agregat stabilitesi	Islak eleme metodu ile	Kemper & Rosenau (1986)
Tane yoğunluğu	Fırın kuru ağırlığın, toprak katı kısmının hacmine bölümü ile	Blake & Hartge (1986)
Kuru hacim ağırlığı	Fırın kuru ağırlığın toplam hacme bölümü ile	Blake & Hartge (1986)
Üreaz enzim aktivitesi	Hava kuru 2 mm'lik elekten geçirilmiş topraklarda, üreinin 3 saat 37 °C derecede inkübasyonu sonrası	Hoffmann & Teicher (1961)
Katalaz enzim aktivitesi	Hava kuru 2 mm'lik elekten geçirilmiş topraklarda, H ₂ O ₂ 'i parçalayan enzimin çıkardığı O ₂ gazından	Beck (1971)
Mikroorganizma sayısı	Winogradsky (1952)'e göre taze örneklerde	Wollum (1982)

2.4. Verilerin istatistik analizi

Elde edilen verilere, mera alanlarının ve derinliklerin karşılaştırılması amacıyla tek yönlü varyans analizi tekniği uygulanmıştır. İncelenen özellikler arasındaki farklılık “F” testi ile belirlenmiştir. Ortalamalar arasındaki farkı belirlemek için En Küçük Önemli Fark (Least Significant Difference; *LSD*) testi kullanılmıştır. Söz konusu istatistik analizlerinin yapılmasında SAS istatistik paket programından yararlanılmıştır (SAS 2000).

3. Bulgular ve Tartışma**3.1. Toprak kimyasal özellikleri**

Toprak özelliklerinin varyans analiz değerlerine göre toprağın pH'sı ve tuzluluğu, hem ıslah uygulama tipine hem de toprak derinliğine bağlı olarak değişirken kireç miktarı sadece ıslah uygulama tipine göre değişmiştir. Kirecin toprak derinliğine göre değişimi (Çizelge 3) önemsiz olmuştur.

Çizelge 3- Toprak kimyasal özelliklerinin ıslah tipi ve toprak derinliğine göre değişimi

Table 3- Variation of soil chemical characteristics with reclamation process and soil depth

Uygulama tipi/ Toprak derinliği ^a	Toprak reaksiyonu (pH)	Tuz (µmhos cm ⁻¹)	Kireç (%)
A ¹	7.70 a [#]	204.31 b	3.82 a
B	7.32 b	155.77 c	2.08 b
C	6.61 c	162.54 c	0.66 c
D	7.53 a	301.24 a	2.89 ba
E	7.50 ba	293.70 a	2.24 b
F değeri	31.86***	22.99***	9.06***
LSD _{0.05}	0.212	40.84	1.08
I ²	7.25 b	249.13 a	2.64
II	7.41 a	197.90 b	2.04
F değeri	5.71*	15.35***	3.05 ^{od}
LSD _{0.05}	0.134	25.83	-

^a, Uygulamalara göre elde edilen ortalamalar için $n = 32$, derinliğe göre elde edilen ortalamalar için $n = 80$ 'dir. ¹ A, Kontrol; B, 15 yıl önce ıslah edilen; C, Ot öldürücü ile çalılar öldürülen; D, Dozerle çalılar sökülün; E, Uzun yıllar tarım yapılmaktayken yeniden ıslah edilen mera alanlarını göstermektedir. ² I, 0-15 cm derinlikten alınan örnekleri; II, 15-30 cm derinlikten alınan örnekleri göstermektedir. [#], Farklı harfler aynı sütundaki farklı grupları simgelemektedir. ***, $P < 0.001$, *, $P < 0.05$ önem derecelerini göstermektedir. ^{od}, önemli değil anlamındadır.

Kontrol merasında pH ve kireç içerikleri diğer alanlara göre yüksek bulunmuştur. C uygulaması yapılan mera alanında en düşük kireç ve pH değerleri görülmüştür. Bu alandaki düşük pH seviyelerinin uygulanan ilaçlamaya bağımlı olmayacağı jeolojik yapıdan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Çünkü ilaçlama münferit çalı ilaçlaması şeklinde yapılmış ve biyolojik ölümü gerçekleştiren çalılar sökülerek ortamdan uzaklaştırılmışlardır. Toprak pH'sının kireçle doğrudan ilişkili olduğu (Richard 1954) uzun yıllardır bilinen bir durumdur. D ve E mera alanlarının tuz seviyeleri diğer gruplardan yüksek olmuş, en düşük tuz değerleri B ve C alanlarında ölçülmüştür. İncelenen topraklarda pH ve tuz özelliklerinde üst toprakta (0–15 cm) yüksek değerler görülmüşken, topraktaki kireç değişimi derinliklere göre önemsiz olmuştur (Çizelge 3).

Çetiner (2009), aynı bölgede uzun yıllar tarla olarak kullanıldıktan sonra ıslah edilerek yeniden mera haline getirilen bir alanda yaptığı çalışmada, incelediği özellikler içinden toprak reaksiyonu, EC

ve değişebilir Mg'un önemli oranda değişmediğini belirtmiştir. Kadioğlu (2007) ise üç topoğrafik pozisyonda yaptığı çalışmada tepe konumundan etek konumuna doğru, araştırmaya konu olan toprak kalite parametrelerinin değerlerinin arttığını ve örneklenen A horizonunda B horizonuna göre bu parametrelerin daha yüksek değerlere ulaştığını belirtmiştir. Bu çalışma, horizon bazında örnekleme yapılan ve kalite özelliklerine değinen az sayıdaki çalışmalardandır. Farklı ekolojik koşullar olsa da, yaptığımız çalışmada üst toprakların özellikleri benzer sonuçlar göstermiştir.

3.2. Toprak biyolojik özellikleri

Araştırmada toprak biyolojik kalite parametreleri olarak mikroorganizma sayıları, üreaz ve katalaz enzimleri ile toplam azot ve karbon içerikleri (Nortcliff 2002; Nannipieri 1994; Dick 1994) ele alınmıştır. İncelenen bu özellikler ıslah uygulamalarına ve derinliklere göre farklar göstermiş, farklar istatistikî olarak önemli olmuştur (Çizelge 4).

Çizelge 4- Toprak biyolojik özelliklerinin ıslah tipi ve toprak derinliğine göre değişimi

Table 4- Variation of soil biological characteristics with reclamation process and soil depth

Uygulama tipi/ Toprak derinliği ^a	Mikroorganizma sayısı (x10 ⁶)	Katalaz (mg O ₂ 5 g ⁻¹ toprak)	Üreaz (mg NH ₃ -N 100 g ⁻¹ toprak)	Toplam C (%)	Toplam N (%)
A ¹	6.65 a [#]	7.42 a	40.24 a	3.16 ba	0.213 b
B	6.17 b	6.83 b	34.18 ba	2.78 c	0.209 b
C	6.01 b	3.72 c	31.43 b	3.14 bac	0.300 a
D	6.16 b	6.69 ba	40.07 a	3.36 a	0.284 a
E	6.17 b	5.72 b	38.89 a	2.95 bc	0.218 b
F değeri	12.89***	8.22***	2.93*	3.00*	6.06**
LSD _{0.05}	0.28	53.93	1.43	0.36	0.065
I ²	6.29 a	6.67 a	43.42 a	3.35 a	0.262 a
II	6.17 b	5.48 b	30.51 b	2.81 b	0.228 b
F değeri	3.97*	6.84**	39.05***	22.13***	4.47*
LSD _{0.05}	0.12	0.89	4.08	0.23	0.03

^a, Uygulamalara göre elde edilen ortalamalar için n = 32, derinliğe göre elde edilen ortalamalar için n = 80'dir. ¹A, Kontrol; B, 15 yıl önce ıslah edilen; C, Ot öldürücü ile çalıları öldürülen; D, Dozerle çalıları sökülün; E, Uzun yıllar tarım yapılmaktayken yeniden ıslah edilen mera alanlarını göstermektedir. ² I, 0-15 cm derinlikten alınan örnekler; II, 15-30 cm derinlikten alınan örnekleri göstermektedir. [#], Farklı harfler aynı sütündeki farklı grupları simgelemektedir. ***, P<0.001; **, P<0.01; *, P<0.05 önem derecelerini göstermektedir.

Üreaz enzimi üreinin CO_2 ve NH_3 'a hidrolizini katalize eden enzimdir (Dick 1994). Hofmann ve Hoffmann (1966) toprakları üreaz enzimini aktivitelere göre düşük (<8), normal (8–16) ve yüksek (>16) terimleriyle 3 düzeye ayırmıştır. Bu kriterlere göre, mera alanlarının tamamının yüksek üreaz seviyesinde olduğu görülmüştür. Üreaz ve mikroorganizma sayılarının C uygulamasında en az olduğu ve en yüksek değerlerin kontrol uygulamasında olduğu görülmüştür. Bu durumun C uygulamasında ot öldürücülerin kullanılmasına bağlanmamalıdır. Üreaz ve mikroorganizma sayılarının düşük pH ile ilişkili olabileceği düşünülebilir (Dick 1994). Çünkü ilaçlama satih ilaçlaması değil, münferiden çalı yeşilken taç bölgesine yapılmıştır, yani topraktan mümkün olduğu kadar uzak tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca diğer uygulamalarda da C alanına göre yüksek biyolojik aktiviteler bulunmuştur. Yapılan bu çalışmada, üst toprakların enzim aktiviteleri ve mikroorganizma sayıları alt topraklara göre yüksek değerler göstermiştir. Kadioğlu (2007)'nin incelediği toprakların A horizonlarında benzer sonuçlara rastlanmıştır.

Mikroorganizmalar tarafından üretilen ve toprak ortamında organik madde, killer ve kolloidler tarafından tutulan katalaz enzimi, bitki kökenli hidrojen peroksit (H_2O_2) bileşimini su ve oksijene parçalar (Dick 1994). Toprakta mikroorganizma sayıları ile enzim aktiviteleri arasında bir ilişki olmasına rağmen toprakların C ve N kapsamları gibi birçok özelliğini birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmada, katalaz enzim aktivitesi mikroorganizma sayıları gibi yüzeyde daha fazla ölçülmüştür. Benzer sonuçlara uzun süre işlenen ve işlenmeyen topraklarda Sebastian et al (2010)'ın yaptıkları çalışmada rastlanmıştır. Araştırmacılar; derinlik arttıkça katalaz enzim aktivitesinin azaldığını, bu alanlardan katalaz enzimi en yüksek olanların işlenmeyen alanlar olduğunu belirtmişlerdir. Toprakta mikroorganizmaların temel yapı taşları olan karbon ve azot elementlerinin topraktaki değişimleri mikroorganizma sayılarını doğrudan etkileyen en önemli unsurlardandır (Eldor 2007). Bu nedenle karbon ve azot özellikleri biyolojik özelliklere dâhil edilmiştir.

İslah uygulamaları bakımından D ve E alanlarının kontrole göre mikroorganizma sayıları düşük olmasına rağmen, bu uygulamaların karbon ve azot içerikleri yüksek bulunmuştur. Fidan (2002)'in ıslah konusunda Elaziz mera topraklarında yaptığı çalışmasına göre; korunga bitkisi ekilen, toprak işlenmesi ve gübreleme yapılan alanlarda toprakta azot miktarı önemli derecede artmıştır.

Toplam karbon içeriği en fazla D uygulamasında belirlenmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak bu uygulamanın kuru ot veriminin yüksekliği (Özaslan Parlak et al 2011a) nedeni ile toprağa kök ve saplarla dönen organik madde miktarının fazla olmasıyla ilişkilendirilebilir. Bu tür yapay meralarda ot veriminin yüksek olduğuna dair araştırmalar (Gökkuş et al 2011; Fıncıoğlu et al 2007; Oğuz 2012; Çetiner 2009) bulunmaktadır.

3.3. Toprak fiziksel özellikleri

Toprak fiziksel özelliklerinden agregat stabilitesi, kum-silt-kil yüzdeleri, kuru hacim ağırlığı ve tane yoğunluğu özellikleri ıslah uygulamaları ve derinlik farklarına göre önemli değişimler göstermiş (Çizelge 5); bünye özelliklerinde uygulamalar ve derinlikler arasında istatistikî farklar gözlenmiştir. Bünye üçgenine uygulanan kum, silt ve kil miktarlarına göre A ve E alanları kil (C), diğer alanlar killi tın (C L) bünye sınıfına girmişlerdir.

Toprak fiziksel özellikleri incelendiğinde (Çizelge 5); üst toprakların agregat stabilitesi, kuru hacim ağırlığı ve tane yoğunluklarının yüksek olduğu, kum, silt ve kil yüzdeleri bakımından ise toprak derinliklerinin önemsiz olduğu görülmüştür. Toprak fiziksel özellikleri ıslah uygulama alanlarına göre incelendiğinde, C tipi ıslah alanının en yüksek dayanıklı agregatlara sahip olduğu görülmüştür. Diğer uygulamalar arası fark önemsiz olmuştur. C tipi ıslah alanında ot öldürücülerle çalı mücadelesi yapıldıktan sonra çalılardan boşalan yerlere mera bitkileri ekimi yapılmıştır. Bu alanda topraklarının gerek kil ve gerekse karbon içerikleri diğer uygulamalardan düşük olmasına rağmen, doğal ot vejetasyonunun korunmuş olması gelişmiş kök sistemlerine neden olabilir. Gelişmiş kökler ise agregat stabilitesini artıran unsurlardandır.

Çizelge 5- Toprak fiziksel özelliklerinin ıslah tipi ve toprak derinliğine göre değişimi

Table 5- Variation of soil physical characteristics with reclamation process and soil depth

Uygulama tipi/ Toprak derinliği ^a	Agregat stabilitesi (%)	Kum (%)	Silt (%)	Kil (%)	Kuru hacim ağırlığı (g cm ⁻³)	Tane yoğunluğu (g cm ⁻³)
A ¹	13.64 b [#]	33.17 c	20.65 c	46.18 a	1.19 a	2.64 b
B	18.68 b	39.20 b	22.45 bc	38.35 b	1.23 a	2.76 b
C	36.69 a	43.49 a	25.29 ba	31.22 c	1.30 a	2.69 b
D	18.79 b	32.87 c	27.92 a	39.21 b	1.22 a	3.04 a
E	13.10 b	27.43 d	27.41 a	45.16 a	1.18 a	2.84 a
F değeri	21.96***	30.05***	7.35***	20.81***	6.33***	3.93**
LSD _{0.05}	7.57	3.17	3.24	3.69	0.17	0.22
I ²	22.14 a	35.67	24.09	40.24	1.20 b	2.87 a
II	18.23 b	34.79	25.40	39.81	1.25 a	2.72 b
F değeri	4.55*	0.76 ^{bd}	1.60 ^{bd}	0.13 ^{bd}	5.31*	4.47*
LSD _{0.05}	3.63	-	-	-	0.04	0.14

^a, Uygulamalara göre elde edilen ortalamalar için $n = 32$, derinliğe göre elde edilen ortalamalar için $n = 80$ 'dir. ¹A, Kontrol; B, 15 yıl önce ıslah edilen; C, Ot öldürücü ile çalıları öldürülen; D, Dozerle çalıları sökülün; E, Uzun yıllar tarım yapılmaktayken yeniden ıslah edilen mera alanlarını göstermektedir. ² I, 0-15 cm derinlikten alınan örnekler; II, 15-30 cm derinlikten alınan örnekleri göstermektedir. [#], Farklı harfler aynı sütundaki farklı grupları simgelemektedir. ***, $P < 0.001$; **, $P < 0.01$; *, $P < 0.05$ önem derecelerini göstermektedir.

Meralarda vejetasyon farklılıkları, tarım alanlarına göre daha heterojendir (Özaslan Parlak et al 2011b). Vejetasyondaki farklılıklar, toprak agregat stabilitesinin lokasyondan lokasyona farklı olmasına neden olmaktadır. Toprak karbonu ve agregat stabiliteyi arasındaki korelasyonlar farklı olmuştur. Benzer sonuçlar Kavdır et al (2005) tarafından da belirtilmiştir. Toprak agregat stabilitesi üzerine kil içeriğinin etkisi, toprak organik karbon içeriğine göre de değişmektedir (Kavdır et al 2004). Merkezi İran bölgesinde Nael et al (2004) tarafından yapılan çalışmaya göre; mera alanlarında kontrollü (korunmalı) otlatılan ve otlatılmayan alanlarda toprak kalite kriterlerinden infiltrasyon hızı, agregat stabilitesi, toplam N, toplam C ve mikrobiyal solunum özelliklerini incelemişler ve korumasız meralarda bu özelliklerden agregat stabilitesinin olumsuz etkilendiğini diğer özelliklerdeki değişimlerin önemsiz olduğunu belirtmişlerdir.

İncelenen mera alanlarında kuru hacim ağırlığı ve tane yoğunlukları uygulamalara göre değişmemiş, ancak bu özelliklerin toprak

derinliğine göre değişimi önemli olmuştur. Üst topraklarda her iki özellik de yüksek seviyelerde bulunmuştur. Çetiner (2009), aynı bölgede yapay mera alanında incelediği toprak özelliklerinden hacim ağırlığı, organik madde, toplam azot ve alınabilir potasyumun arttığını belirtmiştir. Tane yoğunluğu dozerle çalıları sökülün alanda (D) en yüksek, ot öldürücü kullanılan alanda (C) ise en düşük değerlerde olmuştur. Rusya mera alanlarında yapılan bir çalışmada, toprakların hacim ağırlığının yılaşırı otlatmaya göre her yıl otlatılan meralarda arttığı belirtilmiştir (Mikhailova et al 2000). Benzer şekilde Ötaz et al (2003) yaptıkları çalışmada, Erzurum şartlarında sürekli aşırı otlatılan bazı meralarda, bitki desininin değiştiğini ve mera topraklarının erozyon katsayısının kısmen arttığını belirtmişlerdir.

Toprak kalitesi hakkında fikir veren bir başka çalışmada, araştırmacılar Erzurum ili tarla koşullarında 30–60 cm toprak derinliklerinde toprak penetrasyon direncini ölçerek bazı toprak özellikleri ile ilişkisini sorgulamışlardır. Araştırmacılar;

toprakların penetrasyon direncinin düşük olduğu alanlarda kütle yoğunluğunun da düşük değerler aldığı, toprakların agregat stabilitesi, nem içerikleri ve organik madde içeriklerinin ise yüksek değerler aldığı belirtilmiştir (Turgut & Öztaş 2012).

4. Sonuçlar

Farklı uygulama yapılarak ıslah edilen Hacipehlivanlıköyü merasında ıslah uygulamalarının etkisi incelenen tüm toprak özellikleri bakımından önemli seviyelerde olmuştur. Derinlik etkisi bakımından, incelenen özelliklerden kireç yüzdesi ve bünye öğeleri dışında tüm özelliklerin değiştiği görülmüştür. Uygulama ve derinliğin birlikte etkisi (interaksiyonu) önemsiz bulunmuştur.

Türkiye’de meraların ıslahına devam edileceği son zamanlarda çıkarılan kanun ve yönetmeliklerden anlaşılmaktadır. Mera ıslahında yalnızca ot verimi merkezli düşüncelerden kaçınılması, bu kapsamda toprağa yapılan müdahalelerin sonuçları konusunda çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Türkiye topraklarının % 80’den fazlası erozyona hassas durumdadır (Dizdar 2003). Türkiye meraları da bu kapsamda değerlendirilerek mera topraklarının kalite kriterleri konusunda çok sayıda çalışma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların meraya müdahale etmeden önce yapılması durumunda daha önemli bilgiler elde edilebilir. Toprak kalite özelliklerinin ıslah uygulamaları sonrası değişiminin incelendiği bu tür çalışmalar yanında, öngörü çalışmaları ve uzun yıllardaki değişimlerin de izlemesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kırılgan bir ekosistem aracı olan mera alanlarındaki toprakların kalitesini, mera ıslah yöntemlerinin etkileyebileceği unutulmamalıdır. Toprak sınırlı bir kaynaktır, korunmalı ve sürdürülebilirliğini sağlayacak her türlü çalışma desteklenmelidir.

Teşekkür

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu’na ekonomik desteklerinden dolayı teşekkür ederiz (Proje No: 2007/88). Ayrıca

düzeltilmelerinden dolayı Sayın Dr. Yakup ÇIKILI ve Dr. Mevlüt AKÇURA’ya teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- Allison L E & Moodie C D (1965). Carbonate. In: C A Black (Eds), *Methods of soil analysis, Part 2: Chemical and microbiological properties*, Madison, Wisconsin, USA, pp. 1379–1396
- Beck T H (1971). Die Messung Katalasen Aktivitaet Boden Z. *Pflanzenernaehai Sodek* **130**: 68–81
- Blake G R & Hartge K H (1986). *Bulk density*. In: A Klute (Eds), *Methods of soil analysis. Part 1. 2nd edition, Agron. Monogr. 9*, ASA and SSSA, Madison WI, USA, pp. 363–376
- Bouyoucos G J (1951). A recalibration of hydrometer for making mechanical analysis of soils. *Agronomy Journal* **43** (9): 435–438
- Çetiner M (2009). Yapay bir merada otlatmanın bitki örtüsü ve toprak özelliklerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Çanakkale
- ÇOB (2007). <http://www.bcs.gov.tr/documents/UBSEP-2007.pdf>, *Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejik Eylem Planı*, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (Erişim Tarihi 27.07.2013)
- Dick R P (1994). Soil Enzyme Activity as an Indicator of Soil Quality. In: J W Doran et al (Eds), *Defining soil quality for a sustainable environment*, Madison WI, USA, pp. 107–125
- Dizdar M Y (2003). Türkiye’nin Toprak Kaynakları. TMMOB Mühendisleri Odası, Teknik Yayınlar Dizisi No:2, Ankara.
- Eldor A P (2007). Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. Academic Press, USA
- Fıncıoğlu H K, Seefeldt S S & Sahin B (2007). The effects of long-term grazing exclosures on range plants in the Central Anatolian Region of Turkey. *Environmental Management* **39** (3): 326–337
- Fidan C (2002). Doğu Anadolu (Elaziz) mera topraklarının ıslahı üzerine araştırmalar. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), İstanbul.
- Gökkuş A, Alatürk F & Özasan Parlak A (2011). Çanakkale’de otlatma alanlarının hayvancılıktaki önemi. *Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği)*: 10–11 Ocak, Çanakkale, s. 71–79

- Gökkuş A, Baytekin H, Hakyemez B H & Özer İ (2001). Çanakkale'nin sürülüp terk edilen çalılı meralarında yeniden bitki gelişimi. *Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi. Cilt: III, Çayır Mera Yem Bitkileri*: 17–21 Eylül, Tekirdağ, s. 13–18
- Heady H (1973). Structure and function of climax. *Arid Shrublands, Proc. of Third Workshop of the United States/Australia Rangelands Panel*, March 26–April 5, Tuscon, Arizona, 73–80
- Hoffmann E & Teicher K (1961). Ein kolorimetrisches Verfahren zur Bestimmung der Ureaseaktivität in: B6den. *Z Pflanzenernaehr Dtingung Bodenkd* **95**: 55–63
- Hofmann E & Hofmann G (1966). Determination of soil biological activity with enzymatic methods. *Advanced Enzymology* **28**: 365–390
- Holecck J L, Pieper R D & Herbel C H (2004). Range Management: Principles and Practices, 5th edition. Pearson Education Inc, Upper Saddle River, New Jersey
- Jackson M L (1958). Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, USA
- Kadioğlu B (2007). Bazı toprak kalite indeks parametrelerinin işlemeli tarım ve mera alanlarında farklı topoğrafik pozisyonlara bağlı olarak değişimi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Erzurum
- Kavdır Y, Ekinci H, Yüksel O & Mermut A (2005). ¹³C CP/MAS–NMR spectra of soil organic matter and stability of soil aggregates affected by forest wildfires in Canakkale, Turkey. *Geoderma* **129**: 219–229
- Kavdır Y, Özcan H, Ekinci H, Yigini Y & Yüksel O (2004). The influence of clay content, organic carbon and land use types on soil aggregate stability and tensile strength. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, **28** (3): 155–162
- Kemper W D & Rosenau R C (1986). *Aggregate Stability and Size Distribution*. In: A Klute (Eds), *Methods of Soil Analysis, Part I. Physical and mineralogical methods*. Madison WI, USA, pp: 425–442
- Kirsten W J (1983). Organic Elemental Analysis. Academic Press, New York, USA
- Kökten K (2005). Çukurova bölgesinde maki tipi vejetasyonun değişik mera islahı yöntemleriyle geliştirilme olanakları. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Adana
- Lal R (2011). Sequestering carbon in soils of agro-ecosystems. *Food Policy* **36**: 33–39
- Langdale G W, West L T, Bruce R R, Miller W P & Thomas A W (1992). Restoration of eroded soil with conservation tillage. *Soil Technology* **5**: 81–90
- Lavorel S, Rochette C & Lebreton J D (1999). Functional groups for response to disturbance in Mediterranean old fields. *Oikos* **84**: 480–498
- Liu Y, Horisawa S & Mukohata Y (2010). Effect of seed coating on plant growth and soil conditions: A preliminary study for restoration of degraded rangeland in the inghai–Tibetan Plateau. *Grassland Science* **56**: 145–152
- Lund H G (2007). Accounting for the World's Rangelands. *Rangelands* **29** (1): 3–10
- MGM (2013). Meteoroloji Genel Müdürlüğü. <http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/> (Erişim Tarihi 26.07.2013)
- Mikhailova E A, Bryant R B, Cherney D J R, Post C J & Vassenev I I (2000). Botanical composition, soil and forage quality under different management regimes in Russian grasslands. *Agriculture, Ecosystems and Environment* **80**: 213–226
- Montalvo J, Casado M A, Levassor C & Pineda F D (1993). Species–diversity patterns in mediterranean grasslands. *Journal of Vegetation Science* **4**: 213–222
- Mülayim M (1980). Tabii merada herbisitlelerle hazırlanan tohum yatağında suni mera kurma olanakları üzerinde araştırmalar. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Ankara
- Nael M, Khademi H & Hajabbasi M A (2004) Response of soil quality indicators and their spatial variability to land degradation in central Iran. *Applied Soil Ecology* **27**: 221–232
- Nannipieri P (1994). The potential use of soil enzymes as indicators of productivity, sustainability and pollution. In: C E Pankhurst, B M Double, V V S R Gupta & P R Grace (Eds), *Soil Biota Management in Sustainable Farming Systems*, CSIRO East Melbourne, pp. 238–244
- Nortcliff S (2002). Standardisation of soil quality attributes. *Agriculture, Ecosystems & Environment* **88** (2): 161–168
- Oğuz İ (2012). The Effect Of Planting, Protection And Fertilization Applications On Vegetation, Soil Properties, Soil Loss And Soil Water Content in Central

- Anatolia Degraded Rangeland. *Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences* **7** (3): 167–173
- Ojima D S, Dirks B O M, Glenn E P, Owensby C E & Scurlock J O (1993). Assessment of C budget for grasslands and drylands of the world. *Water Air Soil Pollution* **70**: 95–109
- Olsen S, Cole C, Watanabe F & Dean L (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circular Nr: 939, US Gov. Print. Office, Washington DC, USA
- Özaslan Parlak A (2011). Çanakkale yöresinde çalılı meraların önemi. *Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği)*: 10–12 Ocak, Çanakkale, s. 489–496
- Özaslan Parlak A, Gökkuş A & Hakyemez B H (2011a). Değişik yöntemlerle ıslah edilen meranın bitki örtüsündeki değişim (yayınlanmamış). ÇOMÜ, 2007/89 no'lu proje raporu
- Özaslan Parlak A, Gökkuş A, Hakyemez B H & Baytekin H (2011b). Forage yield and quality of kermes oak and herbaceous species throughout a year in Mediterranean zone of western Turkey. *The Journal of Animal & Plant Sciences* **21** (3): 513–518
- Öztaş T, Koc A & Comaklı B (2003). Changes in vegetation and soil properties along a slope on overgrazed and eroded rangelands. *Journal of Arid Environments* **55**: 93–100
- RG (1998). <http://www.kentli.org/yasa/4342.htm>, 4342 Sayılı Mera Kanunu, Resmi Gazete 28.02.1998–23272 (Erişim Tarihi: 27.07.2013)
- Richards L A (1954). Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA Agriculture Handbook 60, Washington DC, USA
- SAS (2000). SAS. STAT User's guide. 9th version, SAS Inst. Inc. Cary, NC
- Sebastian U, Sabine T, Hofmann B & Christen O (2010). Biological soil properties in a long-term tillage trial in Germany. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science* **173** (4): 483–489
- Seligman N G (1996). Management of Mediterranean grasslands. In: J Hodgson & A W Illius (Eds), *The Ecology and Management Of Grazing Systems*, CAB International, Wallingford, UK, pp. 359–392
- Sternberg M, Gutman M, Perevolotsky A, Ungar E D & Kigel J (2000). Vegetation response to grazing management in a Mediterranean herbaceous community: A functional group approach. *Journal of Applied Ecology* **37**: 224–237
- Stoddart L A, Smith A D & Box T W (1975). Range Management (3rd ed.). McGraw-Hill Book Co., New York, USA
- Şekercioğlu C H, Anderson S, Akçay E, Bilgin R, Can O E, Semiz G, Tavşanoğlu C, Yokeş M B, Soyumert A, İpekdal K, Sağlam İ K, Yücel M & Dalfes H N (2011). Turkey's globally important biodiversity in crisis. *Biological Conservation* **144** (12): 2752–2769
- Turgut B & Öztaş T (2012). Toprak penetrasyon direncine etki eden toprak özelliklerinin yersel değişim paternlerinin jeostatistiksel yöntemlerle belirlenmesi. *Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agriculture Sciences* **18** (2): 115–125
- Winogradsky S N (1952). Soil Microbiology. *Problems and Methods. USSR Academy of Sciences*, Moscow (in Russian).
- Wollum A G (1982). Cultural Methods for Soil Microorganisms. In: A L Page et al (Eds), *Methods of soil analysis, 2nd edition, Part 2, Chemical and Microbiological Properties*, SSSA Book Series (9), Madison WI, USA, pp. 781–802
- Zavala L M, Granged A J P, Jordán A & Bárcenas-Moreno G (2011). Post-fire evolution of soil properties and vegetation cover in a Mediterranean heathland after experimental burning: A 3-year study. *Geoderma* **164**: 85–94