

Jeomorfolojik Arařtırmalar Dergisi

Journal of Geomorphological Researches



© Jeomorfoloji Derneđi

www.dergipark.gov.tr/jader


E - ISSN: 2667 - 4238


Arařtırma Makalesi / Research Article

TRAKYA YARIMADASI'NIN JEOMORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ

Geomorphometric Features of Thrace Peninsula

Emre ÖZŞAHİN^a & İlker EROĞLU^b

^a Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Tekirdađ - Türkiye
eozsahin@nku.edu.tr  <https://orcid.org/0000-0001-8169-6908> (sorumlu yazar / corresponding author)

^b Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Tekirdađ - Türkiye
ieroglu@nku.edu.tr  <https://orcid.org/0000-0003-4601-024X>

Makale Tariđesi

Geliř 09 Mayıs 2018
Düzenleme 19 Temmuz 2018
Kabul 28 Eylül 2018

Article History

Received 09 May 2018
Received in revised form 19 July 2018
Accepted 28 September 2018

Anahtar Kelimeler

Jeomorfometri, Topoğrafya, Trakya Yarımadası

Keywords

Geomorphometry, Topography, Thracian Peninsula

Atıf Bilgisi / Citation Info

Özşahin, E. & Erođlu, İ. (2018). Trakya Yarımadası'nın jeomorfometrik özellikleri, *Jeomorfolojik Arařtırmalar Dergisi*, 2018 (1): 87-98

ÖZET

Jeomorfometri, yeryüzünün topoğrafyasına ait özellikleri çeřitli türden ölçümler sayesinde matematiksel veya istatistiksel yöntemlerle açıklamaya çalışan analitik-kartoğrafik bir yaklaşımdır. Yerbilimleri alanında artan teknik imkânlar ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tekniklerinin yaygınlaşması sayesinde önem kazanan bu yaklaşım, topoğrafyanın dijital sunumunu oluşturan SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) sayesinde daha pratik bir şekilde uygulanmaktadır. Böylece hem somut verilere ulařılmakta hem kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde edilmekte hem de analitik yorumlar yapılabilir. Bu çalışmada, daha detaylı ve yeni bir perspektiften Trakya Yarımadası'nın jeomorfometrik özelliklerinin ana çizgileriyle açıklanması amaçlanmıştır. Çalışma, hem Avrupa'nın ve Türkiye'nin jeomorfolojik özelliklerinin anlaşılmasına, hem de Trakya Yarımadası'nın jeomorfolojik oluşum ve gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Çalışma kapsamında, topoğrafyanın anlaşılmasına yönelik olarak yükselti, eğim, yarılma derecesi, hipsometrik eğri ve integral gibi başlıca morfolojik analizler ve amaca göre belirlenen indis hesaplamaları kullanılmıştır. Bu bağlamda yapılan analizler, CBS tekniklerine dayalı olarak 5 m çözünürlüğündeki SYM kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu maksatla yararlanılan SYM, özellikle ulusal literatürdeki jeomorfometri çalışmalarında řu ana kadar kullanılmıř en yüksek çözünürlüklü veri setidir. Ayrıca çalışmanın analiz çıktıları, gerekli görülen alanlarda arazi çalışmalarıyla kontrol edilmiştir. Jeomorfometrik analiz sonuçlarına göre yükselti farkının 1031 m olduđu Trakya Yarımadası, 155.68 m ortalama yükseltiye ve % 3.7 ortalama eğime sahip düz ve düze yakın topoğrafya özellikleri göstermektedir. Ayrıca iç büyük bir hipsometrik eğrinin varlığına yol açan topoğrafik koşullar, 0.15 hipsometrik integral değeriyle olgun bir karakterdedir. Bu bulgular, Trakya Yarımadası'nın jeomorfometrik özellikleri bakımından Türkiye genelinden ve Anadolu Yarımadası'ndan oldukça farklı olduđuna işaret etmektedir.

ABSTRACT

Geomorphometry is an analytical-cartographic approach that tries to explain the features concerning the topography of earth through mathematical and statistical methods by various measurements. Gaining importance in recent years because of increased technical facilities and GIS (Geographic Information Systems) techniques becoming widespread in earth sciences, this approach has a more practical application thanks to DEM (Digital Elevation Model), providing the digital presentation of topography. In this way, concrete findings are reached; quality and sound results are obtained; and analytical interpretations can be made. The purpose of this study is to outline the geomorphometric features of the Thracian Peninsula from a more elaborated and new perspective. The study makes important contributions to understanding both the geomorphologic features of Europe and Turkey and the geomorphologic formation and development of the Thracian Peninsula. Within the scope of the study, main morphometric analyses including elevation, slope, incision level,

hypsometric curve, and integral were made, and index calculations fit for the purpose were carried out to understand the topography of the area. Such analyses were conducted by use of 5 m resolution DEM based on GIS techniques. DEM, used for the said purpose, is the highest resolution dataset used so far in geomorphometric studies, especially in those conducted in Turkey. The analysis results obtained in the study were checked with field surveys conducted in the areas where they were considered necessary. According to the geomorphometric analysis results, the Thracian Peninsula, where rise is 1031 m, has smooth and close to smooth topographic features with an average elevation of 155.68 m and an average slope of 3.7%. In addition, topographic conditions, leading to the existence of a concave hypsometric curve, have a mature character with a hypsometric integral value of 0.15. These findings show that the Thracian Peninsula is quite different from Turkey as a whole and the Anatolian Peninsula in terms of geomorphometric features.

© 2018 Jeomorfoloji Derneđi. Tüm hakları saklıdır. All rights reserved.

GİRİŐ

Topođrafya, yeryüzündeki doğal sistemlerin işleyişini kontrol eden anahtar bir faktördür (Summerfield ve Hulton, 1994; Montgomery ve Brandon, 2002; Das vd., 2016). Topođrafik özelliklerin daha iyi bir şekilde açıklanması ve bu özelliklerin doğal sistemlerle ilişkisinin ise daha doğru bir şekilde kurulması için, çeşitli türden nicel analizlere ihtiyaç vardır (Pike, 2000; Lague vd., 2003; Phillips, 2006; 2009; Ahmed vd., 2010). Dolayısıyla yeryüzünün topođrafik özelliklerinin sayısal olarak ifade edilmesi için (Chorley, 1957; Mark ve Smith, 2004), matematiksel veya istatistiksel yöntemlere dayalı olarak yapılan bu tür analizlerin bilimi de jeomorfometri olarak tanımlanmıştır (Pike, 1995, 2000; Rasemann vd., 2004). Teorik ve uygulamalı jeomorfoloji arasındaki çalışma alanında kalan (Özşahin, 2015) ve yakın zamanda jeomorfolojinin en önemli araçlarından biri olan (Bekarođlu, 2013) jeomorfometri, topođrafyanın dijital sunumunu oluşturan SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) kullanılarak elde edilen özelliklerin bilgisayar ortamında düzenlenmesini konu olarak analitik-kartođrafik bir yaklaşımdır (Tobler, 1976, 2000).

Yerbilimleri alanında artan teknik imkânlar ve CBS (Cođrafı Bilgi Sistemleri) tekniklerinin yaygınlaşması sayesinde önem kazanan bu yaklaşım, farklı çözünürlükteki SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) verileri sayesinde daha pratik bir şekilde uygulanmaktadır. Böylece hem kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde edilmekte hem de detaylı ve analitik yorumlar yapılabilmektedir. Ayrıca gerek topođrafyanın

ve doğrudan da yerşekillerinin özellikleri, oluşumu ve gelişimi konusunda daha somut verilere ulaşılmakta gerekse mekânsal planlamalarda daha sağlıklı sonuçlar alınmaktadır.

Trakya Yarımadası'nın jeomorfometrik özelliklerinin açıklanmasını daha detaylı ve güncel bir perspektiften ele alan bu çalışma, hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin jeomorfolojik özelliklerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı için önem arz etmektedir. Aslında bugüne kadar Türkiye'nin tamamının jeomorfometrik özelliklerini konu alan çalışmalar yapılmıştır (Tanođlu, 1947; Bilgin, 1957a; 1957b; Oakes, 1958; Tunçdilek, 1969; 1985; Erol, 1983; 1989; Erinç, 1993; Elibüyük ve Yılmaz, 2010; Koç ve Kesmen, 2010; Koç, 2013; Atalay, 2017). Saha büyüklüğü, malzeme, mevcut teknoloji ve teknik nedenlerden dolayı bu çalışmaların genelinin çok detaylı bir şekilde hazırlanmadığı söylenebilir.

Diđer yandan Trakya Yarımadası dâhilinde yapılmış çalışmalar ise daha çok genel jeomorfolojik özelliklerin açıklanmasına yöneliktir (Ardel, 1956; 1957; 1960; Chaput, 1974; Erinç vd., 1985; Dönmez, 1990; Altın, 2000; Ertek, 2011). Bununla birlikte Kurter vd. (1985), Trakya Yarımadası'nın tamamını yüzölçümü ve yükselti basamakları açısından incelemişlerdir. Bu çalışma, ulusal literatürde şu ana kadar kullanılmamış çözünürlükte büyük ölçekli (1:10.000) bir veri seti üzerinden yürütülmüş olup, daha önceki çalışmalarda elde edilemeyen detayda sonuçlar sunmayı amaçlaması bakımından önceki çalışmalardan

ayrılmaktadır. Aynı zamanda bu alıřma, Trakya Yarımadası öleğinde mikro morfolojik analizler konusunda gerekleřtirilmiř ilk arařtırma örneđi olarak deđerlendirilebilir. alıřma kapsamında üretilen veriler, evvelce Türkiye'nin morfometrik özelliklerinin açıklanmasına yönelik elde edilmiř sonuçlar Trakya Yarımadası dâhilinde kıyaslanıp, kontrol edilmiřtir. Yine bu alıřma, Trakya Yarımadası'ndaki topođrafyanın ve yerřekillerinin oluřum ve geliřiminin daha detaylı bir řekilde açıklanması bakımından da öneme sahiptir.


İNCELEME ALANININ KONUMU VE GENEL

ÖZELLİKLERİ

İnceleme alanı, Türkiye'nin öncelikle Avrupa kıtasındaki daha sonra da Balkan Yarımadası'ndaki uzantısını oluřturan Trakya Yarımadası'dır (řekil 1). 26°02'02" – 29°08'23"

Bu alıřmadaki en büyük sınırlılık, elde edilen verilerin Trakya Yarımadası bütünündeki sonuçları anlamlandıracak örnek bir model alanda tekrarlanmaması olmuřtur. Ancak kendi bütününde etkin bir CBS kullanımına örnek teřkil eden bu alıřma doğrudan eski arařtırma sonuçlarını kıyaslamaya yönelik bir řekilde hazırlanmıřtır. Dolayısıyla bu tarz bir karşılařtırmaya yönelik giriřimin ayrı bir alıřma olarak sunulması daha yerinde olacaktır. Bu durumda hem bir ihtiyacı karşılayacak hem de etkin bir yerel örnek teřkil edecektir.

dođu boylamları ile 40°01'29" – 42°07'04" kuzey enlemleri arasında kalan bu saha, esasında Avrupa kıtasının dođu uzantısını teřkil etmektedir (řekil 1).




řekil 1. İnceleme alanının lokasyon haritası

İnceleme alanında Prekambriyen'den günümüze kadar süren geniş bir zaman aralığında oluřmuř farklılık gösteren litolojik birimler yayılıř göstermektedir. Kuzey Anadolu Fayı'nın etkisi altında bulunduđu için tektonik açıdan oldukça etkin olan bu saha, Neotektonik hareketlerin kontrolünde řekillenmiřtir. Bařta Ergene Nehri ve kolları olmak üzere irili ufaklı birçok akarsuyun oluřturduđu aşındırma ve biriktirme faaliyetleri neticesinde inceleme alanındaki ana jeomorfolojik özellikler belirlemiřtir. Bu bağlamda flüvyal etken ve süreçler vasıtasıyla meydana gelmiř hâkim topođrafik yapıyı oluřturan plato rölyefi de

ortaya çıkmıřtır (řekil 2). Ayrıca dalga ve volkanizma ile ayrışma etkinliđi neticesinde oluřmuř farklı topođrafya řekillerinin bulunduđu bu sahada, son yıllarda insan etkisiyle meydana gelmiř antropojenik yerřekillerine de rastlamak mümkündür. Sıcaklık koşullarında güneyden kuzeye belirgin bir düşüşün görüldüđu inceleme alanında, kıyılarda daha nemli iklim koşulları hüküm sürerken, iç kesimlerde daha karasal řartlar etkili olmaktadır. Doğrudan iklim üzerinde yönlendirici olan bu koşullar, dolaylı olarak toprak ve bitki örtüsünün gelişim řartlarını etkilemiřtir. İnceleme alanında ana çizgileriyle

deęinilen bütn bu doęal faktrler, deęiřik llerde de olsa nispeten topoęrafyanın genel

karakterinin řekil kazanmasında rol oynamıřtır.



řekil 2. İnceleme alanının farklı kesimlerine ait plato rlyefinden grnmler (a: Tekirdaę civarı, b: Muratlı civarı, c-d: Çorlu civarı)

VERİ VE YNTEM

Trakya Yarımadası'nın jeomorfometrik zelliklerinin ana izgileriyle ele alındıęı bu

alıřma kapsamında, topoęrafyanın anlaşılmasına ynelik olarak ykselti, eęim, yarıлма derecesi, hipsometrik eęri ve integral gibi bařlıca morfometrik analizler ve amaca

göre belirlenen indis hesaplamaları kullanılmıřtır.

Çalıřmadaki analizler, CBS yazılımlarından biri olan ArcGIS/ArcMAP 10.5 paket programı kullanılarak 5 m çözünlüğündeki SYM verisine dayalı bir řekilde gerekleřtirilmiřtir. Yükselti ve eęim analizleri, ilgili CBS programında yer alan Spatial Analyst modülüyle yapılmıřtır. Yarılma derecesi, inceleme alanı kapsayan grid sistemde yer alan her birim alanda bulunan en yüksek ve en alak noktalar arasındaki farkın metre (m) cinsinden hesaplanmasıyla tespit edilmiřtir. Hipsografik eęri, SYM verisinin CBS programındaki Area and Volume Statistics modülü yardımıyla 50 m yükselti aralıęı dikkate alınarak belirlenmiřtir. Daha sonra elde edilen sonuçlar üzerinden de hipsometrik integral deęeri hesaplanmıřtır. Çalıřmanın

hesaplama ařamaları, Microsoft Office Excel 2016 yazılımıyla gerekleřtirilmiřtir.

Elde edilen çalıřma bulguları, arařtırma sonuçlarıyla kıyaslanmıřtır. Kıyaslama sırasında daha önceki arařtırma sonuçları arasında görölen farklılıklar göz ardı edilmiř veya ulařılan bulgular literatüre göre düzenlenmiřtir. Aslında hem bu çalıřma hem de dięer çalıřmalardan elde edilen veriler arasında ortaya çıkan bütün bu farklılıkların temeli, yapılan analizler esnasında yararlanılan veri tabanları veya çözünlüğüünün boyutunun farklı olmasından kaynakladıęı düşünölmektedir (Bilgin, 1957a: 142; Ko, 2013: 454). Ayrıca çalıřmanın analiz çıktıları, gerekli görölen alanlarda arazi çalıřmalarıyla da kontrol edilmiřtir. Tüm bu ařamalardan sonra elde edilen malzemeler düzenlenerek, çalıřma metni kaleme alınmıřtır.

BULGULAR VE TARTIřMA

Son yıllarda çeřitli yöntem ve teknikler kullanılarak gerekleřtirilen jeomorfometrik uygulamalar sayesinde topoęrafik özelliklere yönelik birçok açıklayıcı bilgi elde edilmektedir. Konu ve alan bakımından farklılık gösterse bile topoęrafik özelliklerin izahında bazı jeomorfik indislere daha sık bir řekilde başvurulmaktadır (Cürebali ve Erginal, 2007). Bu çalıřmada, jeomorfometri çalıřmalarında aęırlıklı olarak kullanılan yükselti, eęim, yarılma derecesi, hipsometrik eęri ve integral gibi başlıca jeomorfik indisler deęerlendirilmiřtir.

Yükselti

En alak noktası deniz seviyesi olan inceleme alanının, en yüksek noktası Yıldız (Istranca) Daęları üzerinde yer alan Mahya Tepedir (1031 m). Buna göre yükselti farkının 1031 m olduęu inceleme alanının ortalama yükselti ise 155.68 m'dir (řekil 3).

Bu çalıřma kapsamında tespit edilen yükselti deęerleri, daha önceki çalıřmalarda hem Trakya Yarımadası hem de Türkiye genelinde üretilmiř verilerle karřılařtırıldıęında çok anlamlı sonuçlara ulařılmaktadır (Tablo 1; 2).


1:25.000 ölekli topoęrafya haritaları üzerinden yapılmıř hesaplamalara göre ortalama yükseklięin 159.06 m olduęu Trakya

Yarımadasında, 0-250 m yükselti basamaęı % 82.7, 250-500 m yükselti basamaęı % 14.1 ve 500-1000 m yükselti basamaęı ise % 3.2 oranında alana sahiptir. Ayrıca Yıldız (Istranca) Daęları'nın zirve noktası, 1000 m'nin üzerinde olmasına raęmen, yükselti basamaklarının oranını deęiřtirmez (Kurter vd., 1985: 56).

Trakya Yarımadasının yükselti durumu Türkiye geneli ile karřılařtırıldıęında ise daha ilgin bir tablo ortaya çıkmaktadır. Zira yükselti kuřaklarına göre Türkiye için bildirilen deęerlerin oranı 1000 m'nin üzerinde artarken, inceleme alanında tam tersi bir durum hâkimdir. Nitekim inceleme alanında rakım arttıka yükselti basamaklarının kapladıęı alan daralmaktadır (Tablo 1). Keza 0-250 m yükselti kuřaęındaki oran Türkiye'de % 10-11 civarında iken, Trakya Yarımadası'nda % 82.9 deęerindedir (Tablo 1). Ayrıca Trakya yarımadası hem Türkiye geneline hem de Anadolu Yarımadası'na kıyasla daha düşük bir ortalama yükseklięe sahiptir (Tablo 2). Dolayısıyla Türkiye karasına nazaran Trakya Yarımadası'ndaki yükselti deęerleri genel olarak daha düşüktür. Ko (2013: 440) yükselti basamaklarında Anadolu ve Trakya yarımadaalarında görölen bu farklılıęın temel nedeninin topoęrafya řartlarındaki deęiřimlerle alakalı olduęunu belirtmiřtir.

İnceleme alanındaki yükselti deęerlerinin aęırlıklı olarak 250 m'nin altında kalmasından kaynaklanan bu durum, aynı zamanda sahadaki topoęrafyanın deniz seviyesine yakın bir karakterde olduęuna da iřaret etmektedir. Bu

nedenle Kurter vd. (1985: 56) Trakya Yarımadasının yüksek olmayan alçak düzlük ve daha ziyade platolardan meydana gelmiř bir blok řeklinde karakterize etmiřlerdir.



Şekil 3. İnceleme alanının yükselti basamakları haritası

Tablo 1. Türkiye ve Trakya Yarımadası'nın yükselti basamakları verilerinin karşılaştırılması

Lokasyon	Türkiye						Trakya Y.	
	Tanoęlu, 1947		BPD (Atalay, 2017'den)		Elibüyük ve Yılmaz, 2010		Bu çalıřma	
Yükselti basamakları (m)	Alan (km ²)	Oran (%)	Alan (km ²)	Oran (%)	Alan (km ²)	Oran (%)	Alan (km ²)	Oran (%)
0-250	79254	10.4	88892	11.4	82897	10.8	19768	82.9
250-500	53912	7.1	53721	6.9	54268	7.1	3271	13.7
500-1000	201999	26.6	196324	25.2	189249	24.6	814	3.4
1000->	424777	55.9	441639	56.6	443031	57.6	0.4	0.002
TOPLAM	759942	100	780576	100	769445	100	23854	100

Tablo 2. Türkiye, Anadolu ve Trakya yarımadalarnın ortalama yükseklikleri

Literatür	Ortalama Yükseklik (m)			
	Türkiye	Anadolu Y.	Trakya Y.	Trakya Y. (Bu çalıřma)
Tanoęlu, 1947	1132	1162	180	155.68
Koç, 2013	1140.6	1171.6	159.8	

Eęim

Eęim, topoęrafyanın genel karakteri, jeomorfolojik yapının çözümlenmesi ve yerşekillerinin tespiti bakımından önemli bir

parametredir. İnceleme alanında, hem iç hem de dış kuvvetlerin yaptıęı etki sonucunda birbirinden farklı eęim deęerleri meydana gelmiřtir (Şekil 4). Bu durum morfolojinin de řekillenmesinde belirleyici olmuřtur. İnceleme

alanındaki eđim zelliklerini daha anlamlı kılmak adına, Trkiye'nin genel topođrafyasını karakterize eden verilerle kıyaslamaya gidilmiřtir (Tablo 3). Ancak daha nce yapılmıř alıřmalardaki eđim sınıfları birbirini tutmadıđı

iin ilgili eserler yayın tarihleri dikkate alınarak eskiden yeniye dođru dzenlenmiř ve inceleme alanındaki eđim sınıfları da buna uygun bir řekilde gruplandırılmıřtır (Tablo 3).

Tablo 3. Trkiye ve Trakya yarımadası'nın eđim sınıfları verilerinin karřılařtırılması

Tundilek, 1969		Trkiye		Trakya (Bu alıřma)	
Eđim sınıfları (%)	Tanımlama	Alan (km²)	Oran (%)	Alan (km²)	Oran (%)
0-5	Dz ve hafif eđimli	65846	8	10929	46
5-10	Orta eđimli, hafif dalgalı	100386	13	4830	20
10-15	ok eđimli	125909	16	2760	12
15'den fazla	Dik eđimli	487864	63	5064	21
Toplam		780005	100	23584	100
Oakes, 1958		Trkiye		Trakya (Bu alıřma)	
Eđim sınıfları (%)	Tanımlama	Alan (km²)	Oran (%)	Alan (km²)	Oran (%)
0-1	Dz	62428	8	5798	25
1-3	Hafif eđimli	25105	3	2580	11
3-8	Eđimli	48361	6	5753	24
8-15	ok eđimli	15938	2	4388	19
15-40	ok dik eđimli	264862	34	4306	18
40'tan fazla	Hařın, sarp arazi	351813	46	758	3
Toplam		768507	100	23584	100
Elibyk ve Yılmaz, 2010		Trkiye		Trakya (Bu alıřma)	
Eđim sınıfları (%)	Tanımlama	Alan (km²)	Oran (%)	km²	%
0-1	Dz Yzeyler	4805	1	5798	25
1-2	Hafif Eđimli Dz Yzeyler	49175	7	1263	5
2-5	Hafif eđimli yzeyler	104957	14	3868	16
5-10	Eđimli yzeyler	130194	18	4830	20
10-20	Orta eđimli yzeyler	178982	25	4409	19
20-50	ok eđimli yzeyler	218387	30	3076	13
50-100	ok ok eđimli yzeyler	39014	5	335	1
100->	Dike yakın eđimli yzeyler	702	0,1	5	0,02
Toplam		726216	100	23584	100


Ortalama eđiminin (% 3.7) olduka dřk olduđu inceleme alanı, dz ve dze yakın řeklinde tanımlanabilecek karakterde bir topođrafik eđime sahiptir (Tablo 3). Nitekim sahadaki eđim sınıflarının oransal dađılıřları da bu yargıyı desteklemektedir. Ayrıca bu deđer, Trkiye'nin eđim sınıflarına kıyasla olduka kk orandadır (Tablo 3). Zira Trkiye'de eđim deđerleri oransal olarak % 15'nin zerindeki eđim sınıflarında ađırlık kazanmıřtır (Elibyk ve Yılmaz, 2010: 34; Ko, 2013: 447). Dolayısıyla hesaplanan eđim verileri, Trkiye arazisinin aksine inceleme alanındaki topođrafyanın olduka dz bir karakterde olduđunu kanıtlamaktadır.

Yarılma derecesi


Yarılma derecesi veya topođrafik rlyef, belirli bir grid sistemi iinde yer alan herhangi bir

alandaki minimum ve maksimum ykselti farkını yansıtmaktadır (Smith, 1935; Qui vd., 2017). Topođrafyanın dıř kuvvetler vasıtasıyla ne lde biimlendiđini ifade eden bu kavram, dođrudan rlyef enerjisini gstermektedir. Bylece birim alandaki topođrafyanın grelisi deđiřkenlik durumunun saptanmasında ve rliyefin dz veya eđimli yzeylerle temsil edilme kabiliyeti hakkında bilgi edinilmektedir (Das vd., 2016).

Trakya Yarımadası, deniz seviyesinden 593.71 m ykselti aralıđına kadar deđiřen deđerlerde iftira farklılıđı gsteren ve ortalama da 63.84 m ykselik deđerine ulařan yarılma derecesinin hkim olduđu bir topođrafik yzeve sahiptir (řekil 5).



Şekil 4. İnceleme alanının eğim (%) haritası



Şekil 5. İnceleme alanının yarıлма derecesi haritası

Yükselti ve eğim bakımından oldukça alçak ve düz bir topoğrafyanın yayılış gösterdiği sahanın neredeyse hemen hemen tamamında (% 90) 0-100 m aralığında yarıلمانın olduğu hesaplanmıştır (Tablo 4). Diğer yarıлма derecesi sınıfları ise topoğrafyadaki

parçalanmışlığın arttığı dağlık ve engebeli arazilerde ön plana çıkmaktadır. Trakya Yarımadası'ndaki yarıлма derecesi özellikleri, Türkiye arazisi kapsamında elde edilen verilerle uyumlu değildir. Zira Türkiye'de yarıлма derecesi en yoğun olarak 250-500 m

ile 500 m'nin üzerindeki deęer aralıklarında tespit edilmiřtir (Koç, 2013: 446-447; Tablo 4). Bu durum sahanın oluřum ve geliřimi bakımından olgun ve ihtiyar bir karakterde olduęunun belirtisi řeklinde yorumlanabilir.

Zira Koç (2013: 440), yarılma derecesinin topoęrafyanın genç arazilerde artma, yařlı arazilerde ise azalma göstereceęini vurgulamıřtır.

Tablo 4: Türkiye ve Trakya Yarımadası'nın yarılma derecesi deęerlerinin karřılařtırılması

Yarılma Derecesi (m)	Oran (%)	
	Türkiye (Koç, 2003)	Trakya (Bu çalıřma)
1-100	11	90
100-250	22	10
250-500	35	0.1
500->	32	0.0004
Toplam	100	100

Hipsometrik eęri

Hipsometrik (hipsografik) eęri, farklı yükselti basamakları arasındaki oranları daha belirgin bir řekilde ifade etmek için kullanılmaktadır.

Böylece yüksekli basamaklarının alansal daęılıřı ve jeomorfolojik birimlerin yükselti ile gösterdięi iliřki ortaya ıkarılabilir (Özřahin, 2015).

Tablo 5. İnceleme alanındaki yükseltinin daęılıřı ve hipsometrik eęri için veri deęerleri

Yükseklik (h)	Maksimum Yükseklik (H)	Alan (a) (Yüzey Alanı m ²)	Havza Alanı (Yüzey Alanı) (A) m ²	Rölatif Yükseklik (h/H)	Rölatif Alan (a/A)
0	1031	23853798846	23853798846	0,0	1,0
50	1031	20035808223	23853798846	0,0	0,8
100	1031	14890365470	23853798846	0,1	0,6
150	1031	9637238996	23853798846	0,1	0,4
200	1031	6033058640	23853798846	0,2	0,3
250	1031	4085659203	23853798846	0,2	0,2
300	1031	3038264263	23853798846	0,3	0,1
350	1031	2238820702	23853798846	0,3	0,1
400	1031	1609068897	23853798846	0,4	0,1
450	1031	1157702346	23853798846	0,4	0,0
500	1031	814585946	23853798846	0,5	0,0
550	1031	540577483	23853798846	0,5	0,0
600	1031	320458881	23853798846	0,6	0,0
650	1031	151105331	23853798846	0,6	0,0
700	1031	67303591	23853798846	0,7	0,0
750	1031	33419120	23853798846	0,7	0,0
800	1031	17438255	23853798846	0,8	0,0
850	1031	7312723	23853798846	0,8	0,0
900	1031	2032323	23853798846	0,9	0,0
950	1031	473185	23853798846	0,9	0,0
1000	1031	63999	23853798846	1,0	0,0
1031	1031	0	23853798846	1,0	0,0


Hipsometrik eęri, nispi yükselti (h/H) ve nispi alanın (a/A) belirlenmesiyle tespit edilebilmektedir. Burada "h" ilgili yükselti seviyesine ait yükselti deęeri (m), "H" ise inceleme alanının en yüksek noktasına (m) ait deęerdir. "a" ilgili yükselti seviyesine ait yüzölçümü alanı (m²), "A" ise havzanın toplam

yüzölçümü alanıdır (Özdemir, 2011). İnceleme alanının hipsografik eęrisi, SYM (DEM) veri seti yardımıyla 50 m yükselti aralıęı dikkate alınarak oluřturulmuřtur (Tablo 5; řekil 6).

Trakya Yarımadası'nın hipsometrik eęrisinin uzanıř eksenini, genellikle i bükey (konkav) bir yapıdadır. Bu durum sahanın Strahler (1952;

1973) tarafından bildirilen yařlı bir topoğrafya dneminde olduđuna iřaret etmektedir. Diđer yandan Trakya Yarımadası'nın hipsometrik eđrisinin seyri, Trkiye ve Anadolu Yarımadası'nı karakterize etmekten ok uzaktır. Zira hipsometrik eđrinin hem Trkiye genelinde hem de Anadolu yarımadası'nda dıřbkey (konveks) bir Őekil izlediđi belirlenmiřtir (Ko ve Kesmen, 2010: 105).

Dolayısıyla bu bulgular, Trakya Yarımadası'nda Anadolu Yarımadası'ndan daha yařlı bir topoğrafyanın mevcut olduđunun gstergesidir. Ayrıca Trakya Yarımadası'nın hipsometrik eđrisinin gsterdiđi profil, Anadolu Yarımadası'nın aksine Avrupa kıtasının profiline daha ok benzemektedir (Bilgin, 1957b: 148).



Őekil 6. İnceleme alanının hipsometrik eđrisi

Hipsometrik integral

Topoğrafyanın morfometrik zelliklerinin zmlenmesinin bir diđer yolu, hipsometrik integral deđerinin tespit edilmesidir. Hipsometrik eđri altında kalan toplam alanı ifade eden bu deđer, ortalama ve minimum ykseklik arasındaki farkın, maksimum ve minimum ykseklik arasındaki farka oranlanmasıyla hesaplanmaktadır (zdemir, 2011). İnceleme alanının hipsometrik integrali

(0.15), topoğrafyanın ařınım dngs bakımından olgunluk devresinde olduđunu yansıtmaktadır. Ayrıca bu deđer, Trkiye geneli (0.22) ve Anadolu Yarımadası (0.23) erevesinde retilmiř sonulara kıyasla olduka dřktr. Dolayısıyla Trakya Yarımadası'ndaki topoğrafya, geliřim bakımından Trkiye geneli ve Anadolu Yarımadası iin daha yařlıdır.

SONU

Trakya Yarımadası, jeomorfometrik zellikleri bakımından Trkiye karasından ve onun diđer kısmını oluřturan Anadolu Yarımadası'ndan olduka farklıdır. Ykselti farkının 1031 m olduđu sahada, ortalama ykselti 155.68 m'dir. Ortalama eđimin % 3.7 olduđu yarımada, olduka dz ve dze yakın Őeklinde tanımlanabilecek topoğrafya zellikleri gstermektedir. Hem hipsometrik eđrisinin i bkey bir vaziyette uzanması hem de

hipsometrik integral deđerinin 0.15 olması bu sahanın olgunluk ařamasında olduđunun iřareti olarak yorumlanmıřtır. Ayrıca yarımadanın neredeyse tamamında 0-100 m irtifada bađıl yarılmanın hkim olduđu anlařılmıřtır. Jeomorfometrik analiz sonularına gre Trakya Yarımadası, deniz seviyesine yakın emles ve olgun bir topoğrafya yzeyine sahiptir.

Çalıřma sonuçları, jeomorfometrik analizlerde kullanılan veri tabanları ve çözünürlüğünün detaylı olmasının sağlıklı veriler elde edilmesi bakımından oldukça elzem olduđuna dikkat çekmektedir. Ayrıca aynı alanlarda yapılan jeomorfometrik çalıřmalarda bile kullanılan veriler nispetinde bazı farklılıkların ortaya çıkabileceđi anlařılmıřtır. Dolayısıyla jeomorfometrik çalıřmalarda daha dođru sonuçlara ulařmak için, daha kaliteli ve yüksek çözünürlüklü verilerin kullanılmasının gerekliliđini göstermiřtir. Diđer yandan bu tarz

çalıřmaların yapımı esnasında CBS tekniklerinin oldukça avantaj sađladıđı teyit edilmiřtir. Bunun için CBS, topografik özelliklerin analiz edilmesinde ve bu özellikleri içine alan planlamaların hayata geçirilmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Benzer arařtırmaların uygun altyapı oluşturularak Türkiye genelini kapsayacak bir biçimde daha yüksek çözünürlüklü veri seti kullanılarak yapılması zarurettir. Böylece gerek dođal ortamın gerekse dođal kaynak deđerlerinin daha iyi anlařılması sađlanmış olacaktır.

KAYNAKLAR

- Ahmed, S. A., Chandrashekarappa, K. N., Raj, S. K., Nischitha, V., & Kavitha, G. (2010) Evaluation of morphometric parameters derived from ASTER and SRTM DEM: a study on Bandihole sub-watershed basin in Karnataka. *The J. of the Indian Society of Remote Sensing*, 38, pp. 227-238.
- Altın, B.N. (2000) Trakya'da yerřekillerinin Neotektonik dönem jeomorfolojik geliřimleri. İç: S. Dođaner, ed. 2000. 28. *Cođrafya Meslek Haftası (10-12 Haziran 1998, Edirne), Geçmiřte, Günümüzde ve Gelecekte Trakya*, İstanbul: Türk Cođrafya Kurumu Cođrafya Meslek Haftaları Serisi: 2, s.53-71.
- Ardel, A. (1956) Marmara Bölgesinde Cođrafi Müřahedeler. *İstanbul Üniversitesi Cođrafya Enstitüsü Dergisi*, 4(7), s. 1-16.
- Ardel, A. (1957) Trakya'nın Jeomorfolojisi. *Türk Cođrafya Dergisi*, 17, s. 152-158.
- Ardel, A. (1960) Marmara Bölgesi'nin yapı ve reliefi. *Türk Cođrafya Dergisi*, 20, s. 1-22.
- Atalay, İ. (2017) *Türkiye Jeomorfolojisi*. 2. bsk. İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri.
- Bekarođlu, E. (2013) Jeomorfolojide Temel Arařtırma Yöntemleri. Onikinci Bölüm. İç: Y. Arı, İ. Kaya, eds. 2013. *Cođrafya Arařtırma Yöntemleri*. Balıkesir: Cođrafyacılar Derneđi Yay. s. 343-367.
- Bilgin, T. (1957a) Türkiye'nin yüzölçümü. *Türk Cođrafya Dergisi*, 17, s. 138-142.
- Bilgin, T. (1957b) Türkiye'nin arz ettiđi kütleli durumun tetkiki hakkında bir not. *Türk Cođrafya Dergisi*, 17, s. 145-151.
- Chaput, E. (1974) *Türkiye'de Jeolojik ve Jeomorfolojik Tetkik Seyahatleri*. Translated from French by A. Tanođlu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınlarından No: 324, Edebiyat Fakültesi Cođrafya Enstitüsü Neřriyatı No: 11.
- Chorley, R.J. (1957) Climate and Morphometry. *Journal of Geology*, 65, pp. 628-638.
- Cürebađ, İ. & Erginal, A.E. (2007) Mıhlı Çayı Havzası'nın jeomorfolojik özelliklerinin jeomorfik indislerle analizi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(19), s. 126-135.
- Das, S., Patel, P.P. & Sengupta, S. (2016) Evaluation of different digital elevation models for analyzing drainage morphometric parameters in a mountainous terrain: a case study of the Supin-Upper Tons Basin, Indian Himalayas. *Das et al. SpringerPlus*, 5, s. 1544.
- Dönmez, Y. (1990) *Trakya'nın bitki cođrafyası*. 2. bsk. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3601, Cođrafya Enstitüsü Yay. No: 51.
- Elibüyük, M. & Yılmaz, E. (2010) Türkiye'nin cođrafi bölge ve bölümlerine göre yükselti basamakları ve eđim grupları. *Cođrafi Bilimler Dergisi*, 8(1), s. 27-55.
- Eriñç, S. Kurter, A. Eroskay, O. & Mater, B. (1985) *Batı Anadolu ve Trakya Uygulamalı Jeomorfoloji Haritası 1/500.000*. Ankara: TÜBİTAK TBAG Proje No. 593.
- Eriñç, S. (1993) Türkiye Fiziki Cođrafyasının Ana Çizgileri. *İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Cođrafya Enstitüsü Bülten*, 10, s. 1-10.
- Erol, O. (1983) Türkiye'nin genç tektonik ve jeomorfolojik geliřimi. *Jeomorfoloji Der.*, 11, s. 1-22.
- Erol, O. (1989) *Türkiye Jeomorfolojisi, Türkiye'nin Jeomorfolojik Evrimi ve Bugünkü Genel Jeomorfolojik Görünümü*. İstanbul: Basılmamıř Ders Notu.
- Ertek, A. (2011) Jeomorfolojik birimlerine göre Trakya'nın jeomorfolojisi. İç: D. Ekinci, ed. 2011. *Fiziki Cođrafya Arařtırmaları; Sistematik ve*

- Bölgesel*. İstanbul: Türk Coğrafya Kurumu Yayınları No: 5. s. 585-591.
- Koç, T., & Kesmen, E. (2010) Türkiye'nin morfometrik özellikleri. İç: M. A. Özdemir, ed. 2010. *Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu – 2010 (Prof. Dr. Oğuz EROL Onuruna)*. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, s.104-105.
- Koç, T. (2013) Türkiye'nin morfometrik özellikleri. İç: E. Öner, ed. 2013. *Prof. Dr. İlhan Kayan'a Armağan kitabı*. İzmir: Ege Üniversitesi yayınları Edebiyat Fakültesi Yayın No: 18, s.433-467.
- Kurter, A., Sungur, K. A., Gözenç, S., Uzel, T., Kiran, H., & Selçuk, M. (1985) Trakya'nın yüzölçümü ve yükselti basamakları. *İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni*, 2, s. 45-57.
- Lague, D., Crave, A., & Davy, P. (2003) Laboratory experiments simulating the geomorphic response to tectonic uplift. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 108 (B1), pp. 3-20.
- Mark, D. M., & Smith, B. (2004) A science of topography: from qualitative ontology to digital representations. In: M.P. Bishop & J. F. Shroder, eds. 2004. *Geographic Information Science and Mountain Geomorphology*. Chichester, England: Springer-Praxis, pp. 75-97.
- Montgomery, D.R., & Brandon, M.T. (2002) Topographic controls on erosion rates in tectonically active mountain ranges. *Earth and Planetary Sci. Letters*, 201, pp. 481-489.
- Oakes, H. (1958) *Türkiye Toprakları*. İzmir: Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Yayın No: 18.
- Özdemir, H. (2011) Havza morfometrisi ve taşkınlar. İç: D. Ekinci, ed. 2011. *Fiziki Coğrafya Arařtırmaları; Sistematik ve Bölgesel*. İstanbul: Türk Coğrafya Kurumu Yayınları No: 5, s. 507-526.
- Özşahin, E. (2015). Hořköy Deresi Havzası'nın (Tekirdağ) jeomorfolojik özellikleri. *The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), International Journal of Social Science*, 33(1), s. 99-120.
- Phillips, J.D. (2006) Evolutionary geomorphology: thresholds and nonlinearity in landform response to environmental change. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*, 3(2), pp. 365-394.
- Phillips, J.D. (2009) Changes, perturbations, and responses in geomorphic systems. *Progress in Physical Geography*, 33(1), pp.17-30.
- Pike, R.J. (2000) Geomorphometry-diversity in quantitative surface analysis. *Progress in Physical Geography*, 24(1), pp. 1-20.
- Pike, R.J. (1995) Geomorphometry-progress, practice, and prospect. *Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband*, 101, pp. 221-238.
- Qiu, H., Cui, P., Regmi, A. D., Hu, S., Zhang, Y., & He, Y. (2017) Landslide distribution and size versus relative relief (Shaanxi Province, China). *The Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 10064, pp. 1-12.
- Rasemann, S., Schmidt, J., Schrott, L., & Dikau, R. (2004) Geomorphometry in mountain terrain. In: Bishop, M.P., Shroder, J.F. (Eds.), *GIS & Mountain Geomorphology*. Springer, Berlin, pp. 101-145.
- Smith, G.S. (1935) The relative relief of Ohio. *Geographical Review*, 25, pp. 274-284.
- Strahler, A.N. (1952) Hypsometric (Area-Altitude) Analysis of Erosional Topography. *Geological Society of America Bulletin*, 63, pp. 1117-1142.
- Strahler, A.N. (1973) Akaçlama havzalarının jeomorfoloji incelemelerinde nicel çözümler (Translator: Arpat, E., Güner, Y.). *Jeomorfoloji Dergisi*, 5, s. 103-118.
- Summerfield, M.A. & Hulton, N.J. (1994) Natural controls of fluvial denudational rates in major world drainage basins. *Journal of Geophysical R.*, 99 (B7), pp. 13871-13883.
- Tanoğlu, A. (1947) Türkiye'nin irtifa kuşakları. *Türk Coğrafya Dergisi*, 9-10, s. 37-63.
- Tobler, W.R. (1976) Analytical cartography. *The American Cartographer*, 3 (1), pp. 21-31.
- Tobler, W.R. (2000) The development of analytical cartography - a personal note. *Cartography and Geographic Information Science*, 27(3), 189-194.
- Tunçdilek, N. (1969) *Türkiye Eğim Haritası*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 56.
- Tunçdilek, N. (1985) *Türkiye'de Reliyef Şekilleri ve Arazi Kullanımı*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3279, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yay. No: 3.