



Derleme / Review paper

Jeotermal Rezervuarlarla İlgili Sayısal Modelleme/Benzeşim Çalışmaları

Numerical Modeling/Simulation Studies of the Geothermal Reservoirs

Nurkan KARAHANOĞLU 

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No 1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

Geliş (Received): 10 Aralık (December) 2018 / Düzeltme (Revised): 13 Ocak (January) 2019 / Kabul (Accepted): 14 Ocak (January) 2019

ÖZ

Jeotermal rezervuarlar içerdikleri yüksek basınç ve yüksek entalpi nedeniyle çok kıymetli yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Doğal süreçler sonucu rezervuar kayaçta depolanan jeotermal akışkan elektrik enerjisi üretiminde, konut ısıtımında, seracılıkta ve balneolojik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Jeotermal rezervuarların üretimi doğal dengede bulunan hidrodinamik ve hidrotermal mekanizmaları harekete geçirmekte ve bunun sonucu olarak rezervuar içinde akışkan hareketi ve ısı yayılımı/taşınımı oluşmaktadır. Bu mekanizmaların matematiksel olarak tanımlanması ile başlayan sayısal modelleme çalışmaları değişik işletim koşullarının rezervuara etkisini araştırabilmekte ve dolayısı ile jeotermal sistemlerin sürdürülebilir düzeyde üretilmelerine olanak sağlamaktadır. Söz konusu mekanizmaların diferansiyel denklemlerle ifade edilmesi ve jeotermal rezervuarın kavramsal modeline dayalı olarak belirlenen fiziksel parametreler ve uygun sınır koşullarının uygulanması sayısal modelleme çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. 1970 li yıllardan beri sürdürülen modelleme çalışmaları ile dünya genelinde birçok jeotermal sistemde sayısal modelleme çalışması yapılmış ve bu rezervuarların en uygun ve sürdürülebilir üretim ve işletim politikalarının geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu makalede jeotermal rezervuarların sayısal modellenmesinin temel prensipleri anlatılmakta, ilgili denklemler tanıtılmakta ve tarihsel gelişim aktarılmakta ve hazır paket programlar olarak sunulan simülörlerin/modellerin gizemleri açıklanmaktadır. Ayrıca sayısal model çalışması yapılan sahalar ve ilgili ülkeler tanıtılarak bu çalışmaların kaynakları verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Jeotermal rezervuarlar, Sayısal modelleme/Benzeşim, Simülörler

ABSTRACT

Geothermal reservoirs are renewable energy resources and they are treated as very valuable due to their high pressure and high enthalpy contents. Geothermal fluid stored in the reservoir is used for electricity production, central heating, greenhouse heating and for balneological purposes. Fluid production from such reservoirs triggers hydrodynamic and hydrothermal mechanisms and causes fluid movement and heat transfer in the reservoirs. Modeling studies start with defining these mechanisms by differential equations and help investigating response of reservoirs to alternative production scenarios and hence obtain sustainable management of such systems. Fundamental studies for geothermal reservoir simulation require formulation of the mechanisms and application of boundary and initial conditions and the physical parameters obtained from conceptual model of the geothermal system. Geothermal reservoir modeling studies date back to 1970s and several geothermal reservoirs in the world have been simulated to determine optimum and sustainable production policies. This paper summarizes the basic principles of geothermal

reservoir modeling and introduces basic differential equations and explains mysteries of the reservoir simulators nowadays widely used in the geothermal industry. The numerically simulated geothermal fields and the related countries are also summarized together with the references.

Keywords: *Geothermal reservoirs, Numerical modeling/Simulation, Simulators*

GİRİŞ

Jeotermal sistemler doğal süreçler sonucu oluşan ve insanlık tarafından öncelikle kaplıca amaçlı ve daha sonraki yıllarda içerdiği yüksek basınç ve entalpi zenginliğinin farkedilmesiyle enerji üretimi amaçlı kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu sistemlerin hidromekanik ve hidrotermal özelliklerinin tanımlanması, rezervuar kapasitelerinin belirlenmesi ve en uygun koşullarla üretilerek sürdürülebilir olarak değerlendirilmeleri açısından son derece önem arz etmektedir.

Jeotermal rezervuarların üretime açılması jeolojik zaman içinde dengeye ulaşan hidrodinamik ve hidrotermal mekanizmaların harekete geçmesine ve üretim koşullarına bağlı olarak basınç ve sıcaklık düşümlerine neden olmaktadır. Bu durum gerçek kapasitesi tam olarak belirlenmemiş ve reşarj/deşarj dengesi kurulamamış rezervuarlarda jeotermal sistemin kaybedilmesine yol açabilmektedir. Jeotermal rezervuarların üretilmeleri esnasında sıcaklık ve basınç düşümleri ile belirlenen olumsuz gelişmeler bilimsel çalışmalar yapılmasını ve sistemin dengede tutulabilmesi için en uygun üretim koşullarının belirlenmesini gerekli kılmıştır. Bu amaçla yapılan araştırmalar jeotermal sistemde gelişen mekanizmaların matematiksel olarak tanımlanmasını sağlamış ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte sayısal modelleme konusunda çalışmalar yapılmasının önü açılmıştır.

1970 li yıllarda başlayan sayısal modelleme çalışmaları ile jeotermal sahaların gerçek

kapasitelerinin belirlenmesi ve en uygun üretim ve enjeksiyon koşulları ile değerlendirilmeleri ve sürdürülebilir olarak üretilmeleri sağlanmıştır. Jeotermal sahaların sayısal modellemesi konusunda çok sayıda araştırma yapılmış ve sayısal modellemede kullanılan programların geliştirilmeleri yanında sayısal modellerin jeotermal sahalara uygulanması yönünde çok değerli bilimsel birikimler elde edilmiştir.

Bu makalede jeotermal sistemlerin sayısal modellemesi konusunun önemi vurgulanarak bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların ayrıntıları, tarihsel gelişimi ve dünya genelinde yapılan modelleme çalışmaları ve sayısal modellemede kullanılan programlar sunulmaktadır. Diğer taraftan jeotermal rezervuarların sayısal modellenmesi konusunun temel prensiplerinin tanıtıldığı bu araştırmada ülkemizde yapılan modelleme çalışmaları hakkında bilgiler verilmektedir.

TARİHSEL GELİŞİM

1970 li yıllarda bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmelerle birlikte araştırmacılar jeotermal rezervuarların sayısal modellemesi konusuna yönelmişler ve araştırmalarını jeotermal rezervuarların optimum ve sürdürülebilir işletimini sağlamak için geliştirdikleri sayısal modeller üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Bu konuda Gupta vd. (1974), Mercer vd. (1974), Faust ve Mercer (1975), Garg vd. (1975), Lassetter (1976), Bodvarsson vd. (1982), Pruess vd. (1982) yaptıkları araştırmalar öncü çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmalarda

kütlenin ve enerjinin korunumu prensiplerinin Darcy kanunu ile birleştirilerek jeotermal sistemlerdeki mekanizmaların matematiksel olarak ifade edildikleri görülmektedir. Bu yıllarda geliştirilen matematiksel modellerde kütle denklemleri ile enerji denklemleri birbirleri ile tam iletişimli (fully coupled) olarak oluşturulmuş ve gerek gözenekli ortamdaki akışkan (tek fazlı/iki fazlı) ve gerekse fiziksel parametreler için (değişkenlerden bağımsız/değişkenlere bağımlı) değişik varsayımlar kabul edilmiştir. Rezervuar ortamında gelişen akışkan hareketi ve enerji yayılımı mekanizmaları için model denklemlerinin basınç ve entalpi/sıcaklık değişkenleri için oluşturulması ve Sonlu Elemanlar/Sonlu Farklar kullanılarak sayısal olarak çözümleri birçok araştırmacı tarafından başarılı olarak uygulanmıştır (Brownell vd., 1977; Toronyi ve Farouq Ali, 1977; Ertekin, 1978; Thomas ve Pierson, 1978; Faust ve Mercer, 1979a; Faust ve Mercer, 1979b; Morris ve Campbell, 1981; Bodvarsson vd., 1981; Carradori vd., 1981; Nguyen ve Pinder, 1983; Zyvoloski, 1983; Karahanoğlu vd., 1984; O'sullivan, 1985; Bodvarsson vd., 1986). Örnek olarak Mercer ve Faust tarafından geliştirilen matematiksel modelin Yeni Zelanda'daki Wairakei jeotermal sistemine uygulanışı ve değişkenlerin (basınç ve entalpi) gözlenen değerleri ile modelden elde edilen sonuçların birbirleri ile uyumlu olduklarından bahsedilebilir (Mercer ve Faust, 1979). Bu dönemde geliştirilen sayısal modellerin değişik ülkelerdeki jeotermal sahalara uygulandığı ve jeotermal sistemlerin sayısal modeller yardımı ile değerlendirildikleri ve geliştirildikleri izlenmektedir (Bodvarsson vd., 1987a; Bodvarsson vd., 1987b; Aunzo vd., 1989; Yasukawa ve Ishido, 1990; Pruess, 1990; O'Sullivan vd., 1990; Menzies vd., 1991; Axelsson ve Bjornsson, 1993; Sakagawa vd., 1994; Mc.Guinness vd., 1995; Arnorsson,

1995; Parini vd., 1995a, b; Boardman vd., 1996; Hanano vd., 1998). Takip eden yıllarda üretime bağlı olarak gelişen yüzey çökmesi problemi konusunda da çalışmalar yapılmış ve hazırlanan sayısal modeller başarılı olarak uygulanmıştır (Lipmann vd., 1976; Morgan vd., 1980; Lewis ve Karahanoğlu, 1981; Bear ve Çorapçıoğlu, 1981; Bodvarsson vd., 1981; Aboustit vd., 1985; Karahanoğlu vd., 1984; Lewis vd., 1989; Rutqvist vd., 2002; Hu vd., 2013; Bromley vd., 2013; Jing vd., 2014; Karrech vd., 2015).

1990 lı yıllardan itibaren jeotermal rezervuarların sayısal modellenmesi konusunda yapılan araştırmalarda, modellerin geliştirilmesi ve jeotermal sahalara uygulanması konusunda hızlı bir artış gözlenmektedir. TOUGH2 programının modelleme çalışmalarında kullanılması bu yıllarda ortaya çıkmış (Çizelge 1) ve Pruess (1990) sunduğu makalesinde jeotermal rezervuarların modellenmesi konusundaki temel prensipleri, modelleme çalışmalarının ayrıntılarını ve saha uygulamaları hakkındaki çalışmaları özetlemekte ve zaman içerisinde yapılması düşünülen araştırmaları anlatmaktadır.

İlk yıllarda tek fazlı (sıcak su tipli) ve sabit fiziksel parametrelerin kullanıldığı sayısal modellerin yıllar içerisinde geliştirildiği, iki fazlı (sıcak su ve buhar) ve faz değişimlerinin dikkate alındığı ve birçok parametrenin basınç ve sıcaklık/entalpi değişkenleri ile ifade edildiği üç boyutlu modellerin jeotermal endüstrisine sunulduğu görülmektedir (Pruess, 1990; Bodvarsson vd., 1990a; Finsterle vd., 1993; McGuinness vd., 1995; Hadgu vd., 1995; Suarez vd., 1996; Kiryukhin, 1996; Pruess, 1997; Hanano, 1998; Pruess, 1999; Pruess vd., 1999; Mannington vd., 2000; Barmin ve Kondrashov, 2000; Rutqvist vd., 2002; Bataille vd., 2006; Seol ve Lee, 2007; Driesner ve Geiger, 2007; Croucher ve O'Sullivan, 2008; O'Sullivan vd.,

2009; Kumamoto vd., 2009; Blocher vd., 2010; Emoricha vd., 2010; Cerminara ve Fasano, 2012; Jiang vd., 2013; Guerrero-Martinez ve Verma, 2013; Moridis ve Freeman, 2015).

Zaman içerisinde yapılan araştırmalarda sayısal modellerin jeotermal sahaların geliştirilmeleri ve optimum ve sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi için kullanıldıkları izlenmektedir (Atmojo vd., 2000; Sakagawa vd., 2000; Portugal vd., 2000; Fendekova ve Fendek, 2000; Battistelli vd., 2002; Arellano vd., 2003; Mannington vd., 2004; Fabbri ve Trevisani, 2005; Zarrouk vd., 2007; Porras vd., 2007; Vedova vd., 2008;; Arias vd., 2010; Yahara ve Tokita, 2010; Kiryukhin vd., 2010; Itoi vd., 2010; Barelli vd., 2010a, Barelli vd., 2010b; Noorallahi ve Itoi, 2011; Gunnarsson vd., 2012; Zaher vd., 2012; Lei ve Zhu, 2013; Pearson vd., 2014; Canet vd., 2015; Farkhutdinov vd., 2015; Bujakowski vd., 2016; Zhang vd., 2016; Turali ve Şimşek, 2017). Bu çalışmalar arasında Stanford Üniversitesi Lawrence Berkeley Laboratuvarı ekibinin yaptığı araştırmalar ve program yönündeki çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmaların ürünü olarak Finsterle (1993) iTOUGH2 programının kullanım klavuzunu 1993 yılında sunmuş (Finsterle, 1993) ve programın ikinci versiyonu 1999 yılında Pruess tarafından tanıtılmıştır (Pruess vd., 1999). Takip eden yıllarda bu programın geliştirilmesi yönündeki araştırmaları ve jeotermal sahaların modellenmesi yönündeki çalışmaları O'Sullivan vd. (2001) hazırladıkları makalede sunmuşlar ve dünya genelinde yapılan modelleme çalışmalarını ülkeler bazında Çizelge halinde vermişlerdir. Benzer şekilde Franco ve Vaccaro (2014) örnek modelleme olarak Momotombo (Nikaragua), Ngatamariki ve Wairakei (Yeni Zelanda), Larderello ve Mt. Amiata (İtalya), Groß Schönebeck (Almanya) jeotermal sahalarında yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak

anlatmışlar ve birçok jeotermal sahada yapılan sayısal modelleme çalışmalarının ayrıntılarını (modellenen dönem, uygulanan program, sahanın geometrisi, hazırlanan grid sistemi, koşullar ve fiziksel parametreler ve kalibrasyon çalışmaları) liste halinde sunmuşlardır.

Ayrıntılı ve çok değerli bilgiler içeren bu listelerde göze çarpan en önemli noktanın, ilk yıllarda ticari olmayan programların/simülatörlerin kullanıldığı ve tarihsel süreç içerisinde serbest kullanıma kapalı TOUGH programının etkin bir şekilde tercih edilmiş olduğu görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve araştırmalar eklenerek bu listeler güncelleştirilmiş ve yeni hali ile Çizelge 1 de sunulmuştur.

2003 yılında TOUGH yazılımı konulu bir sempozyum düzenlenmiş ve TOUGH programının değişik modülleri tanıtılarak diğer programlarla karşılaştırılması yapılmıştır (Pruess, 2003).

Üç yılda bir tekrarlanan sempozyumlarda TOUGH programı ile yapılan çalışmalar sunulmakta ve program ile ilgili yeni gelişmeler, değişik araştırmalar paylaşılmaktadır. Bu tür sempozyumlarda TOUGH programının uygulandığı karmaşık jeolojik ortamlarda yeraltısuyunun ve ısının hareketini araştıran çalışmalar sunulmaktadır. Bu araştırmalar yeraltısuyu hareketi, jeotermal rezervuar mühendisliği, çevresel değerlendirme çalışmaları, nükleer atık depolanması, CO₂ depolanması, petrol ve gaz üretimi, ve hidrojeolojik, biyojeokimyasal, termal, ve jeomekanik süreçlerin bulunduğu tam etkileşimli problemleri kapsamaktadır.

Finsterle vd. (2012) ve Finsterle vd. (2014) TOUGH programı ile ilgili olarak, jeotermal endüstrisinden ve kamu kurumlarından gelen istekler doğrultusunda yapılan gelişmeleri

anlatmakta ve programın çok karışık problemleri çözebilecek şekilde geliştirildiğini ve karmaşık yeraltı proseslerini modelleyecek özelliklere kavuşturulduğunu iletmektedir. Birinci makalede TOUGH programının gelişimi hakkında bilgiler verilmekte ve TOUGH+, TOUGHREACT, TOUGH2, iTOUGH2 kodlarının teknik özellikleri anlatılmaktadır. Her iki makalede yaygın olarak kullanılan TOUGH simülasyonlarının isimleri, ve proseslerini tanıtan bir Çizelge sunulmaktadır (Çizelge 2). Temel denklem sistemlerinin ve bu denklemlerin sonlu farklar yöntemi ile çözümlerinin korunduğu ana yazılımda yıllar

içerisinde iyileştirmeler yapıldığı, yeni durum denklemlerinin geliştirildiği ve programın çoklu fiziksel kapasitesinin genişletildiği ve sayısal performansını artırıcı gelişmelerin elde edildiği ve kuyu iletişimi, yüzey sularıyla ilişkiler ve atmosfer ile olan ilişkiler sağlayan modüllerin programa bağlandığı anlatılmaktadır. Çizelge 2 ilgili sempozyumda sunulan çalışmaların TOUGH programının geliştirilmesine katkı sunduğu konuları ayrıntılı olarak vermektedir. Ayrıca son gelişmeler konusu ile ilgili olarak, ‘durum denklemi’, ‘reaktif taşınım’, ‘kaya mekaniği’, ‘ters modelleme’ ve diğer konularda yapılan gelişmeler anlatılmaktadır.

Çizelge 1. Jeotermal sahaların sayısal modellenmesi konusundaki çalışmalar (O’Sullivan vd., 2001 ve Franco ve Vaccaro, 2014’den düzenlenmiş ve güncelleştirilmiştir).

Table 1. Numerical modeling studies of Geothermal fields (modified and revised from O’Sullivan et al., 2001 and Franco and Vaccaro, 2014).

Simulator Program	Year Yıl	Author or Company Yazar veya Şirket	Field Country Saha Ülke
	1979	Gupta vd., 1979	Puga Hindistan
	1979	Mercer ve Faust, 1979	Wairakei, Yeni Zelanda
SHAFT 78	1979	Pruess vd., 1979	Model rezervuar
SHAFT79	1982	Bodvarsson vd., 1982	Olkaria Kenya
	1984	Karahanoğlu vd., 1984	Kızıldere Türkiye
	1985	Ingebritsen ve Sorey, 1985	Lassen, Hollanda
HYDRO THERM	1985	Ingebritsen ve Sorey, 1985	Lassen, ABD
	1987	Bodvarsson vd., 1987a	Olkaria, Kenya
	1988	Bodvarsson, 1988	Svartgens, İzlanda
	1989	Aunzo vd., 1989	Ahuachapan, El Salvador
	1990	Yasukawa ve Ishido, 1990	Onikobe, Japonya
TOUGH2	1990	O’Sullivan vd., 1990	Kamojang, Endonezya
TOUGH2	1990	Antunez vd., 1990	Mofete, İtalya
TOUGH2	1990	O’Sullivan vd., 1990	Kamojang, Endonezya
THOR	1990	Yasukawa ve Ishido, 1990	Onikobe Caldera, Japonya
TOUGH2	1990	Bodvarsson vd., 1990a	Nesjavellir, İzlanda
TS&E	1990	Williamson, 1990	Geysers, ABD
TOUGH2	1990	Sanyal vd., 1990	Onikobe, Japonya

TOUGH2	1990	Bodvarsson vd., 1990b	Olkaria, Kenya
TOUGH2	1991	Antunez vd., 1991	Cerro Prieto, Meksika
STAR	1991	Pritchett vd., 1991	Sumikawa, Japonya
TOUGH2	1991	Menzies vd., 1991	Zunil, Guatemala
TOUGH2	1991	Ripperda vd., 1991	Ahuachapán, El Salvador
TOUGH2	1991	Aunzo vd., 1989	Ahuachapán, El Salvador
TOUGH2	1992	Battistelli vd., 1992	Nagqu Tibet, Çin
TOUGH2	1992	Burnell, 1992	Rotorua, Yeni Zelanda
TOUGH2	1993	Amistoso vd., 1993	Palinpinon, Filipinler
TOUGH	1992	Hanano, 1992	Matsukawa, Japonya
TETRAD	1993	Strobel, 1993 Bulalo,	Filipinler
TOUGH2?	1993	Axelsson ve Bjornsson, 1993	Botn, İzlanda
TOUGH2?	1995	Pham vd., 1995	Uenotai, Japonya
TOUGH2	1994	Antunez vd., 1994	Geysers, B
SING II	1994	Sakagawa vd., 1994	Mori, Japonya
SING I, SING II	1995	Nakanishi vd., 1995	Oguni, Japonya
TOUGH2	1995	Todesco, 1995	Vulcano, İtalya
TOUGH2	1995	McGuinness vd., 1995	Kakkonda, Japonya
STARS	1995	Arihara vd., 1995	Kakkonda, Japonya
STAR	1995	Bertani ve Cappetti, 1995	Monteverdi, İtalya
STAR	1995	Yano ve Ishido, 1995	Kirishima, Japonya
STAR	1995	Pritchett ve Garg, 1995	Oguni, Japonya
STAR		Ariki (Mitsubishi Metals) *	Oguni, Japonya
?	1995	Nakanishi vd., 1995	Copahue, Arjantin
?	1995	Tokita vd., 1995	Hatchobaru, Japonya
TETRAD	1995	Menzies ve Pham, 1995	Geysers, ABD
AQUA	1995	Hu, 1995	Yangbajian Tibet, Çin
TOUGH2	1996	Kiryukhin, 1996	Dachny, Rusya
TOUGH2	1996	Suarez vd., 1996	Los Azufres, Meksika
GEOSIM6	1996	Pham vd., 1996	Amatitlán, Guatemala
TOUGH2	1996	Kissling vd., 1996	Wairakei, Yeni Zelanda
TOUGH2	1996	Parini vd., 1996	Miravelles, Kosta Rika
	1996	Absar vd., 1996	Puga Hindistan
	1997	White vd., 1997	Kawerau, Yeni Zelanda
TOUGH2	1997	Battistelli vd., 1997	Skierniewice, Polonya
TOUGH2	1997	Antics, 1997	Oradea, Romanya
TETRAD	1997	Sanchez, 1997	Los Humeros, Meksika
TOUGH2	1998	O'Sullivan vd., 1998	Wairakei, Yeni Zelanda
TETRAD	1998	Bloomfield vd., 1998	Cove Fort Sulphurdale, ABD
STAR	1998	Ishido ve Tosha, 1998	Ogiri, Japonya
ROCK-FLOW-2	1998	Kolditz ve Klauser, 1998	Rosemanowes, İngiltere

TOUGH2	1998	Battistelli vd., 1998	Tendaho, Etiyopya
TOUGH2	1998	Antics, 1998	Nagysszenas, Macaristan
TOUGH2	1999	Sigurdsson *	Krafla, İzlanda
TETRAD	1999	Esberto ve Sarmiento, 1999	Mt. Apo, Filipinler
TETRAD	1999	Sta.Ana vd., 1999	Tongonan, Filipinler
ROCK-FLOW-3	1999	Kaiser *	Soultz-sous-Forets, Fransa
TOUGH2	1999	Bjornsson *	Reykjanes, İzlanda
TOUGH2	1999	Bjornsson, 1999	Svartsengi, İzlanda
GEO-CRACK 2D	1999	Swenson vd., 1999	Hijiori, Japonya
STAR	2000	Nakanishi ve Iwai, 2000	Onikobe, Japonya
TOUGH2	2000	Antics, 2000	Tomnatic, Romanya
TOUGH2	2000	Sanyal vd., 2000	Wasabizawa, Japonya
AQUA	2000	Fendek, 2000	Galanta, Slovak Cumhuriyeti
TOUGH2	2000	Atmojo, 2000	Sibayak, Endonezya
AQUA	2000	Fendekova ve Fendek, 2000	Horna Nitra, Slovak Cumhuriyeti
TETRAD	2000	Butler vd., 2000	Cerro Prieto, Meksika
FIGS3C	2000	Sakagawa vd., 2000	Kakkonda Japonya
ITOUGH2	2004	Mannington vd., 2004	Wairakei-Tauhara, Yeni Zellanda
TOUGH, ITIUGH2	2005	Porras vd., 200	5Momotombo, Nikaragua
SHEMAT	2005	Köhn ve Stöfen, 2005	Waiwera, Yeni Zellanda
ITOUGH2, TOUGH2	2006	Kiryukhin vd., 2006	Pauzhetsky, Rusya
ITOUGH2	2007	Porras vd., 2007	Momotombo, Nikaragua
SUTRA	2007	Özkaya, 2007	Kızıldere, Türkiye
ITOUGH2	2008	Kiryukhin vd., 2008	Pauzhetsky, Rusya
SHEMAT 7.1	2008	Vedova vd., 2008	Larderello, İtalya
ITOUGH2, MINC Model	2009	Kumamotoa vd., 2009	Ogiri, Japonya
FEFLOW	2009	Sonney ve Vuataz, 2009	Lavey-les-Bains, İsviçre
FEFLOW	2010	Blöcher vd., 2010	Groß Schönebeck, Almanya
FEFLOW	2010	Magri vd., 2010	Seferihisar, Türkiye
MINC Model	2010	Itoi vd., 2010Ogiri,	Japonya
TOUGH2	2010	Emoricha vd., 2010	Mindanao, Filipinler
TOUGH2	2010	Romagnoli vd., 2010	Larderello-Travale, İtalya
TOUGH2	2010	Barelli vd., 2010a	Mt. Amiata, İtalya
TOUGH2	2010	Barelli vd., 2010b	Larderello-Travale, İtalya
TOUGH2	2011	Gunnarsson vd., 2011	Hengill, İzlanda
HYDROTHERM 2.2	2011	Zaher vd., 2011	Gulf of Suez, Mısır
SHEMAT	2011	Mottagy vd., 2011	The Hague, Hollanda
HYDROTHERM 2.2	2012	Zaher vd., 2012	Hammam Faraun hot spring, Mısır

FEFLOW,GMS	2013	Sippel vd., 2013	Berlin, Almanya
FEFLOW	2013	Cherubini vd., 2013	Groß Schönebeck, Almanya
TCHEMSYS	2013	G-Martinez ve Verma, 2013	Las Tres Virgenes, Meksika
AUTOUGH2	2013	Lei ve Zhu, 2013	Guanyao, Çin
TOUGH2	2013	Zeng vd., 2013	Desert Peak, ABD
TOUGH2	2013	Bromley vd., 2013	Wairakei, Yeni Zelanda
TOUGH2	2014	Pearson vd., 2014	Tauranga, Yeni Zelanda
FRACTSIM-3D	2014	Jing vd., 2014	Hijori, Japonya
TOUGH2	2015	Llanos vd., 2015	Habanero, Avustralya
METIS	2015	Farkhutdinov vd., 2015	Khankala, Rusya
Open GeoSys (OGS)	2015	Blocher vd., 2015	Grob Schonebeck, Almanya
STIMPLAN	2015	Zang vd., 2015	EGS KD Çin
METIS	2016	Farkhutdinov vd., 2016	Khankala, Rusya
AUTOUGH2,	2016	Ratouis vd., 2016	Rotorua, Yeni Zelanda
TOUGH2	2016	Bujakowski vd., 2016	Podhale, Polonya
TOUGH2	2016	Carlino vd., 2016	Mofete İtalya
TOUGH2	2016	Zhang vd., 2016	Chingshui, Tayvan
TOUGH2	2017	Zeng vd., 2017	Yangbajing, Tibet Çin
TOUGH2	2017	Feng vd., 2017	Pisa Plain, İtalya
TOUGH2	2017	Turali ve Şimşek, 2017	Sorgun, Türkiye
TOUGH2	2018	Quiono ve Zarrouk, 2018	Ngatamariki, Yeni Zelanda
TOUGH2		CEL *	Ahuachapán, El Salvador
TOUGH2		CEL *	Berlin, El Salvador
TOUGH2		U. of Auckland (O'Sullivan) *	Darajat, Endonezya
TOUGH2		U. of Auckland (O'Sullivan) *	Dieng, Endonezya
TOUGH2		U. of Auckland (O'Sullivan) *	Lahendong, Endonezya
TOUGH2		Tokita (WestJEC) *	Hatchobaru, Japonya
TOUGH2		U. of Auckland (O'Sullivan) *	Subiyak, Endonezya
TOUGH2		ENEL *	Bagnore, İtalya
TOUGH2		ENEL *	Piancastagnaio, İtalya
TOUGH2		Tokita (WestJEC) *	Otake, Japonya
TOUGH2		Sato *	Yanaizu-Nishiyama, Japonya
TOUGH2		U. of Auckland (O'Sullivan) *	Ohaaki, Yeni Zelanda
TOUGH2		White *	Tauhara, Yeni Zelanda
TOUGH2		Tokita (WestJEC) *	Wairakei, Yeni Zelanda
TOUGH2		Tokita (WestJEC) *	Palinpinon, Filipinler
TOUGH2		Kiryukhin *	Malkinsky, Rusya
TOUGH2		Kiryukhin *	N-Kurilsky, Rusya
TOUGH2		Kiryukhin *	Oceansky, Rusya
TOUGH2		Kiryukhin vd 2010	Pauzhetsky, Rusya

TOUGH2	U. of Auckland (O'Sullivan) *	Mokai, Yeni Zelanda
TETRAD	PNOC-EDC *	Mahanagdong, Filipinler
TETRAD	CFE *	Cerro Prieto, Meksika
TETRAD	Unocal *	Geysers, ABD
TETRAD	Bloomfield *	Geysers, ABD
STAR and SING	Ariki (Mitsubishi Metals) *	Sumikawa, Japonya
PTSP	GSJ *	Nigorikawa, Japonya
GEOSIM	Liguori	San Jacinto-Tizate, Nikaragua
GEOSIM	Liguori	Momotombo, Nikaragua
GEOSIM6	Tohoku Electric Power Co (Yamanobe)	Yanaizu-Nishiyama Japonya
GEOTHERM IIE	(Barragan R.)	Cerro Prieto, Meksika
	Unocal *	Awibengkok, Filipinler
	UOA Model 4a	
	GeothermEx *	Miravalles, Kosta Rika
	GeothermEx *	Latera, İtalya
	GeothermEx *	Hakkoda, Japonya
	GeothermEx *	Kokubu, Japonya
	GeothermEx *	Minami Aizu, Japonya
	GeothermEx *	Niseko, Japonya
	GeothermEx *	Otake, Japonya
	GeothermEx *	Takigama, Japonya
	GeothermEx *	Yanaizu-Nishiyama, Japonya
	GeothermEx *	MacBan, Filipinler
	GeothermEx *	Tiwi, Filipinler
	GeothermEx *	Boewawe, ABD
	GeothermEx *	Coso Hot Springs, ABD
	GeothermEx *	Desert Peak, ABD
	GeothermEx *	Dixie Valley, ABD
	GeothermEx *	East Mesa, ABD
	GeothermEx *	Heber, ABD
	GeothermEx *	Long Valley, ABD
	GeothermEx *	Puna, ABD
	GeothermEx *	Roosevelt Hot Spr., ABD
	GeothermEx *	Salton Sea, ABD
	GeothermEx *	Soda Lake, ABD
	GeothermEx *	South Brawley, ABD
	GeothermEx *	Steambot Springs, ABD
	GeothermEx *	Stillwater, ABD

Not: * işaretli kaynaklara ulaşılamamış olup bilgiler O'Sullivan vd. (2001) den alınmıştır.

Karahanoğlu

Çizelge 2. TOUGH Programı hakkında (Finsterle vd., 2012).

NAPL = susuz akışkan fazı, NCG = kondanse olmayan gaz, and VOC = uçucu organik bileşik.

Table 2. Overview of TOUGH simulators (Finsterle et al., 2012).

NAPL = non-aqueous phase liquid, NCG = noncondensable gas, and VOC = volatile organic compound.

Simulator Simülâtör	Fazlar, Bileşenler ve Prosesler Phases, Components, and Processes	Kullanım durumu Released	Kaynaklar Key references
MULKOM	Newton ve Newton özelliği olmayan, çok fazlı ve çok bileşenli akışkanlar için ve ısı değişkenli ortam için geliştirilen araştırma kodu Research code for nonisothermal multiphase, multicomponent flows of Newtonian and non-Newtonian fluids	Kullanıma kapalı No public release	Pruess (1983)
TOUGH	Sıvı ve gaz fazında ısı değişkenli su ve hava akımı Nonisothermal flow of water and air in aqueous and gaseous phase	1987	Pruess (1987)
TOUGH2	Sıvı ve gaz fazında ısı değişkenli su ve NCG (kondanse olmayan gaz) akımı Nonisothermal flow of water and NCG in aqueous and gaseous phase	1991	Pruess (1991)
iTOUGH	TOUGH için ters modelleme Inverse modeling for TOUGH	Kullanıma kapalı No public release	Finsterle (1992) Finsterle vd 2012 den alıntı
T2VOC	Sıvı, gaz ve NAPL fazında ısı değişkenli su, hava ve VOC (Uçucu organik bileşen) akımı Nonisothermal flow of water, air, and VOCs in aqueous, gaseous, and NAPL phase for environmental applications	1995	Falta vd (1995)
iTOUGH2	TOUGH2 (Pruess, 1991) için ters modelleme, hassasiyet analizi ve belirsizlik yayılımı analizi ve ayrıca EOS (durum denklemleri) modülleri Inverse modeling, sensitivity analysis, and uncertainty propagation analysis for TOUGH2 (Pruess, 1991) and additional EOS modules	1997	Finsterle (1997a,1997b,1997c) Finsterle vd 2012 den alıntı
TOUGH2 V2	Isı değişkenli çok fazlı ve çok bileşenli akım Nonisothermal multiphase, multicomponent flow	1999	Pruess vd (1999)
TMVOC	Sıvı, gaz ve NAPL fazında ısı değişkenli su, hava, çoklu VOC ve NCG akımı Nonisothermal flow of water, air, multiple VOCs, and NCGs in aqueous, gaseous, and NAPL phase	2002	Pruess ve Batistelli (2002)

TOUGHREACT	Isı değişkenli çok fazlı akım ve reaktif taşınım (denge ve kinetik mineral disolüsyonu ve presipitasyonu, kimyasal aktif gazlar, sıvı içi ve emme reaksiyonu kinetiği ve biyobozunma) Nonisothermal multiphase flow and reactive transport including equilibrium and kinetic mineral dissolution and precipitation, chemically active gases, intra-aqueous and sorption reaction kinetics, and biodegradation	2004	Xu ve Pruess (2001); Xu vd (2004)
TOUGH+	TOUGH2 simülatörünün geliştirilmiş ve genişletilmiş versiyonu, özellikle hidrat içeren jeolojik ortam simülasyonu için Re-engineered and expanded version of TOUGH2 simulator, specifically for the simulation of hydrate-bearing geologic media	2008	Moridis (2003); Moridis vd (2008)
TOUGH-FLAC	Tam etkileşimli çok fazlı akım ve jeomekanik prosesler için araştırma kodu ; bağlantılar TOUGH2 ve FLAC3D (Itasca, 1997 Finsterle vd 2012 den alıntı) Research code for coupled multiphase flow and thermal-geomechanical processes; links TOUGH2 and FLAC3D (Itasca, 1997 Finsterle vd 2012 den alıntı)	Kullanıma Kapalı No public release	Rutqvist vd (2002)
TOUGH-MP	TOUGH 2 nin paralel versiyonu Massively parallel version of TOUGH2	2008	Zhang vd (2008)
ECO2M	Sub ve süperkritik CO ₂ nin çok fazlı akımı Multiphase flow of sub- and supercritical CO ₂	2011	Pruess (2011)

Geliştirilen sayısal modellerin uygulanmasıyla dünyanın değişik bölgelerindeki jeotermal sahaların sayısal modellemesi yapılarak bu sahaların en uygun şekilde geliştirilmeleri ve optimum ve sürdürülebilir işletilmeleri sağlanmaktadır. Bu konuda yakın zamanlarda yapılan çalışmalara örnek olarak şu makaleler gösterilebilir (Jha ve Puppala, 2018; Quiano ve Zarrouk, 2018; Zeng vd., 2017; Ansari vd., 2017; Weijermars vd., 2017; Turalı ve Şimşek, 2017; Mroczec vd., 2016; Ratouis vd., 2016; Farkutdinov vd., 2016; Canet vd., 2015; Blocher vd., 2015; Zang vd., 2015; Llanos vd., 2015; Moridis ve Freeman, 2015; Finsterle vd., 2014; Lei ve Zhu, 2013; Zeng vd., 2013; Sippel vd., 2013; Cherubini vd., 2013; Gunnarsson vd.,

2012; Kuzevic vd., 2011; Suryadarma vd., 2010). Bunun yanında jeotermal sahalarındaki değişik hidrodinamik koşulların modellendiği ve sayısal modellerin geliştirilmeleri yönünde yapılan araştırmalar ve rezervuar ve akışkan fiziksel parametrelerinin sayısal modellemeye etkilerini araştıran çalışmalar da sunulmaktadır (Sonney ve Vuataz, 2009; Blocher vd., 2010; Ingebritsen vd., 2010; Kolditz vd., 2010; Pruess, 2011; Eckart vd., 2011; Yeh vd., 2012; Cerminara ve Fasano, 2012; Ganguly ve Kumar, 2012; Geiger vd., 2012; Finsterle vd., 2012; Bromley vd., 2013; Hu vd., 2013; Carotenuto vd., 2013; Ostermeyer ve Srisupattarawanit, 2013; Fusi vd., 2013; Jiang vd., 2014; Hathorn vd., 2014; Pogacnik vd., 2014; Dou vd., 2014; Jing vd., 2014; Magnusdottir ve

Finsterle, 2015; Fairs vd., 2015; Chen vd., 2015; Magliocco vd., 2015; Xu vd., 2015; Xing vd., 2015; Gelet vd., 2015; Pan vd., 2015; Pratama ve Saptadji, 2016; Abdelaziz vd., 2016; Cao vd., 2016; Ansari vd., 2017; Soboleva, 2017; Feng vd., 2017; Randi vd., 2017; Wijaya ve Purqon, 2017; Battistelli vd., 2017) .

İlk kez Brown (2000) tarafından ileri sürülen jeotermal sistemlerde akışkan olarak CO₂ kullanılması önerisi 2000 li yıllardan itibaren geçirgenliği çok düşük rezervuarlarda ve kızgın kuru kaya tipi jeotermal sistemlerde modelleme çalışmalarında uygulanmaya başlanmıştır. Pruess (2006) konu ile ilgili olarak araştırmaların başlatıldığını ve CO₂ akışkan ile modelleme çalışmalarının geliştirildiğini aktarmaktadır. Aynı çalışmada CO₂ in suya göre farklı termofiziksel parametrelere sahip olduğunu ileri sürmekte ve enerji üretilmesi konusunda CO₂ kullanımının çeşitli avantajlar sağladığını belirtmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak CO₂ akışkan olarak kullanılmasının rezervuarlarda CO₂ depolanmasını (sequestration) sağlayacağı ileri sürülmüştür. Bu durum diğer araştırmacılar tarafından da araştırılmış ve CO₂ ve su kullanımının avantaj ve dezavantajları ayrıntılı şekilde tartışılmıştır. Yakın zamanda güçlendirilmiş jeotermal sahaların modellenmesi ile ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılmıştır (Hayashi vd., 1999; Pruess, 2006; Jiang vd., 2013; Pan vd., 2015; Biagi vd., 2015; Xu vd., 2015; Magliocco vd., 2015; Xing vd., 2015; Zhao vd., 2015; Chen ve Jiang, 2016).

Türkiye’de Yapılan Modelleme Çalışmaları

Türkiye’de geçmişten itibaren kaplıca amaçlı kullanılan jeotermal sahaların enerji üretmek amaçlı kullanımı 1968 yılında MTA tarafından Kızıldere’de yapılan jeotermal sondajı ile başlamıştır. Kızıldere sahasının geliştirilmesi

amaçlı açılan kuyulardan elde edilen yaklaşık 200 °C sıcaklıktaki akışkan kullanılarak 20 MWe kapasiteli santral ile elektrik üretilmiştir. Yıllar içerisinde MTA tarafından bulunan jeotermal sahalar kamu sektörü ve özel sektör aracılığı ile geliştirilerek enerji üretimi, konut ısıtmacılığı, seracılık ve balneolojik gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar özellikle Ege Bölgesinde yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Ülkemizde jeotermal sahaların sayısal modellemesi konusundaki ilk çalışma Karahanoğlu tarafından hazırlanan Doktora Tez çalışması ile literatüre kazandırılmıştır (Karahanoğlu 1983; Karahanoğlu vd., 1984). Bu çalışmada Kızıldere sahasının sayısal modellemesi yapılarak Kızıldere sahasının üretilmesi ile rezervuarda oluşacak basınç ve sıcaklık değişimlerinin neler olacağı yanında rezervuarda gelişebilecek yüzey çökmesi mekanizması da modellenmiştir. Geliştirilen matematiksel modelde jeotermal rezervuarlardaki hidrodinamik (akım), hidrotermal (enerji) ve mekanik (yüzey çökmesi) süreçlerini tanımlayan diferansiyel denklemler, sıcak su tipi jeotermal rezervuarlar için birbirleri ile tam etkileşimli (fully coupled) olarak oluşturulmuştur. Sonlu Elemanlar sayısal modeli kullanılarak çözülen bu denklem sistemlerinin oluşturduğu sayısal model Kızıldere sahasına uygulanmış geçmişteki üretim değerleri kullanılarak model kalibre edilmiş ve o yıllarda yapılan üretim sonucu rezervuar sıcaklığında (sıcaklık), basınç (P) değerlerinde ve yüzey çökmesinde (deplasman) üretim sonucu meydana gelebilecek değişimler tahmin edilmiştir.

Gök vd. (2005) Balçova Narlıdere’deki sıvı baskın bir jeotermal sahanın üç boyutlu sayısal modellemesini TOUGH2 simülasyon kodu kullanarak yapmıştır. Bu sayısal model jeolojik,

jeofiziksel, jeokimyasal verilerin yanısıra sondaj ve kuyu testlerinden gelen verileri de içermektedir. Doğal durum modellemesi başlangıçta kuyularda ölçülen sıcaklık ve basınç verileriyle uyum sağlanarak yapılmıştır. Doğal durum modellemesi daha sonra kuyulardaki bütün üretim ve enjeksiyon verilerini (akış oranı, basınç, sıcaklık değerlerinin zaman ile değişimi) yakalayabilmek için kalibre edilmiştir. Model kalibre edildikten sonra toplam rezervuar performansını ve ayrı ayrı kuyu performansını belirlemek üzere 20 yıllık tekrar çalıştırılmış ve bu 20 yıllık süreçte kuyudibi basıncı ve sıcaklığı cinsinden üretimin sürdürülebilir olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak iki yeni kuyu açılması halinde ve aynı enjeksiyon oranlarıyla devam edilirse sistemin bir 20 yıl daha sürdürülebilir olduğu belirlenmiştir.

Özkaya (2007) yüksek lisans tez çalışmasında SUTRA programı ile Kızıldere sahasının sayısal modelini çalışmış ve geliştirdiği sayısal modeli geçmişteki üretim değerlerini kullanarak jeotermal sahaya kalibre etmiştir. Daha sonra sahada mevcut tüm kuyuları kullanarak değişik üretim ve enjeksiyon senaryolarına karşılık zaman içerisinde olabilecek sıcaklık ve basınç değişimlerini tahmin etmiş ve farklı enjeksiyon ve üretim koşullarının etkilerini ortaya koymuştur.

Can ve Budak (2008) hazırladıkları iki boyutlu sayısal modeli Kızıldere sahasına uygulamışlar ve rezervuarı gözenekli ortam olarak değerlendirmişler ve akışkan üretimini tek bir kuyudan yapıyor şeklinde varsaymışlardır. 1984-1998 yılları arasındaki üretim değerlerini kullanarak modeli kalibre etmişler ve gözlenen değerlerle uyumlu sonuçlar aldıklarını ve sonuç olarak mevcut kuyuların 20 MWe elektrik üretmek için yeterli olmayacağını ifade etmişlerdir.

Magri vd. (2010) yaptıkları çalışmada Narlıdere-Balçova derin jeotermal sistemindeki jeotermal akışkan dinamiği ve enerji taşınımını tam etkileşimli olarak modellemeyi araştırmışlardır. Yapılan çalışmada doğal beslenme miktarlarının, jeotermal sistemdeki faylar boyunca gelişebilecek akışkan dinamiği süreçlerinin değişik jeotermal rezervuar oluşumlarına neden olabileceği ve deniz suyu girişimi riskinin mümkün olabileceği, dikey yöndeki fayların bu konuda etkili olduğu ve derinlerde gelişip yükselen sıcak suların dengesiz olduğu ve dolayısı ile sıcaklıklarda salınımlara neden olduğu ifade edilmiştir. Yapılan bu araştırma sonunda Seferihisar-Balçova derin jeotermal sistemindeki modelleme çalışmalarının kalitatif olarak rezervuarda gelişen değişik akım koşullarını modellediği belirtilmiştir.

Günay ve Karahanoğlu (2015) Edremit jeotermal sahasının sayısal modelini yapmış ve sahada yapılan değişik üretim senaryolarının rezervuara etkisini araştırmıştır. Edremit jeotermal sahasının kavramsal modeli kullanılarak zamana bağlı, iki boyutlu kesit sonlu elemanlar modeli oluşturulmuş ve ılık ve sıcak iki farklı seviyeden oluşan jeotermal sistemin doğal durum kalibrasyonunu takiben değişik üretim ve enjeksiyon koşullarında rezervuarların davranışı araştırılmıştır.

Yoğurtcuoğlu (2016) Edremit jeotermal sahasının üç boyutlu sonlu elemanlar entegre modelini gerçekleştirmiştir. Rezervuarda hidrolik eğim değerlerinin bulunması için iki boyutlu alansal model yapılmış ve sonraki aşamada bu değerler üç boyutlu sonlu elemanlar modeli ile entegre edilerek sayısal model çalışması gerçekleştirilmiştir. Sayısal modelin sahaya kalibre edilmesinden sonra farklı senaryolar üretilerek jeotermal sistemin sürdürülebilir üretim ve enjeksiyon koşullarının etkisi irdelenmiştir.

Turalı ve Şimşek (2017) yaptıkları araştırmada TOUGH2 simülatörü kullanarak Sorgunda bulunan jeotermal sistemi modellemiştir. Bu çalışmada uygun sınır koşulları ve fiziksel parametreler kullanılarak kavramsal model hazırlanmış ve üretim öncesi kuyularda statik sıcaklık değerleri kullanılarak doğal rezervuar koşulları modellenmiştir. Modellenen ve gözlenen sıcaklık değerleri arasında iyi bir uyum elde edildikten sonra 2007-2014 arası üretim/enjeksiyon ve entalpi üretim değerleri kullanılarak sayısal modelin tarihsel kalibrasyonu gerçekleştirilmiş ve gözlenen su seviyeleri ve sıcaklık değerlerinin hesaplananlarla iyi uyum sağladığı görülmüştür.

2007 yılında çıkartılan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile jeotermal sahaların özel sektörler tarafından geliştirilmeleri ve işletilmeleri konusu gündeme gelmiştir. Bu durum yüksek sıcaklığa sahip jeotermal sahaların enerji amaçlı olarak üretilmelerini sağlamış ve dolayısı ile mevcut sahaların geliştirilerek enerji santrallerinin kurulmalarını gerekli kılmıştır. Halen birçok sahada (Kızıldere, Germencik gibi) enerji santralleri kurulmuştur ve jeotermal rezervuarlar işletilerek elektrik üretilmektedir. Jeotermal sahaların işletim haklarının özel sektörlere devredilmeleri neticesinde mevcut rezervuarların kapasiteleri yeni kuyular açılarak geliştirilmiş ve yüksek kapasiteli santraller kurularak elektrik enerjisi üretimi sağlanmıştır.

İşletim haklarının özel sektörlere devredilmeleri mevcut jeotermal sahaların geliştirilmeleri konusunda olumlu adımların atılmasını sağlamıştır ancak bu sahalarda yapılan sayısal modelleme çalışmaları konusundaki bilgi paylaşımı asgari düzeye indirilmiştir. Ruhsat sahibi firmaların ticari kaygı ile modelleme çalışmaları hakkındaki bilgileri kamuoyu ile paylaşmamaları durumu ortaya çıkmıştır. Bunun

sonucu olarak ülkemizdeki sayısal modelleme çalışmaları hakkında yayımlanan bilgiler kamuya açık sahalarda yapılan araştırmalarla ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çıkarılmadan önceki dönemlerde yapılan çalışmalarla sınırlı kalmıştır.

Jeotermal enerji santrallerinin kurulması öncesinde yapılması gerekli olan sayısal modelleme çalışmalarının genellikle yurt dışı kaynaklı profesyonel firmalarca yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu durum ise jeotermal enerji kapasitesi açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan ülkemizde jeotermal sahaların sayısal modellemesi konusundaki araştırmaların yapılabilmesinin son derece kısıtlı olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

TEMEL PRENSİPLER VE MODEL DENKLEMLERİ

Jeotermal rezervuarlarda akışkan hareketini ve ısı yayılımını kontrol eden hidrotermal ve hidrodinamik mekanizmalar etkilidir. Bu nedenle jeotermal rezervuarların sayısal modellenmesi için bu iki mekanizmanın rezervuar ortamında ve rezervuar sınırlarında matematiksel terimlerle ifade edilmeleri gerekmektedir.

Matematiksel Model Denklemleri

Jeotermal rezervuarlarda akışkan hareketi ve enerji taşınımı mekanizmaları matematiksel olarak kısmi diferansiyel denklemler kullanılarak ifade edilmektedir. Denklemler oluşturulurken kütle ve enerjinin korunumu prensipleri ve devamlılık kuramı esas alınmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan denklemlerin ayrıntılarına Karahanoğlu vd. (1984) çalışmasında ulaşılabilir. Model denklemlerinin son halleri aşağıda verilmektedir:

Akım Denklemi

Jeotermal rezervuarlarda akışkan hareketinin matematiksel olarak ifade edilmesi için kütle korunması ve akımın devamlılığı ilkeleri ve Darcy yasası esas alınmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan diferansiyel denklem tek fazlı akışkan için aşağıda verilmektedir:

$$\frac{\partial}{\partial X_i} k_{ij} \frac{\partial}{\partial X_j} \left[\frac{P}{\gamma^f} + H \right] - \Phi \beta^f \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\Phi}{K_B^f} \frac{\partial P}{\partial t} + (1-\Phi) \beta^s \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial Q_f}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

Bu denklemde P basınç değişkenini ve T ise sıcaklık değişkenini göstermektedir. Ayrıca k ortamın permeabilitesini, H belirli bir seviyeden yüksekliği, Φ gözenekliliği, γ^f akışkan birim ağırlığını, β^f ve β^s akışkan ve katı kısmın ısıl genleşme katsayılarını, Q terimi ise birim zamandaki akım miktarını ifade etmektedir. Denklem dikkatli incelendiğinde, fiziksel parametrelerin sabit oldukları bir tarafa bırakılırsa, basınç değişkeninin zamana bağlı

olduğu ve mekan koordinatları ile etkilendiği görülmektedir. Ayrıca bu denklem içinde sıcaklık değişkeninin de yer aldığı ve böylelikle tek denklem sistemi içinde iki adet bilinmeyen değişken bulunduğu izlenmektedir.

Enerji Denklemi

Gözenekli ortamda ısı hareketi Enerjinin korunumu prensibi kullanılarak aşağıdaki kısmi diferansiyel denklemle ifade edilmektedir (Karahanoğlu vd, 1984). Konvektif ve konduktif ısı taşınım terimlerini içeren bu denklem yazılırken akışkan yoğunluğunun sıcaklık ve basınç değişkenlerine bağlı olduğu varsayılmış diğer katsayılar sabit olarak alınmıştır.

$$\left[(1-\Phi) \rho_s c_s + \Phi \rho_f c_f - \Phi \rho_f c_f \beta^f T \right] \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial X_i} K_{ij} \frac{\partial T}{\partial X_j} + \frac{\Phi \rho_f c_f}{K_B^f} T \frac{\partial P}{\partial t} + \Phi \rho_f c_f v_i^a \frac{\partial T}{\partial X_i} - \frac{\partial Q_h}{\partial t} = 0 \quad (2)$$

Karahanoğlu

Denklemden yer alan ρ_s , c_s ve ρ_f , c_f terimleri katı ve akışkanların yoğunluklarını ve birim ısı kapasitelerini göstermektedir ve K_{ij} ise ısı konduktivite matrisini ifade etmektedir. (1) ve (2) nolu denklemler dikkatlice incelendiğinde akım denkleminde sıcaklık değişkenine bağlı terim, enerji denkleminde ise basınç değişkenine bağlı terim yer almakta ve bu durum her iki denklemin birbirleri ile tam etkileşimli (fully coupled) olduklarını göstermektedir. Diğer taraftan akım denkleminde olduğu gibi bu denklem sisteminde de iki adet bilinmeyen değişken (P ve T) bulunmaktadır ve böylelikle iki denklem sistemi ile iki bilinmeyen değişken eşitliği elde edilmiştir.

Jeotermal rezervuarlarda akışkan ve ısı taşınımını ifade eden bu denklemlerin yanında sınır koşullarının da matematiksel olarak yazılması gerekmektedir. Bu konudan hareketle sınırdaki akışkan hareketinin devamlılığının sağlanabilmesi

$$-n_i k_{ij} \frac{\partial P}{\partial X_j} \left(\frac{P}{\gamma^f} + H \right) - \frac{\partial q_f}{\partial t} = 0 \quad (3)$$

ifadesi ile sağlanmakta ve $\partial q_f / \partial t$ ise sınırdaki birim alandaki akışkan boşalım hızını göstermektedir. Sabit sınır değerleri olarak $P = P^b$ ve $T = T^b$ sınırdaki bilinen basınç ve sıcaklık değerleri kullanılmaktadır. Sınırdaki konduktif ısı akımının devamlılığı

$$-n_i k_{ij} \frac{\partial T}{\partial X_j} - \frac{\partial q_h}{\partial t} = 0 \quad (4)$$

ifadesi ile gerçekleştirilmekte ve yine sınırdaki konvektif ısı akımının devamlılığı ise

$$-n_i k_{ij} \frac{\partial T}{\partial X_j} - h^T (T - T_f) = 0 \quad (5)$$

şeklinde yazılmaktadır ve denklemden h^T terimi konvektif ısı taşınım katsayısını, T_f ise referans sınır sıcaklık değerini ve n_i sınıra dik birim vektörü göstermektedir.

Sınır koşullarının belirlenmesi ile (1) ve (2) nolu denklemlerle jeotermal rezervuarlarda tek fazlı akışkan akımı ile enerji taşınımının matematiksel olarak modellenmesi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Sayısal modellemenin yapılabilmesi için yukarıda yazılan denklem sistemlerinin sayısal olarak çözülmesi ve böylece bilinmeyen değişkenlerin zaman ve mekan boyutlarındaki dağılımlarının bulunması gerekmektedir.

Sayısal Model

Önceki kısımda yazılan (1) ve (2) nolu kısmi diferansiyel denklemlerin (3), (4) ve (5) nolu sınır koşullarıyla birlikte çözülmesi için Sonlu Elemanlar veya Sonlu Farklar yöntemi uygulanarak denklemler Lineer Cebirsel Denklem sistemlerine dönüştürülmektedir. Matris yöntemi ile ifade edildiğinde sonlu elemanlarda elemanların düğüm sayısı, sonlu farklarda ise grid noktaları sayısı kadar denklem ve bir o kadar bilinmeyenden oluşan denklemler elde edilmektedir. Bu denklemlerin uygun sınır koşulları ve rezervuarı en iyi şekilde temsil eden fiziksel parametreler kullanılarak çözülmesi ile bilinmeyen değişkenlerin (basınç, sıcaklık) rezervuar ortamında ve zaman içindeki dağılımları bulunmaktadır. Elde edilen bu çözüm değerleri gözlenen değerlerle karşılaştırılarak gerçek çözüm değerlerinin elde edilmesi sağlanmaktadır. Gözlenen değerlerle hesaplanan değerler arasındaki farklar kalibrasyon denilen yöntemler kullanılarak minimum seviyeye indirilmektedir.

tanımlanması yani rezervuar sınırlarındaki hidrodinamik ve hidrotermal süreçlerin matematiksel olarak ifade edilmeleri gereklidir. Dinamik sayısal model oluşturabilmek için ayrıca başlangıç koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Sınır koşulları ve başlangıç koşulları belirlenirken bilinmeyen değişkenlerin (P basınç, T sıcaklık) rezervuar sınırlarındaki hidrodinamik ve hidrotermal davranışlarının sayısal modele tanıtılmaları şarttır. Jeotermal rezervuarın başlangıç koşulları olarak rezervuarın doğal denge durumu (rezervuarın işletmeye açılmadan önceki durumu) değerlendirilmekte ve basınç ve sıcaklık değerlerinin rezervuardaki dağılımları tahmin edilmektedir. Sınır koşullarının belirlenmesi ise rezervuar sınırlarında basınç ve sıcaklık bilinmeyenleri değerlerinin veya bu değişkenlerin türevlerinin matematiksel olarak ifade edilmeleri ile gerçekleştirilmektedir.

Başlangıç ve sınır koşullarının belirlenmesi ile denklem sistemleri sayısal çözüme hazır duruma getirilmekte ve bu denklemlerin çözülmesi sonucu değişkenlerin değişik zaman dilimleri içinde jeotermal rezervuar ortamındaki dağılımları elde edilmektedir.

Genel olarak bu çerçevede gerçekleştirilen ve sayısal modellemede kullanılarak sahalara uygulanan simülasyonlar zaman içerisinde geliştirilerek jeotermal rezervuarlarda gelişen her türlü doğal süreçlerin simülasyonu yapılmaktadır. Ancak bu tür simülasyonları oluşturan kaynak programlara ulaşım mümkün değildir. Dolayısı ile simülasyonun öngördüğü standart rezervuar koşulları dışındaki süreçlerin modellenmesinde sorunlar oluşabilmektedir. Ayrıca kaynak programa ulaşım olmaması nedeniyle sayısal modelleme konusunda yer bilimcilerimizin eğitilmeleri ciddi anlamda kısıtlanmaktadır.

GENEL DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLAR

Jeotermal rezervuarların sayısal yöntemler kullanılarak modellenmesi ve jeotermal sistemlerin üretimi ile rezervuarlarda basınç ve sıcaklık değişimlerinin bilimsel olarak takip edilebilmesi 1970 li yıllardan beri yapılan araştırmalarla gerçekleştirilebilmektedir. 1960 lı yıllarda Jeotermal sistemlerdeki doğal mekanizmaların matematiksel olarak ifade edilmeleri şeklinde başlayan araştırmalar 1970 lerde bilgisayar teknolojisinde gözlenen hızlı gelişmelerle ivme kazanmış ve sayısal yöntemler kullanılarak rezervuarların modellenmesi ve dolayısı ile sistemlerin bilimsel olarak ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmelerine imkan sağlanmıştır. Önceleri iki boyutlu ve tek fazlı akışkanlar için hazırlanan sayısal modeller zaman içerisinde çok fazlı (sıvı, gaz) akışkanların (sıcak su, buhar, hava, CO₂) üç boyutlu rezervuarlardaki hareketini modelleyebilecek duruma gelmiş ve akışkan hareketi ve enerji taşınımı mekanizmaları ötesinde yüzey çökmesi, kimyasal reaksiyonlar, CO₂ depolanması/gömülmesi, çeşitli jeomekanik prosesler, biyodejenerasyon ve benzer mekanizmaların değerlendirildiği simülasyonlar geliştirilmiştir. İlk yıllarda sabit fiziksel parametreler kullanılarak hazırlanan sayısal modeller zaman içerisinde basınç ve sıcaklık değişkenlerine bağlı parametrelerin kullanıldığı modellere dönüştürülmüştür.

Sayısal modelleme konusunda yapılan çalışmaların zaman içerisindeki evrimine bakıldığında ilk yıllarda ticari olmayan ve kullanıma açık kodların kullanıldığı ve model çalışmalarının bilimsel ortamlarda paylaşıldığı görülmektedir. Ancak zaman içerisinde yapılan çalışmalarda program çabalarının paylaşılması yerine bilinen programların değişik sahalara uygulandığı ve karşılaşılan sorunların tartışıldığı

toplantılar yapılarak malum programların iletilen sorunları çözüme yönünde geliştirildikleri anlaşılmaktadır.

Sayısal modelleme çalışmalarının önemli bir aşamasını jeotermal rezervuarların kavramsal modelinin hazırlanması ve sistemin fiziksel özelliklerinin bilgisayar ortamına aktarılması oluşturmaktadır. Matematiksel denklemler kullanılarak ifade edilen ısı taşınımı ve akışkan hareketi mekanizmalarının modeli yapılan sahaya uygulanabilmesi ilgili sahanın tüm özelliklerinin simülatora tanıtılması ile mümkün olmaktadır. Denklemlerde yer alan çeşitli parametrelerin arazi ortamındaki değerlerinin belirlenmesi ve bu değerlerin dağılımlarının bulunması hazırlanan sayısal modelin başarısı açısından son derece önemlidir. Diğer taraftan rezervuarın sınır ve başlangıç koşullarının yani ilgili mekanizmaların sınırlardaki davranışlarının matematiksel olarak ifade edilmesi ve rezervuarın üretime açılmadan önceki doğal durumunun (basınç ve sıcaklık dağılımlarının) gerçekçi olarak belirlenmesi model başarısını etkileyen çok önemli bir husustur.

Doğal ortamda çeşitli etmenler altında ve uzun yıllar içinde oluşan jeotermal sistemlerdeki karmaşıklığın, ve jeotermal sistemlerin yapısal unsurlarının ve tüm fiziksel özelliklerinin kavramsal modeller yardımı ile sayısal modellere aktarılması söz konusu fiziksel parametrelerin rezervuar ortamını en iyi şekilde temsil etmesi ile gerçekleşmektedir. Bu durum bahsedilen fiziksel parametrelerin, ve denklemlerde bulunan katsayıların belirlenmesinde çok titiz araştırmaların (arazi ve laboratuvar çalışmaları) yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde jeotermal sistemlerin sınır ve başlangıç koşullarının arazi koşullarını temsil edecek türde belirlenmesi yapılacak modelleme çalışmalarının başarısını en üst düzeyde

etkilemektedir. Böylelikle doğadaki jeotermal sistem/rezervuar bilgisayar ortamına aktararak sayısal model oluşturulmakta ve model sistem/rezervuar simülator kullanılarak değişik üretim ve enjeksiyon senaryolarının sisteme yapacağı etkiler araştırılabilmektedir.

Sayısal modelleme çalışmalarının zaman içerisinde gelişimi ve bu konuda dünya genelinde yapılanlar gözden geçirildiğinde simülasyon çalışmalarının çok başarılı olduğu ve bu bağlamda jeotermal rezervuarların daha verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirildikleri anlaşılmaktadır. Hemen hemen her türlü karmaşık mekanizmaların modellenilebilir olmasının yanında çok farklı jeolojik yapıların kavramsal model şeklinde tanımlanabildiği sayısal modeller oluşturulabilmektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar ülkemizin tektonik yapısının jeotermal sahaların oluşumu için çok elverişli olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Ege bölgesinde mevcut yüksek entalpili jeotermal sahaların elektrik enerjisi elde etmek için üretildikleri ve bu sahaların geliştirilmeleri yönünde araştırmaların devam ettiği bilinmektedir. Jeotermal enerji açısından belli bir zenginliğe sahip ülkemizin bu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bu sahaların bilgisayar teknolojisi kullanılarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu konuda elde edilen teknoloji ve bilgi birikiminden yararlanma anlamında yerbilimcilerin eğitilmesinin önemli olduğu vurgulanmalıdır.

Ülkemizde bulunan jeotermal sahaların sayısal modellemesi konusunda yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar çok az sayıda olup genelde bilinen programların ilgili sahalar uygulamaları şeklinde gerçekleşmektedir. Sayısal modelleme çalışmalarında saha verisi zenginliğinin önemi bilinmekle beraber son

yıllarda yapılan işletim politikaları nedeniyle veri paylaşımının çok kısıtlandığı ve bu durumun söz konusu araştırmaları olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir.

KATKI BELİRTME

Bu makalenin hakemler tarafından değerlendirilmesi sırasında verdikleri değerli katkılar için Sayın Prof. Dr. Şakir Şimşek'e ve ismini bilmediğim Hakem'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaptıkları çok titiz ve ayrıntılı incelemeleri ve yapıcı eleştirileri makalenin üstün kaliteye ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca makalenin hazırlanması aşamasında Çizelge 1 deki emeği için Emre Günay'a teşekkür ediyorum.

KAYNAKLAR

- Abdelaziz, R., Komori, F.S., Carreno, M.N.P., 2016. Multiphase thermal-fluid flow through geothermal, International Scientific Conference - Environmental and Climate Technologies, Conect 2015, Riga, Latvia, Oct 14-15, 2015, Energy Procedia, 95, 22-28.
- Aboutit, B. L., Advani, S.H., Lee, J.K., 1985. Variational principles and finite element simulations for thermo-elastic consolidation. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 9, 45-69.
- Absar, K.V., Bajpai, I.P., Sinha, A.K., Ashwini, K., 1996. Reservoir modeling of Puga geothermal system, Iadakh, Jammua and Kashmir. Geological Survey, India, 69-74.
- Amistoso, E.A., Aquino, B.G., Aunzo, Z.P., Jordan, O.T., Sta. Ana, F.X.M., Bovardsson. G.S., Daughy, C., 1993. Reservoir analysis of the Palimpinon geothermal field, Negros Oriental, Philippines, Geothermics, 22 (5/6), 555-574.
- Ansari, E., Hughes, R., White, C.D., 2017. Statistical modeling of geopressured geothermal reservoirs. Computers and Geosciences, 103, 36-50.
- Antics, M., 2000. Computer simulation of geothermal reservoirs in the Pannonian Basin, Eastern Europe. Proceedings World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku, Japan, May 28-June 10 2000, 2497-2502.
- Antics, M.A., 1998. Computer modeling of an over pressured medium enthalpy geothermal reservoir located in deep sedimentary basin. Proceedings of the 23 rd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 26-28 January 1998, 362-367.
- Antics, M.A., 1997. Computer simulation of Oradea geothermal reservoir Proceedings of the 22nd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 27-29 January 1997, 491-495.
- Antunez, E.U., Menzies, A.J., Sanyal, S.K., 1991. Simulating a challenging water dominated geothermal system: the Cerro Prieto field, Baja, California, Mexico. Proceedings of 16th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 23-25 January 1991, 183-191.
- Antunez, E.U., Sanyal, S.K., Carella, R., Guidi, A., 1990. Quantitative verification of the hydrogeological model of the Mufete geothermal field, Campania, Italy. Transactions geothermal Resources Council 14, 1263-1270.
- Antunez, E.U., Bodvarsson, G.S., Walters, M.A., 1994. Numerical-Simulation Study of the Northwest Geysers Geothermal-Field, a Case-Study of the Coldwater Creek Steamfield. Geothermics, 23, 2, 127-141.
- Arellano, V., Garcia, A., Barragan, R., Izquierdo, G., Aragon, A., Nieva, D., 2003. An updated conceptual model of the Los Humeros geothermal reservoir (Mexico). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 127, 67-88.
- Arias, A., Dini, I., Cassini, M., Fiordelisi, A., Peticone, I., Dell'Aiuto, P., 2010. Geoscientific feature update of the Larderello-Travale geothermal system (Italy) for a regional numerical modeling. In: Proc World geothermal congress 2010, Bali, Indonesia.

- Arihara, N., Yoshida, H., Hanano, M., Ikeuchi, K., 1995. A simulation study on hydrothermal system of the Kakkonda geothermal field. Proceedings World Geothermal Congress'95, Florence, 18-31 May 1995, 1715-1720.
- Arnorsson, S., 1995. Geothermal systems in Iceland: structure and conceptual models-I. High temperature areas. *Geothermics*, 24, 561-602.
- Atmojo, J.P., Itoi, R., Tanaka, T., Fukuda, M., Sudarman, S., Widiyarso, A., 2000. Modeling studies of Sudayak geothermal reservoir Northern Sumatra, Indonesia. Proceedings of World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku, Japan, May 28-June 10 2000 2037-2042.
- Aunzo, Z., Steingrimsson, B., Bodvarsson, G.S., Escobar, C., Quintanilla, A., 1989. Modeling studies of the Ahuachapan geothermal field, El Salvador. Proceedings of the 14 th workshop on geothermal reservoir engineering report, Stanford University, Stanford, California, 26-28 January 1989, 287-295.
- Axelsson, G., Bjornsson, G., 1993. Detailed three dimensional modeling of the Btn hydrothermal system in N-Iceland. Proceedings of the 18 th workshop on geothermal reservoir engineering, Stanford, California (USA), 26-28 January 1993, 159-166.
- Barelli, A., Ceccarelli, A., Dini, I., Fiordelisi, A., Giorgi, N., Lovari, F., 2010a. A review of the Mt. Amiata geothermal system, Italy. In: Proc World geothermal congress 2010, Bali, Indonesia.
- Barelli, A., Cei, M., Lovari, F., Romagnoli, P., 2010b. Numerical modeling for the Larderello-Travale geothermal system, Italy. In: Proc World geothermal congress 2010, Bali, Indonesia.
- Barmin, A.A., Kondrashov, A.V., 2000. Two-front mathematical model of water injection into a steam-saturated geothermal reservoir, *Fluid Dynamics*, 35, 3, 399.
- Bataille, A., Genthon, P., Rabinowicz, M., Fritz, B., 2006. Modeling the coupling between free and forced convection in a vertical permeable slot: Implications for the heat production of an Enhanced Geothermal System. *Geothermics*, 35, 5-6, 654-683.
- Battistelli, A., Calore, C., Pruess, K., 1997. The simulator TOUGH2/EWASG for modelling geothermal reservoirs with brines and non-condensable gas, *Geothermics*, 26, 4, 437-464.
- Battistelli, A., Swenson, D., Alcott, A., 2017. Improved PetraSim-TOUGH2 capabilities for the simulation of Geothermal reservoirs, In: Proc of 42nd workshop on geothermal reservoir engineering, Stanford, California (USA).
- Battistelli, A., Yiheyis, A., Calore, C., Ferragina, C., Abatneh, W., 2002. Reservoir engineering assessment of Dubti geothermal field, Northern Tendaho Rift, Ethiopia, *Geothermics*, 31, 381-406.
- Battistelli, A., Yiheyis, A., Calore, C., Ferragina, C., Abathneh, W., 1998. Tendaho geothermal project (Ethiopia): Reservoir engineering studies in the Dubti area. Proceedings of the World Renewable Energy Congress V, Florence 1998, 2741-2745.
- Battistelli, A., Calore, C., Rossi, R., Wu, F., 1992. Reservoir engineering study of Nagqu geothermal field (Tibet autonomous region, PRC). Presented at the High Temperature Geothermal Resources Workshop, Lhasa, 9-16 August 1992.
- Bear, J., Çorapçıoğlu, M.Y., 1981. A mathematical-model for consolidation in a thermoelastic aquifer due to hot water injection or pumping, *water resources research*, 17, 3, 723-736.
- Bertani, R., Capetti, G., 1995. Numerical simulation of the Monteverdi zone (western border of the Larderello geothermal field). Proceedings World Geothermal Congress'95, Florence, 18-31 May 1995, 1735-1740.
- Biagi, J., Agarwal, R., Zhang, Z.M., 2015. Simulation and optimization of enhanced geothermal systems using CO₂ as a working fluid, *Energy*, 86, 627-637.
- Bjornsson, G., 1999. Predicting future performance of a shallow steam zone in the Svartsengi geothermal field, Iceland. Proceedings of the 24th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 25-27 January 1999 116-122.

- Blocher, M.G., Zimmermann, G., Moeck, I., Brandt, W., Hasanzadegan, A., Magri, F., 2010. 3D numerical modeling of hydrothermal processes during the lifetime of a deep geothermal reservoir, *Geofluids*, 10, 406-421.
- Blocher, G., Cacace, M., Reinsch, T., Watanabe, N., 2015. Evaluation of three exploitation concepts for a deep geothermal system in the North Germain Basin, *Computers and Geosciences*, 82, 120-129.
- Bloomfield, K.K., Moore, J.N., Sperry, T.L., 1998. Cove-Fort Sulphurdale reservoir numerical simulation. *Transactions Geothermal Resources Council*, 22, 149-152.
- Boardman, S., Ali Khan, M., Artunez, E., 1996. TOUGH²/PC Application simulation project for Heber geothermal field, California, a progress report. *Proceedings of the 21st workshop on geothermal reservoir engineering*, Stanford, California (USA).
- Bodvarsson, G.S., 1988. Model predictions of the Svartgengi reservoir, Iceland, *Water Resources Research*, 24 (10), 1740-1746.
- Bodvarsson, G.S., Bjornsson, J., Gunnarsson, A., Gunnlaugsson, E., Sigurdsson, O., Stefansson, V., Steingrimsdottir, B., 1990a. The Nesjavellir geothermal field, Iceland: 1. Field characteristics and development of a three-dimensional numerical model. *Journal of Geothermal Science and Technology*, 2 (3), 189-228.
- Bodvarsson, G.S., Pruess, K., Haukwa, C., Ojiambo, S.B., 1990b. Evaluation of model predictions for the Olkaria East Geothermal Field, Kenya, *Geothermics*, 19, (5), 399-414.
- Bodvarsson, G.S., Pruess, K., Lippmann, M., Bjornsson, S., 1981. Improved Energy Recovery From Geothermal Reservoirs, 56th Annual Technical Conference and Exhibition of the Society of Petroleum Engineers of AIME, San Antonio, Texas, USA.
- Bodvarsson, G.S., Pruess, K., Lippmann, M., Bjornsson, S., 1982. Improved energy recovery from geothermal reservoirs. *Journal of Petroleum Engineers Journal*, 1920-1928.
- Bodvarsson, G.S., Pruess, K., Stefansson, V., Bjornsson, S., Ojiambo, S.B., 1987a. East Olkaria Geothermal Field, Kenya: 1. History match with production and pressure decline data, *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol 92, issue B1, 521-539.
- Bodvarsson, G.S., Pruess, K., Stefansson, V., Bjornsson, S., Ojiambo, S.B., 1987b. East Olkaria Geothermal Field, Kenya: 2. Predictions of well performance and reservoir depletion *Journal of Geophysical Research*, 92 (B1), 541-554.
- Bodvarsson, G.S., Pruess, K., Lippmann, M.J., 1986. Modeling of geothermal systems, *Journal of Petroleum Technology*, 1007-1021.
- Bromley, C., Brockbank, K., Glynn-Morris, T., Rosenberg, M., Pender, M., O'Sullivan, M., Currie, S., 2013. Geothermal subsidence study at Wairakei-Tauhara, New Zealand *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Geotechnical Engineering*, 166, 2, 211-223.
- Brown, D., 2000. A hot dry rock geothermal energy concept utilizing CO₂ instead of water. In: *Proceedings of 25th workshop on geothermal reservoir engineering*, Stanford CA, USA: Jan 2000. P. 233-8.
- Brownell, D.H., Garg, S.K., Pritchett, J.W., 1977. Governing equations for geothermal reservoirs, *Water Resources Research*, 13, 929-934.
- Bujakowski, W., Tomaszewska, B., Miecznik, M., 2016. The Podhale geothermal reservoir simulation for long-term sustainable production, *Renewable Energy*, 99, 420-430.
- Burnell, J.G., 1992. Modeling mass, energy and chloride flows in the Rotorua geothermal system. *Geothermics*, 21(1/2), 261-280.
- Butler, S.J., Sanyal, S.K., Henneberger, R.C., Klein, C.W., Gutierrez, H., de Leon, J.S., 2000. Numerical modeling of the Cerro Prieto geothermal field, Mexico. In: *Proc of world geothermal congress*, Kyushu, Japan.
- Canet, C., Trillaud, F., Prol-Ledesma, R.M., Gonzalez-Hernandez, G., Pelaez, B., Hernandez-Cruz, B., Sanchez-Cordova, M.M., 2015. Thermal history of the Acoculco geothermal system, eastern

- Mexico: Insights from numerical modeling and radiocarbon dating, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 305, 56-62.
- Can, I., Budak, A., 2008. Finite element modeling of the Kızıldere geothermal system, Turkey, *Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects*, 30, 12, 1098-1107.
- Cao, W.J., Huang, W.B., Jiang, F.M., 2016. Numerical study on variable thermophysical properties of heat transfer fluid affecting EGS heat extraction. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 92, 1205-1217.
- Carlino, S., Toriano, A., Di Guiseppe, M.G., Tramelli, A., Troise, C., Somma, R., De Natale, G. 2016. Exploitation of geothermal energy in active volcanic areas: A numerical modeling applied to high temperature Mofete Geothermal field, at Campi Flegrei caldera (Southern Italy). *Renewable Energy*, 87, 1, 54-66.
- Carotenuto, A., Massarotti, N., Mauro, A., 2013. A new methodology for numerical simulation of geothermal down-hole heat exchangers. *Applied Thermal Engineering*, 48, 225-236.
- Carradori, G., Peano, A., Voss, C.I., 1981. The geophase model for finite element simulation of multiphase geothermal reservoirs, in R.W. Lewis and Schrefler (Ed.) *Numerical Methods in Thermal Problems*, Proc. 2nd Int Conference in Venice, Pineridge Press, Swansea, 315-325.
- Cerminara, M., Fasano, A., 2012. Modeling the dynamics of a geothermal reservoir fed by gravity driven flow through overstanding saturated rocks. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 233-234, 37.
- Chen, F., Falta, R.W., Murdoch, L.C., 2015. Numerical Analysis of Thermal Remediation in 3D Field-Scale Fractured Geologic Media, *Groundwater*, 4, 572-587.
- Chen, J.L., Jiang, F.M., 2016. A numerical study of EGS heat extraction process based on a thermal non-equilibrium model for heat transfer in subsurface porous heat reservoir, *Heat and Mass Transfer*, 52, 2, 255-267.
- Cherubini, Y., Cacace, M., Scheck-Wenderoth, M., Moeck, I., Lewerenz, B., 2013. Controls on the deep thermal field: implications from 3-D numerical simulations for the geothermal research site Gro Schonebeck, *Environmental Earth Sciences*, 70, 8, 3610-3642.
- Croucher, A.E., O'Sullivan, M.J., 2008. Application of the computer code TOUGH2 to the simulation of supercritical conditions in geothermal systems. *Geothermics*, 37, 622-634.
- Driesner, T., Geiger, S., 2007. Numerical simulation of multiphase fluid flow in hydrothermal systems, *Fluid-Fluid Interactions, Reviews in Mineralogy & Geochemistry*, Ed: Liebscher, A., Heinrich, C.A., 65, 187-212.
- Dou, B., Gao, H., Zhou, G., Ren, L., 2014. Numerical simulation of heat transfer from hot dry rock to water flowing through a circulation fracture, 3rd International Conference on Materials Science and Engineering (ICMSE 2014), Jiujiang, Peoples R China, Jan 24-26, 2014, *Material Science and Advanced Technologies in Manufacturing*, Book Series: Advanced Materials Research, 852, 831-834.
- Eckart, M., Kories, H., Ruterkamp, P., Kaul, V., Bems, C., 2011. Flow-and Heat-Transport- simulation with an optimized discretization of the geological structure model, *International-Mine-Water-Association Congress on Mine Water - Managing the Challenges*, Aachen, Germany, Sep 04-11, 2011, Ed: Rude, T.R., Freund, A. Wolkersdorfer, C., 167-170.
- Emoricha, E.B., Omagbon, J.B., Malate, R.C.M., 2010. Three dimensional numerical modeling of Mindanao geothermal production field, Phillipines. In: *Proc of the 35th Workshop on Geothermal reservoir engineering*, Stanford, California (USA).
- Ertekin T., 1978. Numerical simulation of the compaction-subsidence phenomena in a reservoir for two phase non-isothermal flow. PhD Thesis, The Pennsylvania State University, 227p.
- Esberto, M.B., Sarmiento, Z.F., 1999. Numerical modeling of the Mt. Apo geothermal reservoir. In. *Proc. of the 24th workshop on reservoir engineering*, Stanford, California (USA).

- Fabrizi, P., Trevisani, S., 2005. Spatial distribution of temperature in the low-temperature geothermal Euganean field (NE Italy): a simulated annealing approach, *Geothermics*, 34, 5, 617-631.
- Fairs, T.H., Younger, P.L., Parkin, G., 2015. Parsimonious numerical modelling of deep geothermal reservoirs, *Proceedings of The Institution of Civil Engineers-Energy*, 168, 4, 218-228.
- Falta, R.W., Pruess, K., Finsterle, S., 1995. T2VOC User's Guide. Report LBLN-36400, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley CA, 165 pp.
- Farkhutdinov, A., Goblet, P., de Fouquet, C., Cherkasov, S., 2016. A case study of the modeling of a hydrothermal reservoir: Khankala deposit of geothermal waters. *Geothermics*, 59, 56-66, Part: A.
- Farkhutdinov, A., Goblet, P., De Fouquet, C., Ismagilov, R., Farkhutdinov, I., Cherkasov, S., 2015. The Use of Computer Modelling to Forecast the Sustainability in the Development of Geothermal waters Resource: Khankala Deposit Example. *International Journal of Renewable Energy Research*, 5, 4, 1062-1068.
- Faust, C.R., Mercer, J.W., 1975. Mathematical modeling of geothermal systems. *Proc 2nd UN Symposium on the Development and Use of Geothermal Resources*, San Francisco, 3, 1633-1642.
- Faust, C.R., Mercer, J.W., 1979a. Geothermal Reservoir Simulation.1. Mathematical-Models For Liquid-Dominated and Vapor-Dominated Hydrothermal Systems, *Water Resources Research*, 15, 1, 23-30.
- Faust, C.R., Mercer, J.W., 1979b. Geothermal Reservoir Simulation. 2. Numerical Solution Techniques For Liquid-Dominated and Vapor-Dominated Hydrothermal Systems, *Water Resources Research*, 15, 1, 31-46.
- Fendek, M., 2000. Reservoir modeling study of Galanta area. *Proceedings World Geothermal Congress Kyushu-Tohoku, Japan*, , May 28-June 10 2000, 2555-2560.
- Fendekova, M., Fendek, M., 2000. Evaluation of Horna-Nitra geothermal reservoir (central part of Slovak Republic). *Proceedings World Geothermal Congress Kyushu-Tohoku, Japan*, , May 28- June 10 2000, 2561-2565.
- Feng, G., Tianfu.G., Jiang, Z.J., Bellani, S., 2017. Geothermal assessment of the Pisa plain, Italy: Coupled thermal and hydraulic modeling, *Renewable Energy*, 111, 416-427.
- Finsterle, S., Kowalsky, MB., Pruess, K., 2012. TOUGH model use, calibration and validation, *Transactions of the ASABE* 55 (4), 1275-1290.
- Finsterle, S., Sonnenthal, E.L., Spycher, N., 2014. Advances in subsurface modeling using the TOUGH suite of simulators, *Computers & Geosciences*, 65, 2-12, SI.
- Finsterle, S., 1993. *iTOUGH2 user's guide version 2.2*, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California.
- Franco, A., Vaccaro, M., 2014. Numerical simulation of geothermal reservoirs for the sustainable design of energy plants: A review, *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 30, 987- 1002.
- Fusi, L., Rosso, F., Ceseri, M., Borsi, I., Speranza, A., 2013. Weak formulation for a two-phase nonlinear flow in an undeformable porous medium, *Meccanica*, 48, 1, 57-70.
- Ganguly, S., Kumar, M.S.M., 2012. Geothermal reservoirs - A brief review, *Journal of the Geological Society of India*, 79, 6, 589-602.
- Garg, S.K., Pritchett, J.W., Brownell Jr., D.H., 1975. Transport of mass and energy in porous media, *Proc 2nd UN Symposium on the Development and Use of Geothermal Resources*, San Francisco, 3, 1651-1656.
- Geiger, S., Schmid, K.S., Zaretskiy, Y., 2012. Mathematical analysis and numerical simulation of multi-phase multi-component flow in heterogeneous porous media, *Current Opinion in Colloid & Interface Science*, 17, 3, 147-155.
- Gelet, R.M., Loret, B., Khalili, N., 2015. The significance of local thermal non-equilibrium in simulations of enhanced geothermal recovery, *Conference: Computer Methods and Recent*

- Advances in Geomechanics, Kyoto, Japan, Sep 22-25, 2014, Ed:Oka, F., Murakami, A., Uzuoka, R., Kimoto, S., 1713-1718.
- Gök, I.M., Sarak, H., Onur, M., Serpen, U., Satman, A., 2005. Numerical modeling of the Balçova Narlıdere geothermal field, Turkey, Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey.
- Guerrero-Martinez, F.J., Verma, S.P., 2013. Three dimensional temperature simulation from cooling of two magma chambers in the Las Tres Virgenes geothermal field, Baja, California Sur, Mexico, Energy, 52, 110-118.
- Gunnarsson, G., Arnaldsson, A., Oddsdottir, A.L., 2012. Model Simulations of the Hengill Area, Southwestern Iceland, Transport of Unsaturated Groundwater and Heat (TOUGH) Symposium, Berkeley, CA, Sep 14-16, 2009, Transport in Porous Media, 90, 1, 3-22.
- Gupta, M., Rao, G., Narain, H., 1974. Geothermal investigations in the Puga Valley hot spring region Ladakh, India, Geophysical Research Bulletin, 12, 119-136.
- Gupta, M.L., Sharma, S., Singh, S., Drolia, R., 1979, Geophysical exploration and assessment of power potential of Puga Geothermal field. Geoviews, 6, 1-4.
- Günay, E., Karahanoglu, N., 2015. Finite element simulation of the Edremit geothermal field, Proc of 40th workshop on geothermal reservoir engineering, Stanford University, p:1-10.
- Hadgu, T., Zimmerman, R.W., Bovardson, G.S., 1995. Coupled Reservoir-Wellbore Simulation of Geothermal Reservoir Behavior, Geothermics, 24, 2, 145-166.
- Hanano, M., 1998. A simple model of a two-layered high-temperature liquid-dominated geothermal as a part of a large-scale hydrothermal convection system, Transport in Porous Media, 33, 1-2, 3-27.
- Hanano, M., 1992. Simulation Study of the Matsukawa Geothermal Reservoir - Natural State and its Response to Exploitation, Journal of Energy Resources Technology-Transactions of the ASME, 114, 4, 309-314.
- Hathorn, D., Wu, Y.S., Chen, Z.Z., 2014. TOUGH2-PETSc: A Parallel Solver for TOUGH2, 2014. 15th International Conference on Parallel And Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT 2014), Hong Kong, PEOPLES R CHINA, Dec 09-11, 2014, 174-179.
- Hayashi, K., Willis-Richards, J., Hopkirk, R.J., Niibori, Y., 1999. Numerical models of HDR geothermal reservoirs - a review of current thinking and progress, Geothermics, 28, 4-5, 507-518.
- Hu, B., 1995. Reservoir simulation of the Yangbajian geothermal field in Tibet, China. Proceedings World Geothermal Congress'95, 18-31 May 1995 Florence, 1691-1695.
- Hu, L.T., Winterfeld, P.H., Fakcharoenphol, P., Wu, Y.S., 2013. A novel fully-coupled flow and geomechanics model in enhanced geothermal reservoirs, Journal of Petroleum Science and Engineering, 107, 1-11.
- Ingebritsen, S.E., Sorey, M.L., 1985. Quantitative analysis of the Lassen hydrothermal system, north-central California. Water Resources research, 21 (6), 853-868.
- Ingebritsen, S.E., Geiger, S., Hurwitz, S., Driesner, T., 2010. Numerical Simulation of Magmatic Hydrothermal Systems, Reviews of Geophysics, 48.
- Ishido, T., Tosha, T., 1998. Feasibility study of reservoir monitoring using repeat self potential measurements Transactions Geothermal Resources Council 22, 171-177.
- Itoi, R., Kumamoto, Y., Tanaka, T., Takayama, J., 2010. History matching simulation of the Ogiri geothermal field, Japan. In: Proc World geothermal congress 2010, Bali, Indonesia.
- Jha, S.K., Puppala, H., 2018. Conceptual modeling and characterization of Puga geothermal reservoir, Ladakh, India, Geothermics, 72, 326-337.
- Jiang, F.M., Luo, L., Chen, J.L., 2013. A novel three-dimensional transient model for subsurface heat exchange in enhanced geothermal systems, International Communications in Heat and Mass Transfer, 41, 57-62.

- Jiang, F.M., Chen, J.L., Huang, W.B., Luo, L., 2014. A three-dimensional transient model for EGS subsurface thermo-hydraulic process, *Energy*, 72, 300-310.
- Jing, Y.N., Jing, Z.Z., Willis-Richards, J., Hashida, T., 2014. A simple 3-D thermoplastic model for assessment of the long-term performance of the Hijiori deep geothermal reservoir, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 269, 14-22.
- Karahanoğlu, N., Doyuran, V., Akkaş, N., 1984. Finite Element Simulation of Hot-Water type Geothermal Reservoirs, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 23, 3-4, 357-382.
- Karahanoğlu, N., 1983. Finite Element Simulation of Hot-Water type Geothermal Reservoirs, PhD Thesis, Middle East Technical University, Ankara Turkey.
- Karrech, A., Beltaief, O., Vincec, R., Poulet, T., Regenauer-Lieb, K., 2015. Coupling of thermal-hydraulic-mechanical processes for geothermal reservoir modelling, *Journal of Earth Science*, 26, 1, 47-52.
- Kiryukhin, A.V., 1996. Modeling studies: The Dachny geothermal reservoir, Kamchatka, Russia, *Geothermics*, 25, 1, 63-90.
- Kiryukhin, A.V., Asaulova, N.P., Finsterle, S., 2008. Inverse modeling and forecasting for the exploitation of the Pauzhetsky geothermal field, Kamchatka, Russia. *Geothermics*, 37, 540-562.
- Kiryukhin, A.V., Asaulova, N.P., Finsterle, S., Rychkova, T.V., Obora, N.V., 2006. Modeling the Pauzhetsky geothermal field, Kamchatka, Russia, using iTOUGH2. In: Proc TOUGH Symposium, Lawrence Berkeley National Laboratory, California (USA).
- Kiryukhin, A.V., Asaulova, N.P., Manukhin, Y.F., Rychkova, T.V., Sugrobov, V.M., 2010. Using numerical modeling for assessing the recoverable reserves of a geothermal steam field: The Pauzhetsky geothermal field, *Journal of Volcanology and Seismology*, 4, 52-71.
- Kissling, W.M., Brown, K.L., O'Sullivan, M.J., White, S.P., Bullivant, D.P., 1996. Modeling chloride and CO₂ chemistry in the Wairakei geothermal reservoir. *Geothermics*, 25, 285-305.
- Kolditz, O., Clauser, C., 1998. Numerical simulation of flow and heat transfer in fractured crystalline rocks: Application to the hot dry rock site in Rosemanowes (UK). *Geothermics*, 27, 1-23.
- Kolditz, O., Blöcher, M. G., Clauser, C., Diersch, H.-J. G., Kohl, T., Kühn, M., McDermott, C. I., Wang, W., Watanabe, N., Zimmermann, G. and Bruel, D., 2010. Geothermal Reservoir Simulation, in *Geothermal Energy Systems: Exploration, Development, and Utilization* (ed E. Huenges), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany.
- Köhn, M., Stöfen, H., 2005. A reactive flow model of the geothermal reservoir Waiwera, New Zealand, *Hydrogeology Journal*, 13, 4, 606-626.
- Kumamoto, Y., Itoi, R., Tanak, T., Hazama, Y., 2009. Modeling and numerical analysis of the two-phase geothermal reservoir at Ogiri, Kyushi, Japan. In: Proc of the 34th Workshop on Geothermal reservoir engineering, Stanford, California (USA).
- Kuzevic, S., Kuzevicova, Z., Hojdova, M., Pusztai, A., 2011. A Computer-Based Simulation of Geothermal Energy Utilization in Conditions of Slovak Republic, 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2011), VOL III, Albena, Bulgaria, Jun 20-25, 2011.
- Lasseter, T.J., 1976. Numerical-Simulation of Heat and Mass-Transfer in Multi-dimensional 2-Phase Geothermal Reservoirs, *Mechanical Engineering*, 98, 5, 104-104.
- Lei, H.Y., Zhu, J.L., 2013. Numerical modeling of exploitation and reinjection of the Guantao geothermal reservoir in Tanggu District, Tianjin, China, *Geothermics*, 48, 60-68.
- Lewis, R.W., Karahanoğlu, N., 1981. Simulation of Subsidence in Geothermal Reservoirs, *Numerical Methods in Thermal Problems*, 2, 326-335.
- Lewis, R.W., Roberts, P.J., Schrefler, B.A., 1989. Finite element modeling of two phase heat and fluid flow through deforming porous media, *Transport in Porous Media*, 4, 319-334.

- Lipmann, M.J., Narasimhan, T.N., Witherspoon, P.A., 1976. Numerical simulation of reservoir compaction in liquid dominated geothermal systems. Proc. 2nd Int Symposium on Land Subsidence, Anaheim, Ca., 157-166.
- Llanos, E.M., Zarrouk, S.J., Hogarth, R.A., 2015. Numerical model of the Habanero geothermal reservoir, Australia, *Geothermics*, 53, 308-319.
- Magliocco, M.J., Glaser, S.D., Kneafsey, T.J., 2015. Laboratory and Numerical Studies of Heat Extraction from Hot Porous Media by Means of Supercritical CO₂, TOUGH Symposium, Berkeley, CA, Sep 17-19, 2012, *Transport in Porous Media*, 108, 1, 85-104.
- Magnusdottir, L., Finsterle, S., 2015. An iTOUGH2 equation-of-state module for modeling supercritical conditions in geothermal reservoirs, *Geothermics*, 57, 8-17.
- Magri, F., Akar, T., Gemici, U., Pekdeger, A., 2010. Deep geothermal groundwater flow in the Seferihisar-Balcova area, Turkey: results from transient numerical simulations of coupled fluid flow and heat transport processes, *Geofluids*, 10, 3, 388-405.
- Mannington, W., O'Sullivan, M., Bullivant, D., 2000. An air/water model of the Wairakei-Tauhara geothermal system. In: Proc of world geothermal congress, Kyushu, Japan.
- Mannington, W., O'Sullivan, M., Bullivant, D., 2004. Computer modeling of the Wairakei-Tauhara geothermal system, New Zealand. *Geothermics*, 33, 4, 401-419.
- McGuinness, M.J., White, S.P., Young, R.M., Izhisaki, H., Ikeuchi, K., Yoshida, Y., 1995. A model of the Kakkonda geothermal reservoir. *Geothermics*, 24, 1-48.
- Menzies, A.J., Granados, E.E., Sanyal, S.K., Merida-I, L., Caicedo-A., A., 1991. Numerical modeling of the initial state and matching well test data from the Zunil geothermal field Guatemala. Proceedings of the 16 th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 23-25 January 1991, 193-201.
- Menzies, A.J., Pham, M., 1995. A field-wide numerical simulation model of The Geysers geothermal field, California, Proceedings World Geothermal Congress'95, Florence, 18-31 May 1995, 1697-1702.
- Mercer, J.W., Faust, C.R., 1979. Geothermal Reservoir Simulation.3. Application of Liquid-Dominated and Vapor-Dominated Hydrothermal Modeling Techniques to Wairakei, New-Zealand, *Water Resources Research*, 15, 3, 653-671.
- Mercer, J.W., Faust, C.R., and Pinder, G.F., 1974. Geothermal reservoir simulation. Conference on research for the Development of Geothermal Energy Resources, Pasadena, California, 256-267.
- Morgan, K., Lewis, R.W., White, I.R., 1980. The mechanisms of ground surface subsidence above compacting multi phase reservoirs and their analysis by the finite element method, *Applied Mathematical Modelling*, 4, 217-234.
- Moridis, G.J., 2003. Numerical studies of gas production from methane hydrates. *Society of Petroleum Engineers Journal* 32(8), 359-370.
- Moridis, G.J., Freeman, C.M., 2015. The RealGas and RealGasH2O options of the TOUGH plus code for the simulation of coupled fluid and heat flow in tight/shale gas systems. *Computers & Geosciences*, 65, 56-71, SI.
- Moridis, G.J., Kowalsky, M.B., Pruess, K., 2008. TOUGH+HYDRATE v1.0 User's Manual: A code for the Simulation of System Behaviour in Hydrate-Bearing Geologic Media. Report LBNL-149E, Lawrence Berkeley national Laboratory, CA, 279 pp.
- Morris, C.W., Campbell, D.A., 1981. Geothermal Reservoir Energy recovery – A 3-Dimensional Simulation Study of the East Mesa Field. *Journal of Petroleum Technology*, 33, 4, 735-742.
- Mottaghy, D., Pechinig, R., Vogt, C., 2011. The geothermal project Den Haag: 3D numerical models for temperature prediction and reservoir simulation. *Geothermics*, 40, 3, 199-210.
- Mroczec, E.K., Milicich, S.D., Bixley, P.F., Supelveda, F., Bertrand, E.A., Soengkono, S., Rae, A.J.,

2016. Ohaaki geothermal system: Refinement of a conceptual reservoir model. *Geothermics*, 59, 311-324.
- Nakanishi, S., Abe, M., Todaka, N., Yamada, M., Sierra, J.L., Gingsins, M.O., Mass, L.C., Pedro, G.E., 1995. Copahue geothermal system, Argentina- study of a vapor dominated reservoir. *Proceedings World Geothermal Congress '95*, Florence, 18-31 May 1995, 1167-1172.
- Nakanishi S., Iwai, N., 2000. Reservoir simulation study of the Onikobe geothermal field, Japan. *Proceedings World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku Japan, May 28—June 10, 2000*, 2159-2164.
- Nguyen, V.V., Pinder, G.F., 1983. Geothermal Reservoir Simulation using, Non-Equilibrium Thermodynamics. *Society of Petroleum Engineers Journal*, 23, 4, 613-622.
- Noorollahi, Y., Itoi, R., 2011. Production capacity estimation by reservoir numerical simulation of northwest (NW) Sabalan geothermal field, Iran, *Energy*, 36, 7, 4552-4569.
- Ostermeyer, G.P., Srisupattaranit, T., 2013. Multi-Scale Simulation of Heat and Flow in Geothermal Reservoirs, *Oil Gas-European Magazine*, 39, 1, 40-42.
- O'Sullivan, M.J., 1985. Geothermal Reservoir Simulation. *International Journal of Energy Research*, 9, 3, 319-332.
- O'Sullivan, M., Barnett, B., Razali, M., 1990. Numerical simulation of the Kamojang geothermal field, Indonesia, *Trans Geotherm Resources Counc* 1317-1324.
- O'Sullivan, M.J., Bullivant, D.P., Follows, S.E., Mannington, W.I., 1998. Modeling of the Wairakei-Tauhara geothermal system. *Proceedings of the TOUGH Workshop'98*, Berkeley, California, 4-6 May 1998, 1-6.
- O'Sullivan, M.J., Pruess, K., Lippmann, M.J., 2001. State of the art of geothermal reservoir simulation. *Geothermics*, 30, 4, 395-429.
- O'Sullivan, M.J., Yeh, A., Mannington, W.I., 2009. A history of numerical modeling of the Wairakei geothermal field. *Geothermics*, 38, 1, 155-168.
- Özkaya M., 2007. Numerical modeling of the Kızıldere Geothermal field. MSc Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
- Pan, L.H., Freifeld, B., Doughty, C., Zakem, S., Sheu, M., Cutright, B., Terrall, T., 2015. Fully coupled wellbore-reservoir modeling of geothermal heat extraction using CO₂ as the working fluid, *Geothermics*, 53, 100-113.
- Parini, M., Cappetti, G., Laudiano, M., Bertani, R., Monterrossa, M., 1995. Reservoir modeling study of the Ahuachapan geothermal field (El Salvador) in the frame of a generation stabilization project. *Proceedings World Geothermal Congress '95*, Florence, 18-31 May 1995, 1543-1548.
- Parini, M., Acuna, J.A., Laudiano, M., 1996. Reinjecting water return at Miravalles geothermal reservoir, Costa Rica: numerical modeling and observations. *Proceedings of the 21st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering*, Stanford University, Stanford, California, 22-24 January 1996, pp 127-134.
- Pearson, S.C.P., Alcaraz, S.A., Barber, J., 2014. Numerical simulations to assess thermal potential at Tauranga low-temperature geothermal system, New Zealand. *Hydrogeology Journal*, 22, 1, 163-174.
- Pham, M., Sanyal, S.K., Menzies, A.J., Naka, T., Takeuchi, R., Iata, S., 1995. Numerical modeling of the high temperature two-phase reservoir at Uenotai geothermal field, Akita prefecture, Japan. *Proceedings World Geothermal Congress'95*, Florence, 18-31 May 1995, 1703-1707.
- Pham, M., Menzies, A.j., Sanyal, S.K., Lima, E., Shimada, K., Juarez, J., Cuevas, A., 1996. Numerical modeling of the high temperature geothermal system of Amatitlan, Guatemala. *Transactions Geothermal Resources Council* 20, 833-838.
- Pogacnik, J., Dempsey, D., Kelkar, S., Podgorney, R., O'Sullivan, M., O'Sullivan, J., 2014. The Effect of Sequential Solution Procedures in the Numerical Modeling of Stimulation in Engineered Geothermal Systems, 11th World Congress on Computational Mechanics; 5th European Conference on Computational Mechanics; 6th

- European Conference on Computational Fluid Dynamics, Barcelona, Spain, Jul 20-25, Vols II – IV, Ed:Onate, E; Oliver, X; Huerta, A., 1307-1318.
- Porras, E.A., Tanaka, T., Fujii, H., Itoi, R., 2007. Numerical modeling of the Momotombo geothermal system, Nicaragua. *Geothermics*, 36, 4, 304-329.
- Porras, E.A., Tanaka, T., Fujii, H., Itoi, R., 2005. Numerical modeling of the Momotombo geothermal system, Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey.
- Portugal, E., Birkle, P., Tello, E., Tello, M., 2000. Hydrochemical-isotopic and hydrogeological conceptual model of the Las Tres Virgenes geothermal field, Baja, California Sur, Mexico. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 101, 223-244.
- Pratama, H.B., Saptadji, N.M., 2016. Numerical Simulation for Natural State of Two-Phase Liquid Dominated Geothermal Reservoir with Steam Cap Underlying Brine Reservoir, 5th ITB International Geothermal Workshop (IGW2016), Bandung, Indonesia, Mar 27-Apr 02, 2016, Book Series: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, Ed:Saepuloh, A; Suryantini; Wibowo, H; Deon, F; Sianipar, J.Y., 42, Article Number: 012006.
- Pritchett, J.W., Garg, S.K., 1995. A modelling study of the Oguni geothermal field, Kyushu, Japan, Proceedings World Geothermal Congress'95, Florence, 18-31 May 1995, pp 1703-1707.
- Pritchett, J.W., Garg, S.K., Arika, K., Kawano, Y., 1991. Numerical simulation of the Sumikawa geothermal field in the natural state. In: Proc of the 16 th workshop on geothermal reservoir engineering, Stanford, California (USA).
- Pruess, K., Batistelli, A., 2002. TMVOC A numerical simulator for Three-Phase Non-Isothermal flows of Multicomponent Hydrocarbon mixtures in saturated, unsaturated heterogeneous media. Report LBLN-49375E, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley CA, 192 pp.
- Pruess, K., 2006. Enhanced geothermal systems (EGS) using CO₂ as working fluid- a novel approach for generating renewable energy with simultaneous sequestration of carbon. *Geothermics*, 35(4), 351-367.
- Pruess, K., 1983. Development of the general purpose simulator MULKOM, Annual Report 1982, Earth Sciences Division Report LBL-15500, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, CA, 103 pp.
- Pruess, K., 1991. TOUGH2 A General Purpose Numerical Simulator for Multiphase Fluid and Heat Flow. Report LBL-29400. Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, CA, 103 pp.
- Pruess, K., Oldenburg, C., Moridis, G., 1999. TOUGH2 user's guide version 2.1. Report LBLN-43134, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley CA, 204 pp.
- Pruess, K., Zerzan, J.M., Schroeder, R.C., Witherspoon, P.A., 1979. Description of the three dimensional two phase simulator SHAFT78 for use in geothermal reservoir studies, paper SPE7699 presented at the SPE Fifth symposium on reservoir simulation, Denver, Jan 31-Feb 2 1979.
- Pruess, K., Bodvarsson, G.S., Schroeder, R.C., Witherspoon, P.A., 1982. Model Studies of the Depletion of Two-Phase Geothermal Reservoirs. *Society of Petroleum Engineers Journal*, 280-290.
- Pruess, K., 1990. Modeling of geothermal reservoirs: Fundamental processes, computer simulation and field applications. *Geothermics*, 19, 1, 3.
- Pruess, K., 1987. TOUGH Users Guide. Report LBL-20700. Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, CA, 78 pp.
- Pruess, K., 2011. ECO2M: A TOUGH2 fluid property module for Mixtures of Water, NaCl, and CO₂. Including Super- and Sub critical Conditions, and Phase change between liquid and gaseous CO₂. Report LBLN-4590E, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley CA, 83pp.
- Pruess, K., 2003. The TOUGH codes - A family of simulation tools for multiphase flow and

- transport processes in permeable media, TOUGH Symposium 2003, Lawrence Berkeley National Lab, Berkeley, Ca, May, 2003, *Vadose Zone Journal*, 3, 3, 738-746.
- Quiano, J.J.D., Zarrouk, S.J., 2018. Geothermal resource assessment using experimental design and response surface methods: The Ngatamariki geothermal field, New Zealand, *Renewable Energy*, 116, 325-334.
- Randi, A., Sterpenich, J., Thiery, D., Kervevan, C., Pironon, J., Morlot, C., 2017. Experimental And Numerical Simulation of the Injection of A CO₂ Saturated Solution in a Carbonate Reservoir: Application to the CO₂-Dissolved Concept Combining CO₂ Geological Storage and Geothermal Heat Recovery, 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Ghgt-13, Lausanne, Switzerland, Nov 14-18, 2016, Book Series: Energy Procedia, 114, Ed: Dixon, T; Laloui, L; Twinning, S. 2942-2956.
- Ratouis, T.M.P., O'Sullivan, M.J., O'Sullivan, J.P., 2016. A Numerical model of Rotorua Geothermal Field. *Geothermics*, 60, 105-125.
- Ripperda, N., Bodvarsson, G.S., Lipmann, M.J., Cuellar, G., Escobar, C., 1991. An exploitation model and performance predictions of the Ahuachapan geothermal field, El Salvador. *Geothermics*, 20, 4, 181-196.
- Romagnoli, P., Arias, A., Barelli, A., Cei, M., Casini, M., 2010. An updated numerical modeling of the Larderello-Travale geothermal system, Italy. *Geothermics*, 39, 292-313.
- Rutqvist, J., Wu, Y.-S., Tsang, J.-F., Bodvarsson, G., 2002. A modeling approach for analysis of coupled multiphase flow, heat transfer and deformation in fractured porous rock. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 39, 429-442.
- Sakagawa, Y., Aoyama, K., Ikuechi, K., Takahashi, M., Kato, O., Doi, N., Tosha, T., Ominato, T., Koide, K., 2000. Natural state simulation of the Kakkonda geothermal field, Japan., *Proceedings of World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku, Japan, May 28-June 10, 2000*, 2839-2844.
- Sakagawa, Y., Takahashi, M., Hanano, M., Ishido, T., Demboya, N., 1994. Numerical simulation of the Mori geothermal field, Japan. *Proceedings of the 19th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 18-20 January 1994*.
- Sanchez, U.P., 1997. Los Humeros geothermal field, Mexico, *Trans geothermal Resources Council*. 21, 435-439.
- Sanyal, S.K., Antunez, E.U., Abe, M., Nakanishi, S., 1990. Numerical modeling of a mature high temperature geothermal reservoir; a case history from the Onikobe field, Miyagi prefecture, Japan. *Transactions Geothermal Resources Council* 14, 1339-1345.
- Sanyal, S.K., Pham, M., Iwata, S., Suzuki, M., Inoue, T., Yamada, K., Futagoishi, M., 2000. Numerical simulation of the Wasabizawa geothermal field, Akita Prefecture, Japan, *Proceedings of World Geothermal Congress, Kyushu-Tohoku, Japan, May 28-June 10 2000* 2189-2194.
- Seol, Y., Lee, K.K., 2007. Application of TOUGHREACT to performance evaluations of geothermal heat pump systems. *Geosciences Journal*, 11, 1, 83-91.
- Sippel, J., Fuchs, S., Cacace, M., Braatz, A., Kastner, O., Huenges, E., Scheck-Wenderoth, M., 2013. Deep 3D thermal modelling for the city of Berlin (Germany). *Environmental Earth Sciences*, 70, 8, 3545-3566.
- Soboleva, E., 2017. Numerical Simulation of Haline Convection in Geothermal Reservoirs, *International Conference Problems of Thermal Physics and Power Engineering (Ptpe-2017)*, *Journal of Physics Conference Series*, 891, Natl Res Univ, Moscow Power Engn Inst, Moscow, RUSSIA, OCT 09-11, 2017, UNSP 012105.
- Sonney, R., Vuataz, F.D., 2009. Numerical modelling of Alpine deep flow systems: a management and prediction tool for an exploited geothermal reservoir (Lavey-les-Bains, Switzerland). *Hydrogeology Journal*, 17, 3, 601-616.
- Sta. Ana, F.X.M., Saw, V.S., Molina, P.O., Aleman, E.T., Canete, G.F., Hingoyon, C.S., Sarmiento, Z.F., 1999. Increased production load at

- Tngonan geothermal field, Philippines: Reservoir response and field management strategies. Proc of the 24 th workshop on geothermal reservoir engineering, Stanford, California (USA), 25-27 January 1999, 11-16.
- Strobel, C.J., 1993. Buffalo field, Philippines: Reservoir modeling for prediction of limits to sustainable generation. Proc of the 18 th workshop on geothermal reservoir engineering, Stanford, California (USA), 26-28 January 1993, 5-10.
- Suarez, Arriaga, M.C., Samaniego, V. F., Rodrigez, F., 1996. Some mismathces occurred when simulating fractured reservoir as homogeneous porous media. Proceedings of the 21st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Satnford University, Stanford, California, 26-28 January 1996, 179-186.
- Suryadarma, D., T., Zuhro, A.A., Yani, A., 2010. Sustainable development of the Kamojang geothermal field. *Geothermics*, 39, 391-409.
- Swenson, D., Schroeder, R., Shinohara, N., Okabe, T., 1999. Analyses of the Hijiori long term circulation test. Proceedings of the 24th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 25-27 January 1999, 344-351.
- Todesco, M., 1995. Modeling of the geothermal acticity at Vulcano (Aeolian Islands, Italy). Proceedings World Geothermal Congress '95, Florence, 18-31 May 1995, 1309-1315.
- Tokita, H., Yahara, T., Kitakoga, I., 1995. Cooling effect and fluid behavior due to reinjected hot water in the Hatchobaru geothermal field, Japan. Proceedings World Geothermal Congress '95, Florence, 18-31 May 1995, 1869-1874.
- Thomas, L.K., Pierson, R.G., 1978. 3-Dimensional Geothermal Reservoir Simulation. *Society of Petroleum Engineers Journal*, 18, 2, 151-161.
- Toronyi, R.M., Farouq Ali, S.M., 1977. Two-phase, two-dimensional simulation of a geothermal reservoir. *Soc. Pet. Eng. J.*, 17, 171-183.
- Turali, E.Y., Simsek, S., 2017. Conceptual and 3D simulation modeling of the Sorgun hydrothermal reservoir (Yozgat,Turkey). *Geothermics*, 66, 85-100.
- Vedova, D.B., Vecellio, C., Bellani, S., Tinivella, U, 2008. Thermal modeling of the Larderello geothermal field (Tuscany Italy). *International Journal Earth Science (Geol Rundsch)*; 97, 317-332.
- Weijermars, R., Zuo, L., Warren, I., 2017. Modeling reservoir circulation and economic performance of the Neal Hot Springs geothermal power plant (Oregon, USA): An integrated case study, *Geothermics*, 70, 155-172.
- White, S.P., Kissling, W.M., McGuinness, M.J., 1997. Models of the Kawerau geothermal reservoir. *Transactions Geothermal Resources Council*, 21, 33-40.
- Wijaya, I, Purqon, A., 2017. Simulation of Fluid Flow and Heat Transfer in Porous Medium Using Lattice Boltzmann Method, *International Conference on Energy Sciences (Ices 2016)*, Bandung, Indonesia, Jul 25-27, 2016, Book Series: *Journal of Physics Conference Series*, Ed., Waris, A; Shin, B; Kondo, M; Buys, YF; Irwanto, D; Pramuditya, S., 877, Article Number: UNSP 012056.
- Williamson, K. H., 1990. Reservoir simulation of The Geysers geothermal field. Proceedings of the 15 th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 23-25 January 1990, 113-123.
- Xing, H.L., Liu, Y., Gao, J.F., Chen, S.J., 2015. Recent development in numerical simulation of enhanced geothermal reservoirs. *Journal of Earth Science*, 26, 1, 28-36.
- Xu, T.F., Feng, G.H., Hou, Z.Y., Tian, H.L., Shi, Y., Lei, H.W., 2015. Wellbore-reservoir coupled simulation to study thermal and fluid processes in a CO₂-based geothermal system: identifying favorable and unfavorable conditions in comparison with water. *Environmental Earth Sciences*, 73, 11, 6797-6813.

- Xu, T., Pruess, K., 2001. Modeling multiphase non-isothermal fluid flow and reactive geochemical transport in variably saturate fractured rocks: 1. Methodology. *American J. Sci.* 301(1), 16-33.
- Yahara, T., Tokita, H., 2010. Sustainability of the Hatchobaru geothermal field, Japan. *Geothermics*, 39, 382-390.
- Yano, Y., Ishido, T., 1995. Numerical modeling of the evolution of two phase zones under a fractured cap rock. *Geothermics*, 24, 4, 507-521.
- Yasukawa, K., Ishido, T., 1990. Numerical modeling of the Onikobe caldera hydrothermal system, northeastern Honshu, Japan. *Transactions Geothermal Resources Council* 14, 1347-1355.
- Yeh, H.D., Yang, S.Y., Li, K.Y., 2012. Heat extraction from aquifer geothermal systems, *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, 36, 1, 85-99.
- Yoğurtcuoğlu, A., 2016. Integrated 3-D finite element simulation of the Edremit Geothermal Field. Yüksek Lisans tezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
- Zaher, M.A., Saibi, H., El Noubi, M., Ghamry, E., Ehara, S., 2011. A preliminary regional assessment of the Gulf of Suez, Egypt. *Journal of African Earth Sciences*, 60, 117-132.
- Zaher, M.A., Saibi, H., Nishijima, J., Fujimitsu, Y., Mesbah, H., Ehara, S., 2012. Exploration and assessment of the geothermal resources in the Hammam Faraun hot spring, Sinai Peninsula, Egypt. *Journal of Asian Earth Sciences*, 45, 256-267.
- Zang, Y.J., Li, Z.W., Yu, Z.W., Guo, L.L., Lin, X.P., Xu, T.F., 2015. Evaluation of developing an enhanced geothermal heating system in northeast China: Field hydraulic stimulation and heat production forecast. *Energy and Buildings*, 88, 1-14.
- Zarrouk, S., O'Sullivan, M., Croucher, A., Mannington, W., 2007. Numerical modeling of production from the Poihipi dry steam zone; Wairakei geothermal system, New Zealand. *Geothermics*, 36, 289-303.
- Zeng, Y., Tang, L., Wu, N.Y., Cao, Y.F., 2017. Analysis of influencing factors of production performance of enhanced geothermal system: A case study of Yangbajing geothermal field. *Energy*, 127, 218-235.
- Zeng, Y.C., Su, Z., Wu, N.Y., 2013. Numerical simulation of heat production potential from hot dry rock by water circulating through two horizontal wells at Desert Peak geothermal field. *Energy*, 56, 92-107.
- Zhang, K., Wu, Y-S., Pruess, K., 2008. User's Guide for TOUGH2-MP- A massively parallel version of the TOUGH2 code. Report LBNL-315E, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley CA, 108 pp.
- Zhang, K., Lee, B.H., Ling, L.L., Guo, T.R., Liu, C.H., Ouyang, S., 2016. Modeling studies for production potential of Chingshui geothermal reservoir. *Renewable Energy*, 94, 568-578.
- Zhao, Y.S., Feng, Z.J., Feng, Z.C., Yang, D., Liang, W.G., 2015. THM (Thermo-hydro-mechanical) coupled mathematical model of fractured media and numerical simulation of a 3D enhanced geothermal system at 573 K and buried depth 6000-7000 M. *Energy*, 82, 193-205.
- Zyvoloski, G. 1983. Finite element methods for geothermal reservoir simulation. *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*, 7: 75-86.