
Araştırma Makalesi / Research Article

Muğla İli Memeli Faunasına Katkılar

Yasin İLEMİN*

*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü, Muğla
(ORCID: 0000-0002-8240-4484)*

Öz

Bu araştırma ile çalışma bölgesindeki memeli faunasının ve bu türler üzerindeki tehditlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Arazi çalışmaları 2018 ve 2019 yıllarında yıl boyunca gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda 37 farklı karasal ve iç su memeli türü tespit edilmiştir. Alaca sansar (*Vormela peregusna*) türü Muğla için ilk kayıttır. Muğla İli için karayollarında araç çarpması sonucu ölen türlerin kayıtları tutulmuş, Porsuk (*Meles meles*), Kaya sansarı (*Martes foina*) ve Karakulak (*Caracal caracal*) populasyonlarının ciddi tehdit altında olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre Muğla İlinde özellikle Köyceğiz, Döğüşbelen Mevkii, bir ekosistem köprüsü için uygun bir nokta olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Memeli faunası, Muğla, *Vormela peregusna*.

Contributions to the Mammalian Fauna of Muğla Province

Abstract

This study aimed to identify the mammalian fauna in the study area and the threats on these species. Field studies were carried out throughout the year in 2018 and 2019. As a result of the studies, 37 different terrestrial and inland water mammal species have been identified. Marbled polecat (*Vormela peregusna*) is the first record for Muğla. The records of the species that died as a result of vehicle accidents on the highways for Muğla Province were kept and it was observed that Eurasian badger (*Meles meles*), Beech marten (*Martes foina*), Caracal (*Caracal caracal*) populations were under serious threat. According to these results, especially Köyceğiz, Döğüşbelen Mevkii in Muğla Province stands out as a suitable point for an ecosystem bridge.

Keywords: Mammal fauna, Muğla, *Vormela peregusna*.

1. Giriş

Ülkemizin Güneybatısında bulunan ve birçok el değmemiş habitat barındıran Muğla ili karasal ve iç su ekosistemlerindeki memeli türleri üzerinde yapılan araştırmalar çok kısıtlı olup, birkaç araştırmacının yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. Bu çalışmada Muğla İli karasal ve iç su Memeli faunası ile ilgili güncel bir literatür araştırması yapılmış ardından arazi çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular paylaşılmıştır. Böylece Muğla İli'nde yaşayan türlerin belirlenmesi ve bunlar üzerindeki tehditlerin güncel durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Metot

Sistematik arazi çalışmaları ve literatür taramaları Muğla İlindeki bütün karasal ve içsu ekosistemlerinin tamamını kapsayacak şekilde 2018 ve 2019 yılları boyunca gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).

Büyük memelilerin gözlenmesi ve kaydedilmesinde dürbün, fotokapan, fotoğraf makinesi gibi çalışılan türlere uygun malzemeler kullanılmıştır. Araç çarpması sonucu ölmüş memeli türleri kayıt edilmiştir. Gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatları Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla kayıt edilmiştir. Arazi gözlemleri sırasında, memelilere ait ayak izi, dışkı, ses

*Sorumlu yazar: yasinilemin@mu.edu.tr

Geliş Tarihi: 12.02.2020, Kabul Tarihi: 18.03.2020



Şekil 2. Tespit edilen dişi yaban keçisi (*Capra aegagrus*)



Şekil 3. Nalburunlu yarasa (*Rhinolophus ferrumequinum*)



Şekil 4. Kurt (*Canis lupus*)



Şekil 5. Muğla için ilk kayıt olan Alaca sansar (*Vormela peregusna*)

Ayak İzi ve diğer izler (beslenme belirtisi)

Köyceğiz İlçesi Hamitköy Mahallesiinde yapılan arazi çalışmalarında porsuk (*Meles meles*) türüne ait ayak izleri tespit edilmiştir (Şekil 6). *Apodemus* (Orman fareleri) cinsine ait beslenme belirtileri görülmüştür (Şekil 7). Yaban domuzlarının (*Sus scrofa*) toprağı burunları ile kazarak toprak altında buldukları besinleri (kök, yumru, mantar vs.) tükettiklerine dair emareler görülmüştür (Şekil 8).



Şekil 6. Tespit edilen porsuk (*Meles meles*) türüne ait arka (soldaki) ve ön (sağdaki) ayak izleri



Şekil 7. *Apodemus* cinsine ait beslenme kalıntıları



Şekil 8. Yaban domuzlarına ait beslenme izleri

Dışkı İle Tespit

Köyceğiz İlçesi Zeytinalanı Mahallesiinde yapılan arazi çalışmaları esnasında Köyceğiz gölü kıyısında su samuru (*Lutra lutra*) türüne ait dışkı tespit edilmiştir (Şekil 9). Arazi çalışmaları sırasında tespit edilen farklı türlerin dışkılarına ait fotoğraflar Şekil 10’da verilmektedir.



Şekil 9. Su samuru (*Lutra lutra*) dışkısı



Şekil 10. Arazi çalışmaları sırasında tespit edilen memeli dışkılarından bazıları (1. Porsuk, 2. Kaya sansarı, 3.Kurt, 4. Cüce yarasa)

Ölü bireyler

Kaya sansarı (*Martes foina*) Bafa gölünü kıyısında uzanan kara yolunda Aydın İl sınırına geçmeden hemen önce tespit edilmiştir (Şekil 11). Tespit edilen bireyin yetişkin ve erkek olduğu yapılan incelemelerde anlaşılmıştır. Seydikemer İlçesi Bayır Mahallesiinde bir karakulağın (*Caracal caracal*) yol kenarında araç çarpması sonucu öldüğü tespit edilmiştir (Şekil 12).



Şekil 11. Araç çarpması sonucu ölmüş Kaya sansarı (*Martes foina*)



Şekil 12. 15 Haziran 2018 tarihinde Seydikemer Bayır Mahallesiinde incelenen karakulak (*Caracal caracal*)

Foto-kapan

Bu çalışma kapsamında foto-kapan yöntemi kullanılarak özellikle büyük memeli türler hakkında bulgular elde edilmiştir. Elde edilen foto-kapan kayıtlarına göre tespit edilen türlerden bazıları aşağıda paylaşılmaktadır (Şekil 13).



Şekil 13: Elde edilen bazı foto-kapan kayıtları. 1. Yaban keçisi, 2. Karakulak, 3. Bozayı, 4. Kurt

Epidermal yapılar ve döküntüler

Oklu kirpiye (*Hystrix indica*) ait ok kalıntıları bulunmuştur (Şekil 14).



Şekil 14. Oklu kirpi (*Hystrix indica*) türüne ait döküntüler

Yuva ile tespit


Şekil 15'de yaban domuzuna (*Sus scrofa*) ait bir yatak (dinlenme noktası) verilmektedir.



Şekil 15. Yaban domuzuna (*Sus scrofa*) ait bir dinlenme noktası

Ultrasonik yarasa dedektörü

“D500x Bat Detector Pettersson Elektronik” marka dedektör farklı noktalarda çalıştırılarak elde edilen ses kayıtları üzerinden yarasa tür teşhisleri yapılmıştır. Şekil 16’da *Pipistrellus pipistrellus* (Cüce yarasa) türüne ait sonogram örneği verilmiştir.



Şekil 16. *Pipistrellus pipistrellus* türüne ait ses sonogramı (Kaynak kişi: Tarkan Yorulmaz)

Küçük memeli yakalama tuzağı

Yakalama tuzakları ile farklı noktalarda memeli örneklemeleri yapılmıştır. Milas Korucuk mahallesinde tespit edilmiş bir Kır sivri faresi Şekil 17’de görülmektedir.



Şekil 17. Yakalama tuzağı ile yakalanıp teşhis edilen Kır sivri faresi (*Crociodura leucodon*)
(Foto: Tarkan Yorulmaz)

Yapılan arazi ve literatür çalışmaları sonucunda Muğla İline ait güncel memeli tür listesi Tablo 1’de verilmektedir.

Memelilere İlişkin Tehditler

Özellikle Muğla’da yaz aylarında trafik yoğunluğunun artmasına bağlı olarak şehirlerarası yollarda (100 km hat boyunca) yılda 5-6 porsuk bireyinin telef olduğu tutulan kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu da Muğla popülasyonunun neredeyse %16’sının sadece yollarda telef olduğu anlamına gelmektedir. Kara yollarında kaya sansarı ve karakulak ölümlerinin de fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlara kaçak avcılık, zehirlenme ve habitat tahribi de eklendiğinde tehlikeli bir durum ortaya çıkmaktadır (Tablo 2).

4. Sonuç ve Öneriler

Bu proje kapsamında yapılan literatür ve arazi çalışmaları ile Muğla İlinde yaşayan 37 memeli türü tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden 5 tanesi IUCN’e göre NT, 2 tanesi VU, 1 tanesi DD, 29 tanesi ise LC kategorisindedir. Bu türlerden 1 tanesi Muğla için ilk kayıttır. Alaca sansar (*Vormela peregusna*) ile ilgili güncel tüm kayıtların verildiği Yürümez ve Ulutürk’ün 2019 yılında yaptığı çalışmaya göre tür ile ilgili Ülkemizde 24 farklı lokaliteden kayıt bulunmaktadır. Bu lokaliteler; İstanbul, Çatalca, Istranca Dağları, Meriç Nehri, Tekirdağ, İzmir, Eskişehir, Tuz Gölü, Vezirköprü, Samsun, Kadirli, Osmaniye, Cizre, Siirt, Kahramanmaraş, Van Gölü, Erzurum, Göle-Kars, Adana, Diyarbakır, Yeşilhisar-Kayseri, Gönen, Ceylanpınar, Batman şeklinde verilmiştir. Bu çalışma ile türün yayılışına yeni bir lokalite kaydı eklenmiştir.

Muğla İli genelinde özellikle büyük memeli türleri üzerindeki tehditlerin ortadan kaldırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimler ve Üniversite işbirliğinde planlamalar yapılmalıdır. Yaban hayvanlarının karayollarında telef olmalarının önüne geçmek amacıyla uygun habitatlarda ekosistem köprülerinin planlanmalıdır. Buna göre Muğla İlinde özellikle Köyceğiz, Döğüşbelen Mevkiinde bir ekosistem köprüsüne ihtiyaç vardır.

Tablo 1. Muğla İli memeli tür listesi ve popülasyon durumları

No	FAMİLYA	TÜR	TÜRKÇE ADI	BERN	CITES	IUCN	ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR	POPULASYON DURUMU
1	Bovidae	<i>Capra aegagrus</i>	Yaban keçisi	-	-	VU	5,7, 20	Sabit
2	Canidae	<i>Canis aureus</i>	Çakal	-	-	LC	5, 19, 7	Azalan
3	Canidae	<i>Canis lupus</i>	Kurt	-	EK-II	LC	8, 10, 18, 20	Azalan
4	Canidae	<i>Vulpes vulpes</i>	Kızıl tilki	-	-	LC	5,7, 8, 9, 10,11, 16, 20	Sabit
5	Cervidae	<i>Dama dama</i>	Alageyik	EK-III	-	LC	5,	Sabit
6	Erinaceidae	<i>Erinaceus concolor</i>	Yaygın kirpi	EK-III	-	LC	5, 7, 13	Sabit
7	Felidae	<i>Caracal caracal</i>	Karakulak	-	EK-I	LC	4, 7, 8, 10, 11	Azalan
8	Felidae	<i>Felis silvestris</i>	Yaban kedisi	EK-II	EK-II	LC	5, 7	Azalan
9	Gliridae	<i>Dryomys nitedula</i>	Hasancık/Ağaç Yeduiyuru	EK-III	-	LC	5, 21, 13	Azalan
10	Hyaenidae	<i>Hyaena hyaena</i>	Çizgili sırtlan	-	-	NT	20, 5	Azalan
11	Hystriidae	<i>Hystrix indica</i>	Oklu kirpi	-	-	LC	5,7, 9,	Azalan
12	Leporidae	<i>Lepus europaeus</i>	Yaban tavşanı	EK-III	-	LC	5,7,8, 9	Sabit
13	Miniopteridae	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Uzun kanatlı yarasa	EK-II	-	NT	6, 12	Azalan
14	Muridae	<i>Apodemus flavicollis</i>	Sarı göğüslü orman faresi	-	-	LC	5, 21, 13, 16	Sabit
15	Muridae	<i>Apodemus mystacinus</i>	Kayalık Orman faresi	-	-	LC	5, 21, 13, 16	Sabit
16	Muridae	<i>Mus domesticus</i>	Ev faresi	-	-	LC	5, 21	Artan
17	Muridae	<i>Mus macedonicus</i>	Makedon faresi	-	-	LC	5, 21	Sabit
18	Muridae	<i>Rattus norvegicus</i>	Göçmen sıçan	-	-	LC	5, 21	Artan
19	Muridae	<i>Rattus rattus</i>	Çatı sıçanı	-	-	LC	5, 21	Artan
20	Mustelidae	<i>Lutra lutra</i>	Su samuru	EK-II	EK-I	NT	1, 2, 3, 5, 14, 17, 20	Azalan
21	Mustelidae	<i>Martes foina</i>	Kaya sansarı	EK-III	-	LC	5, 7, 8, 20	Azalan
22	Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Porsuk	EK-III	-	LC	5, 7, 8, 20	Azalan
23	Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i>	Gelincik	-	EK-III	LC	5, 7, 20	Azalan
24	Mustelidae	<i>Vormela peregusna</i>	Alaca sansar	EK-II	-	VU	*İlk kayıt	Azalan
25	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus blasii</i>	Blasius Nalburunlu yarasası	EK-II	-	LC	6, 12	Azalan
26	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus euryale</i>	Akdeniz nalburunlu yarasası	EK-II	-	NT	6, 12	Azalan
27	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Büyük nalburunlu yarasa	EK-II	-	LC	6, 12	Azalan
28	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Küçük nalburunlu yarasa	EK-II	-	LC	6, 12	Azalan
29	Sciuridae	<i>Sciurus anomalus</i>	Anadolu sincabı	EK-II	-	LC	5, 21	Sabit
30	Soricidae	<i>Crocidura leucodon</i>	Kır sivri faresi	EK-III	-	LC	5, 15	Sabit
31	Soricidae	<i>Crocidura suaveolens</i>	Sivri burunlu bahçe faresi	EK-III	-	LC	5, 15	Sabit
32	Soricidae	<i>Suncus etruscus</i>	Etrusk sivri faresi	-	-	LC	15	Sabit
33	Spalacidae	<i>Nannospalax xanthodon</i>	Anadolu Körfaresi	-	-	DD	24	Azalan
34	Suidae	<i>Sus scrofa</i>	Yaban domuzu	EK-III	-	LC	5,7, 8, 9, 10,11, 16, 20	Artan
35	Ursidae	<i>Ursus arctos</i>	Bozayı	-	EK-II	LC	7, 8, , 18	Azalan
36	Vesertilionidae	<i>Eptesicus bottae</i>	Akdeniz geniş kanatlı yarasası	EK-II	-	NT	6, 12, 23	Azalan
37	Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Cüce yarasa	EK-III	-	LC	6, 12	Azalan

Tablo 2. Muğla İlinde memeli türler üzerindeki tehditler

Türler	Tehditler
Çakal (<i>Canis aureus</i>)	Kaçak av + zehirli et
Kurt (<i>Canis lupus</i>)	Kaçak av + zehirli et
Karakulak (<i>Caracal caracal</i>)	Kaçak av + zehirli et
Yaban Keçisi (<i>Capra aegagrus</i>)	Kaçak av
Oklu kirpi (<i>Hystrix indica</i>)	Tarım ilacı+ kaçak av + habitat tahribatı
Alaca sansar (<i>Vormela peregusna</i>)	Tarım ilacı+ kaçak av + habitat tahribatı
Yaban kedisi (<i>Felis silvestris</i>)	Evcil kediler ile melezleşme + habitat tahribatı
Su samuru (<i>Lutra lutra</i>)	Sulak alan kirliliği + kaçak av
Bozayı (<i>Ursus arctos</i>)	Kaçak av + bal üreticileri ile çatışma

Teşekkür

Bu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Turunç Peyzaj Şirketi tarafından yürütülmüştür. Çalışma süresince desteğini esirgemeyen Dr. Tarkan YORULMAZ'a teşekkür ederim.

Yazarların Katkısı

Çalışmada tüm katkı yazara aittir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Yapılan çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Kaynaklar

- [1] Albayrak İ. 2000. Türkiye'deki Su samuru (*Lutra lutra* L. 1758)'nun yayılışına katkılar. *Tabiat ve İnsan*, 34 (1): 3-7.
- [2] Barlas M., Yorulmaz B. 2000. Su samuru (*Lutra lutra*)'nun Muğla ve çevresinde yayılışı. *Tabiat ve İnsan*, 34 (1): 18-23.
- [3] Çağlar M. 1957. Fethiye civarının bazı memeli hayvanları hakkında. *Biologi, Türk Biyoloji Derneğinin Yayın Organı, İstanbul*, 7 (3): 72-76.
- [4] Çağlar M. 1963. *Felis caracal schmitsi* (Matschie, 1912) in Anatolien. – İstanbul Univ. Fen Fakült. Mecmuası, 23: 51-54.
- [5] Demirsoy A. 1997. Türkiye Omurgalıları, Memeliler. Meteksan Yayınevi, Ankara, 1-292.
- [6] Doğa Koruma ve Korunan Alanlar (DKMP). 2012. Yarasalar ve Mağara Ekosistemleri (Erişim tarihi: 07.02.2017).
- [7] İlemin Y. 2010. Datça-Bozburun Yarımadası Orta ve Büyük Memeli Türlerinin Vejetasyon Tiplerine Bağlı Dağılımının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- [8] İlemin Y. 2014. A camera trapping survey reveals a melanistic grey wolf (*Canis lupus*) in an unusual habitat in Turkey (Mammalia: Carnivora). *Zoology in the Middle East*, 60 (1): 1-5.
- [9] İlemin Y., Gürkan B. 2010. Status and activity patterns of the Caracal, *Caracal caracal* (Schreber, 1776), in Datca and Bozburun Peninsulas, Southwestern Turkey. *Zoology in the Middle East*, 50 (1): 3-10.

- [10] İlemin Y., Kesdek M., Koç H. 2015. Akdeniz Ekosistemleri Büyük Memeli Türleri ve Karnivor Türlerin Bu Ekosistemlerdeki Önemi: Fethiye Babadağ Örneği. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop, Türkiye, 33.
- [11] İlemin Y., Koç H. 2016. Karakulak *Caracal caracal* (Schreber, 1776) türünün Diyeti Üzerine Türkiye’den İlk Bulgular. Sözlü Bildiri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Gaziantep, Türkiye.
- [12] Karataş A., Toprak F., Karakaya H. 2002. Türkiye Yarasaları (Mammalia: Chiroptera). XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi Malatya.
- [13] Kaynaş B.Y. 2008. *Pinus brutia* orman ekosistemlerinde küçük Memeli komünitesi üzerine yangının uzun dönem etkisi ve yangınsonrası komünite yapısının Değişimi üzerine çalışmalar. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- [14] Kesim A., Başkale E., Eryiğit A., Turan Ü., Urhan R., Menengiç M., Kaska Y. 2008. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Su Samuru Habitatları. Su Samurunun Türkiye’deki Durumu III. Sempozyum (Uluslararası katılımlı), 23-24 Ekim, Kırıkkale, 87-98.
- [15] Kryštufek B., Vohralik V. 2001. Mammals of Turkey and Cyprus. Introduction Checklist Insectivora. Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, Koper.
- [16] Kurtonur C., Özkan B., Albayrak Ş., Kıvanç E., Kefelioğlu H. 1996. Memeliler “Türkiye Omurgalılar Tür Listesi”. DPT-TBAG Nürol Matb., Ankara, 1-183.
- [17] Thol-Schmitz H. 2004. Status of the Eurasian Otter, *Lutra lutra*, in Turkey, and experiences with establishing a National Otter Data Base. Zoology in the Middle East, 33: 109-118.
- [18] Şekercioğlu Ç.H., Anderson S., Akçay E., Bilgin R., Can Ö.E., Semiz G., Sağlam İ.K. 2011. Turkey’s globally important biodiversity in crisis. Biological Conservation, 144 (12): 2752-2769.
- [19] Turan N. 1984. Türkiye’nin Av Ve Yaban Hayvanları, Memeliler. Ongun Kardeşler Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1-177.
- [20] Ürker O., İlemin Y., Bulut Ş., Ada E. 2015. Anadolu Sığıla Ormanları (*Liquidambar orientalis*)’nın Biyo-Ekolojisi ve Bu Ormanlardaki Yaban Hayatı Özellikleri Hakkında Güncel Bir Değerlendirme. Sözlü Bildiri, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015, Muğla, Türkiye.
- [21] Yiğit N., Çolak E., Sözen M., Karataş A. 2006. Rodents of Türkiye (Türkiye Kemiricileri). Meteksan, Ankara, 1-114.
- [22] Ulutürk S., Yürümez G. 2019. *Vormela peregusna*’nın Türkiye’deki Dağılışı ve Ekolojileri Üzerine Katkılar. Kommagene Biyoloji Dergisi, 3 (1): 53-55.
- [23] Aulagnier S., Karataş, A., Tsytsulina K. 2008. *Eptesicus bottae*. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T7915A12869203.
- [24] Arslan A., Kryštufek B., Matur F., Zima, J. 2016. Review of chromosome races in blind mole rats (*Spalax and Nannospalax*). Folia Zoologica, 65 (4): 249-301.