

ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı ve Hepatosellüler Karsinom ile İlişkili Ortak Moleküler Yolakların ve Anahtar Biyobelirteçlerin Biyoinformatik Analizlerle Araştırılması*

Dilek PİRİM, Ecem Buse YILMAZ

Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bursa.

ÖZET

Son zamanlardaki çalışmalarda Alzheimer hastalığı (AH) ve kanser arasında bir bağlantı olduğu ortaya konmuş fakat ortak mekanizmayı açıklayacak yeterince kanıt mevcut değildir. Bu bağlantıyı araştıran birçok çalışmada özellikle meme, prostat ve akciğer gibi kanser türleri ile AH arasında ters ilişki olduğu gösterilmekle beraber hepatosellüler karsinom (HCC) ve AH arasındaki ilişki henüz aydınlatılmamıştır. Bu çalışmada, geç başlangıçlı AH (LOAD) ve HCC ile ilişkili RNA dizileme (RNA-seq) verilerini biyoinformatik araçlarla analiz ederek iki hastalığın patogenezinde etkin olması muhtemel ortak moleküler yolakları, ortak diferansiyel olarak ifade olan genleri (DEG) ve aday anahtar miRNA'ları tespit etmeyi amaçladık. RNA-seq veri setleri NCBI-GEO veri tabanından alınarak GREIN web uygulaması ile analiz edildi. Ortak DEG'ler tespit edilerek, fonksiyon zenginleştirme analizleri NetworkAnalyst ile yapıldı. Network görselleştirme ve hub gen tespiti Cytoscape programı ile gerçekleştirildi. Hub genleri hedef alan miRNA'lar mirDIP veri tabanı ile belirlendi. Analiz sonucunda iki veri setinde ortak disregüle olan 33 DEG tespit edildi ve network analizinde iki hastalığın moleküler etiolojisinde olası rolü olan ortak 5 hub gen (*HLA-A*, *HLA-C*, *TRIM31*, *HLA-DQB2*, *HLA-DRB1*) belirlendi. Ortak DEG'lerin immün sistemle ilişkili moleküler yolaklarda ve biyolojik süreçlerde etkin olduğunu gözlemlendi. Ortak hub genlerin koregülasyonunda potansiyel düzenleyici rolleri olabilecek iki hastalıkla da ilişkili olduğu tahmin edilen birçok miRNA bulundu. Sonuçlarımız, her iki hastalık için risk değerlendirmesi ve ilaç geliştirme yaklaşımları için kullanılacak ortak moleküler mekanizmayı *in silico* kanıtlarla vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı. Hepatosellüler karsinom. MiRNA. Biyoinformatik; biyobelirteç. Hub gen.

Investigating the Common Molecular Pathways and Key Biomarkers Associated with Late-Onset Alzheimer's Disease and Hepatocellular Carcinoma by Bioinformatic Analysis

ABSTRACT

Recent studies suggest a potential link between Alzheimer's disease (AD) and cancer yet lack of evidence exists to understand the shared mechanism underlying both diseases. Accumulating research investigating the association between AD and specific types of cancers such as breast, lung and prostate cancer claim inverse relationship between them however possible molecular relationship between AD and hepatocellular carcinoma (HCC) has not been well studied. In this study, we reanalyzed RNA-sequencing data sets related to late-onset AD (LOAD) and HCC to identify common differentially expressed genes (DEGs), molecular pathways as well as key miRNA regulators that may involve in the pathogenesis of both diseases. The data sets were retrieved from NCBI-GEO database and analyzed by GREIN web tool. Overlapped DEGs were identified and their functional enrichments were analyzed by NetworkAnalyst. Cytoscape software was used to visualize network and identify hub genes. MicroRNAs targeting the hub genes were also determined by mirDIP database. A total of 33 DEGs were found to be dysregulated in both datasets and five genes (*HLA-A*, *HLA-C*, *TRIM31*, *HLA-DQB2*, *HLA-DRB1*) were identified as hub genes that possibly involve in the shared molecular etiology of both diseases. Our analyses revealed that common DEGs are enriched in molecular pathways related immune system and multiple miRNA regulators are likely to coregulate the expressions of shared hub genes. The results emphasize *in silico* evidence of common molecular background for LOAD and HCC, which can be ultimately utilized for risk assessments and drug development approaches for both diseases.

Key Words: Alzheimer's disease. Hepatocellular carcinoma. MiRNA. Bioinformatic; biomarker. Hub genes.

Geliş Tarihi: 20.Mayıs.2020

Kabul Tarihi: 08.Temmuz.2020

* 4.Çukurova Hepatosellüler Karsinoma Kongresi'nde (27-29 Şubat 2020, Adana) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Dr. Dilek PİRİM
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bursa.
Tel.: 0 224 294 28 35 - 0544 250 76 80
E-posta: dilekpirim@uludag.edu.tr

Yazarların ORCID ID Bilgisi:

Dilek PİRİM: 0000-0002-0522-9432

Ecem Buse YILMAZ: 0000-0002-3486-7994

Alzheimer hastalığı (AH) hala dünya çapında demans ve yıkıcı beyin hastalıklarının en yaygın türü olarak bilinmektedir¹. Genetik risk faktörlerinin AH klinik öncesi ve klinik evrelerinde önemli rol oynadığını gösteren kanıtlar her geçen gün artmakla beraber hastalığın halk sağlığı yükünü hafifletmek için daha fazla araştırma gerekmektedir²⁻⁵. Erken başlangıçlı Alzheimer Hastalığı (EOAD), AH'nin daha az yaygın formu olarak bilinir ve klinik bulgular 65 yaşından önce başlayarak hasta bireylerin teşhisi de daha erken dönemde olur. Geç başlangıçlı AH ise hastalığın en

sık görülen formudur ve genetik faktörlerle beraber çevresel faktörlerin de etkin olduğu heterojen bir eti-yolojiye sahiptir, bu da doğru erken tanı ve tedavi seçeneklerinin geliştirilmesinde en büyük engele neden olur⁶. Bu sebeple, AH patogeneğinde etkin moleküler yolakların ve biyobelirteçleri ortaya çıkarmak AH yönetimi için uygun tanı, risk değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.

Metabolik yollarda bozuklukların sebep olduğu obezite, dislipidemi ve diyabet gibi metabolik hastalıkların AH gelişimi ile ilişkili olduğu bilinmektedir⁷⁻¹⁰. Ayrıca, son epidemiyolojik çalışmalarda AH ve kanser arasındaki bağlantıyı düşündüren ilginç kanıtlar da sağlanmıştır¹¹⁻¹⁹. Verilerde çelişkili sonuçlar olmasına rağmen büyük bir çoğunluğu AH ve kanser arasında ters bir ilişki olduğunu öne sürerek farklı kanser türlerine sahip olan bireylerde AH gelişme risklerinin düşük olduğu fikrini ortaya koyar^{20,21}. Bu konuyu araştırmak ve bu iki önemli küresel halk sağlığı sorununun temelinde yatan ortak mekanizmanın aydınlatılması son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi çeken bir konu olmaya devam etmektedir^{22,23}.

Bu alanda yapılan çalışmalarda malign beyin tümörleri (*TREM2*, *SPI1*, *CD33* ve *INPP5D*) ile ilişkili genlerin AH riskine katkıda bulunduğu gösterilmiştir²⁴. Diğer bir çalışmada meme kanseri hastalarında *CD33* ve *CD2AP* genlerindeki patojenik varyantların AH hastalığı için risk teşkil eden APOE varyantları ile beraber aktarıldığı gösterilmiş, meme kanseri ilişkili bilişsel gerilemede AH ile ilişkili APOE geninin önemi ortaya konmuştur²⁵. Ayrıca, AD ve kanser hastalığı ile ilişkili miRNA'ların da iki hastalık için rolleri araştırılmış ve iki hastalık durumunda da anlatımları düzensizleşen miRNA'ların çoğunlukla anlatımlarının zıt yönde değişiklikler gösterdiğini belirten çalışmalar mevcuttur^{26,27}. Bu alandaki mevcut bilginin daha fazla çalışmayla açıklığa kavuşturulması ilaç yeniden amaç-


landırma, ilaç yeniden profilendirme, ilaç yeniden hedeflendirme ve kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımları oluşturma potansiyeli açısından dönüşümsel tıp alanı için son derece önemlidir^{28,29}.

Bu amaçla yapılan çalışmalarda AH ve farklı kanser türleri arasındaki ortak etiolojiye dair kanıtlar olmasına rağmen hepatosellüler kanser (HCC) ve AH arasındaki ilişkiyi gösteren literatürde çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, AH hastalığının yaygın formu olan LOAD ve HCC arasındaki ortak moleküler etiolojiyi araştırarak iki hastalığın yönetimi için tasarlanabilecek dönüşümsel tıp yaklaşımlarına veri oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışmamızda *in silico* araçlar kullanarak LOAD ve HCC ile ilgili ortak biyolojik yollar, anahtar biyobelirteçleri ve regülatörleri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

2.1. Veri erişimi ve diferansiyel gen ifade analizleri

Bu çalışmada kullanılan RNA-seq veri setleri (GSE73708, GSE67333) Gene Expression Omnibus (GEO) veritabanından alınmıştır³⁰. GSE73708, 4 HCC'e sahip birey ve 4 kontrol içerirken, GSE67333 veri setinde LOAD'a sahip 4 hasta ve 4 kontrol bulunmaktadır (Tablo I). Her iki veri setindeki vakalar ve kontroller arasındaki diferansiyel olarak ifade edilen genler (DEG'ler), GEO RNA-seq Experiments Interactive Navigator (GREIN) web platformu kullanılarak analiz edildi³¹. P-değeri <0.05 ve log₂FC ≥ 2 veya ≤ -2 olan DEG'ler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Her iki veri kümesi için de istatistiksel olarak anlamlı DEG'ler karşılaştırılarak ortak DEG'ler çalışmanın ileriki aşamalarına dahil edildi (Şekil 1).



Şekil 1.

Çalışmanın metodolojik yaklaşımı

LOAD ve HCC İle İlişkili Ortak Moleküler Yolaklar

Tablo I. Çalışmada analiz edilen GEO veri setleri

Veri Seti	Doku Tipi	Örnek Grup		Metod	Platform
		Hasta sayısı	Kontrol sayısı		
GSE73708	Karaciğer	4 HCC	4 Sağlıklı kontrol	RNA-Seq	Illumina HiSeq 2000
GSE67333	Hipokampus	4 LOAD	4 Sağlıklı kontrol	RNA-Seq	Illumina HiSeq 2000

2.2. Protein etkileşim ağ network analizi ve hub gen tanımlanması

İlk olarak, ortak DEG'ler, protein-protein etkileşimlerini (PPE) analiz etmek için STRING³² v11.0 veritabanına (<https://string-db.org/>) aktarıldı ve birleşik skor > 0.4 seçilerek protein etkileşim ağı oluşturuldu. Ağ görselleştirilmesi ve ağın topolojik özelliklerinin analizi Cytoscape yazılımında (Cytoscape v3.7.1) Cytohubba eklentisi kullanılarak yapılarak hub genler tespit edildi (Cytoscape v3.7.1). Cytohubba, 12 farklı puanlama yöntemi kullanarak proteinlerin etkileşimlerini hesaplar ve hub genler bu puanlamalara göre seçilir³³. Bu çalışmada tanımlanan "hub genler" topolojik analizde derece sıralamasında (ağ düğüm derecesi ≥ 4) en üst ortak DEG'ler dikkate alınarak tanımlanmıştır³⁴. Seçilen proteinler protein etkileşim ağına en fazla etkileşime sahip hub moleküllerdir.

2.3. Ortak diferansiyel olarak ifade olan genlerin fonksiyonel analizleri

İki veri setinde ortak DEG'lerin moleküler yolaklarda ve biyolojik süreçlerde kümelenmelerini ve fonksiyonlarını analiz etmek için NetworkAnalyst aracı kullanıldı³⁵. Fonksiyon zenginleştirme analizinde hipergeometrik teste göre $p < 0.05$ olan Kyoto Genler ve Genomlar Ansiklopedisi (KEGG) ve Gen Ontolojisi (GO) terimleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

2.4. Ortak miRNA-hedef gen etkileşimlerinin tahmini

MikroRNA'ların gen regülasyonunda önemli rolleri olduğu bilindiğinden çalışmamızda HCC ve LOAD'da aynı hub genleri hedef alan iki hastalıkta muhtemel ilişkili miRNA'lar MicroRNA Veri Entegrasyon Portalı (mirDIP) v4.1 veritabanı kullanılarak tespit edildi³⁶. Tespit edilen hub genler grup olarak veri tabanına yüklenerek 30 farklı algoritmadan gelen veriler entegre edilerek hub genleri hedefleyen miRNA'lar tahmin edildi.

Tablo III. Protein etkileşim ağına Hub genlerin topolojik özellikleri (Ağ düğüm derecesi ≥ 4)

Gen ID	Betweenness	BottleNeck	Closeness	Clustering Coefficient	Degree	DMNC	EcCentricity	EPC	MCC	MNC	Radiality	Stress
HLA-DRB1	186	17	11.28333	0.25	8	0.56839	0.17895	7.525	28	4	5.92763	186
HLA-DQB2	0	1	8.28333	1	4	0.56839	0.14912	6.74	24	4	5.25658	0
TRIM31	0	1	8.28333	1	4	0.56839	0.14912	6.792	24	4	5.25658	0
HLA-C	0	1	8.28333	1	4	0.56839	0.14912	6.708	24	4	5.25658	0
HLA-A	0	1	8.28333	1	4	0.56839	0.14912	6.806	24	4	5.25658	0

Bulgular

3.1. DEG analizleri ve ortak DEG'lerin tanımlanması

GSE73708 ve GSE67333 veri setlerindeki RNA-seq verilerinin analizleri sonucunda HCC'de 2632, LOAD'da ise 255 DEG tespit edildi. HCC ve LOAD için tespit edilen DEG'ler karşılaştırılarak, protein kodlayan genlere karşılık gelen her iki hastalıkta için de ortak 33 DEG tanımlandı. Bunlardan 5'i HCC'de aşağı-regüle iken LOAD'da yukarı regüle olduğu, 10 DEG'in HCC'de yukarı-regüle ve LOAD veri setinde ise aşağı-regüle olduğu, 18 DEG'in ise her iki veri setinde de aynı yönde anlatım yaptığı tespit edildi. Tablo II, her iki hastalıkta da aynı ve zıt yönlerde düzensiz ifade edilen ortak DEG'leri göstermektedir.

3.2. Protein-protein etkileşim ağının kurulması

STRING veritabanı kullanılarak analiz edilen 33 ortak DEG'in PPE zenginleştirme P-değeri $2E-09$ bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı ölçüde PPE ağı kuruldu. Ağ görüntülenmesi için Cytoscape kullanılarak ağın topolojik özellikleri Cytohubba ile hesaplanarak Tablo III'de gösterilmiştir. Ağ düğüm derecesi ≥ 4 olan genleri hub genleri olarak kabul ettik ve bu şekilde iki hastalığın ortak yolaklarında etkin olduğu muhtemel 5 hub gen (*HLA-DRB1*, *HLA-DQB2*, *TRIM31*, *HLA-C*, *HLA-A*) tespit ettik. Ayrıca, 2 hub geninin (*HLA-DRB1*, *HLA-C*) her iki veri setinde de aynı yönde düzenlendiğini ve 3 hub geninin (*HLA-DQB2*, *TRIM31*, *HLA-A*) HCC ve LOAD'da ters yönde düzenlendiğini gözlemledik (Tablo II).

Tablo II. LOAD ve HCC veri setlerinde tespit edilen ortak DEG'ler

Direction of the deregulation of the DEG	Gene ID
+ LOAD/- HCC	<i>RAB25</i> , <i>TTN</i> , <i>GABBR1</i> , <i>HLA-DQB2</i> , <i>P2RY10</i>
+ HCC/- LOAD	<i>SLPI</i> , <i>MAPT</i> , <i>TRIM31</i> , <i>S100A8</i> , <i>S100A9</i> , <i>HLA-A</i> , <i>DCANP1</i> , <i>HSPA1B</i> , <i>AGPAT1</i> , <i>BPIFA2</i>
- LOAD/- HCC	<i>AREG</i> , <i>HLA-DRB1</i> , <i>MARCO</i> , <i>C7orf34</i>
+ LOAD/+ HCC	<i>PRRC2A</i> , <i>SULT1C2</i> , <i>EGFL8</i> , <i>CAPN11</i> , <i>HSPA1A</i> , <i>NFKBIL1</i> , <i>UBE2C</i> , <i>HLA-C</i> , <i>MICA</i> , <i>CDX1</i> , <i>SMPX</i> , <i>ISX</i> , <i>RHO</i> , <i>MAGEB17</i>


+: Yukarı regülasyon, -: Aşağı regülasyon

3.3. DEG'lerin moleküler yollarda ve biyolojik süreçlerde zenginleştirilmesi

HCC ve LOAD veri setlerinde ortak DEG'lerin KEGG yolak ve GO zenginleştirme analizi NetworkAnalyst aracında gerçekleştirildi. Ortak DEG'lerin kümelendiği en önemli 10 KEGG terimi bağışıklık tepkisi ile ilişkiliydi ve en önemli terim “Antijen işleme ve sunum yolu” idi ($P=4.83E-07$) (Tablo IV). Tüm istatistiksel olarak anlamlı KEGG terimleri Şekil 2’de gösterilmiştir. GO zenginleştirme analizi, ortak DEG'lerin çeşitli GO terimleriyle ilişkili olduğunu ve bunların özellikle immün cevaptaki rollerinin önemini ortaya koymuştur (Şekil 3). GO terimleri ile ilişkili en önemli biyolojik sürecin "doğal bağışıklık yanıtı" olduğu da gözlenmiştir ($P=5.89E-06$) (Tablo V).

Tablo IV. Ortak DEG'lerin kümelendikleri en anlamlı 10 KEGG terimi ($P<0.05$)

KEGG ID	KEGG Yoluğu	P- değeri	Genler
hsa04612	Antijen işleme ve sunma (Antigen processing and presentation)	4.83E-07	HLA-A, HLA-C, HLA-DRB1, HSPA1A, HSPA1B
hsa05330	Allograft reddi (Allograft rejection)	7.09E-05	HLA-A, HLA-C, HLA-DRB1
hsa05332	Graft-versus-host hastalığı (Graft-versus-host disease)	8.92E-05	HLA-A, HLA-C, HLA-DRB1
hsa04940	Tip 1 diyabet mellitus (Type 1 diabetes mellitus)	0.000103	HLA-A, HLA-C, HLA-DRB1
hsa05320	Otoimmün tiroid hastalığı (Autoimmune thyroid disease)	0.000193	HLA-A, HLA-C, HLA-DRB1
hsa05416	Viral miyokardit (Viral myocarditis)	0.000265	HLA-A, HLA-C, HLA-DRB1
hsa04145	Fagozom (Phagosome)	0.000279	HLA-A, HLA-C, HLA-DRB1, MARC
hsa04144	Endositoz (Endocytosis)	0.00166	HLA-A, HLA-C, HSPA1B, HSPA1A
hsa05145	Toksoplazmozis (Toxoplasmosis)	0.00178	HSPA1B, HSPA1A, HLA-DRB1
hsa04650	Doğal öldürücü hücre aracılı sitotoksikite (Natural killer cell mediated cytotoxicity)	0.00271	HLA-A, HLA-C, MICA
hsa04915	Östrojen sinyal yoluğu (Estrogen signaling pathway)	0.00314	HSPA1B, HSPA1A, GABBR1




Şekil 2.

Ortak DEG'lerin kümelendikleri KEGG yolak terimleri ($p<0.05$). Dairenin büyüklüğü ilgili yolağın anlamlılık derecesiyle doğru orantılıdır. Kırmızı daire en anlamlı yolağı gösterir.

Tablo V. Ortak DEG'lerin kümelendikleri biyolojik süreçlerle ilişkili en anlamlı 10 GO terimi ($P<0.05$)

GO term ID:	P-değeri	Genler
GO:0045087: Doğal bağışıklık yanıtı (Innate immune response)	5.89E-06	HLA-A, HLA-C, HLA-DQB, HLA-DRB1, S100A8, S100A9, MARCO, MICA
GO:0009581: Dış uyarıların tespiti (Detection of external stimulus)	2.92E-05	HLA-A, HLA-DRB1, RHO, TTN
GO:0009617:Bakteriye yanıt (Response to bacterium)	3.28E-05	HLA-A, HLA-DRB1, S100A8, S100A9, MICA, NFKBIL1
GO:0006952: Savunma tepkisinin pozitif düzenlenmesi (Positive regulation of defense response)	7.75E-05	S100A8, S100A9, MARCO, MICA, NFKBIL1
GO:0050776: Bağışıklık yanıtının düzenlenmesi (Regulation of immune response)	0.000139	HLA-A, HLA-C, HLA-DQB2, HLA-DRB1, MARCO, MICA, NFKBIL1
GO:0006952: Savunma tepkisinin düzenlenmesi (Regulation of defense response)	0.000172	HLA-A, S100A8, S100A9, MARCO, MICA, NFKBIL1
GO:0019221: Sitokin aracılı sinyal yoluğu (Cytokine-mediated signaling pathway)	0.000337	HLA-A, HLA-C, HLA-DQB2, HLA-DRB1, AGPAT1
GO:0050906: Uyarıların tespiti (Detection of stimulus)	0.000426	HLA-A, HLA-DRB1, RHO, TTN
GO:0002253:İmmün yanıtın aktivasyonu (Activation of immune response)	0.000454	HLA-DQB2, HLA-DRB1, MARCO, MICA, NFKBIL1
GO:0002376: İmmün sistem sürecinin düzenlenmesi (Regulation of immune)	0.000504	HLA-A, HLA-C, HLA-DQB2, HLA-DRB1, MARCO, MICA, NFKBIL1, HSPA1B



Şekil 3.

Ortak DEG'lerin kümelendikleri GO biyolojik süreçler ($p<0.05$). Dairenin büyüklüğü ilgili yolağın anlamlılık derecesiyle doğru orantılıdır. Kırmızı daire en anlamlı yolağı gösterir.

3.4. HCC ve LOAD için ortak miRNA regülatörlerinin tespiti

Hub genleri ortak olarak regüle eden miRNA'ların tahmin analizleri mirDIP veritabanı kullanılarak yapıldı. MirDIP'teki analizlerimiz, iki veya daha fazla

LOAD ve HCC İle İlişkili Ortak Moleküler Yolaklar

hub geni regüle etme potansiyeli olan yüksek skorlu 40 miRNA tespit edildi. Beş miRNA (hsa-miR-143-3p, hsa-miR-148a-3p, hsa-miR-148b-3p, hsa-miR-152-3p, hsa-miR-939-5p) önerilen hub genler için varsayılan ortak anahtar miRNA regülatörü olarak öngörülmüştür. Hub genlerinin en az dördünün ekspresyonunu regüle ettiği tahmin edilen ortak HCC ve LOAD miRNA regülatörleri Tablo VI'da gösterilmiştir.

Tablo VI. LOAD ve HCC ile ilişkili hub genlerin miRNA regülatörleri

miRNA ID	Hub genes
hsa-miR-143-3p	<i>HLA-A, HLA-C, HLA-DQB2, HLA-DRB1, TRIM31</i>
hsa-miR-148a-3p, hsa-miR-148b-3p, hsa-miR-152-3p	<i>HLA-A, HLA-C, HLA-DQB2, HLA-DRB1</i>
hsa-miR-939-5p	<i>HLA-A, HLA-C, HLA-DQB2, TRIM31</i>
hsa-miR-1207-5p, hsa-miR-125b-5p, hsa-miR-486-3p	<i>HLA-DQB2, HLA-DRB1</i>
hsa-miR-136-5p, hsa-miR-494-3p, hsa-miR-767-5p, hsa-miR-873-5p, hsa-miR-22-5p	<i>HLA-A, HLA-DRB1</i>
hsa-miR-181c-5p, hsa-miR-654-5p, hsa-miR-760	<i>HLA-C, HLA-DQB2</i>
hsa-miR-185-5p, hsa-miR-622	<i>HLA-C, TRIM31</i>
hsa-miR-197-3p	<i>HLA-DQB2, TRIM31</i>
hsa-miR-2110, hsa-miR-224-5p, hsa-miR-23a-3p, hsa-miR-23b-3p, hsa-miR-205-5p, hsa-miR-301a-3p, hsa-miR-423-5p, hsa-miR-491-5p, hsa-miR-500a-3p, hsa-miR-518c-5p, hsa-miR-608, hsa-miR-1299, hsa-miR-1293, hsa-miR-130a-3p, hsa-miR-130b-3p, hsa-miR-149-3p, hsa-miR-1224-3p	<i>HLA-A, HLA-C</i>
hsa-miR-298	<i>HLA-C, HLA-DRB1</i>
hsa-miR-330-5p, hsa-miR-942-5p, hsa-miR-326	<i>HLA-A, HLA-DQB2</i>

Tartışma ve Sonuç

AH, dünya çapında yüksek mortalite ve mortalite oranlarına yol açan tedavi edilemez hastalıklardan biridir. Genomik tıptaki ilerlemeye ve AH patofizyolojisi ile bilgi birikimine rağmen hastalığın etiolojisinin altında yatan sebepler hala araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle, AH erken teşhisinde kullanmak ve yeni terapötik yaklaşımlar geliştirmek için yeni biyobelirteçleri tanımlamaya acil ihtiyaç vardır. Son yıllarda, biriken kanıtlar AH ile kanser arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir ve bu da her iki hastalığın ortak moleküler etiolojisinin araştırılmasının AH patogeneziyle ilgili umut verici biyobelirteçleri ortaya çıkarabileceğini göstermektedir. Bu alanda yapılan araştırmaların bazı sınırlamaları ve çelişkili sonuçları olmasına rağmen, çeşitli çalışmalar AH ve farklı kanser türleri arasında ters bir ilişki olduğunu göstermektedir.^{37,38,39,40,41} Bununla birlikte, AH ve HCC arasındaki bağlantıya ait yeterli çalışma yoktur. HCC en yaygın karaciğer malignitesidir ve devam eden çabalar sağkalım oranlarını arttırmak ve

toplumlardaki hastalık yükünü hafifletmek için hassas moleküler biyobelirteçler geliştirmeyi amaçlamaktadır.⁴²

Bu çalışmada, AH ve HCC patofizyolojisinin altında yatan ortak moleküler mekanizma biyoinformatik araçlarla araştırıldı. İn siliko yaklaşımla tasarlanan çalışmamızın temel amacı, bu alanda tedavi yaklaşımları ve hastalık yönetimi için araştırmacılara in siliko kanıt sunarak deneysel araştırmalara ön veri oluşturmaktır.

Bu doğrultuda, AH'nın yaygın tipi olan LOAD ve HCC ile ilişkili RNA-seq veri setleri GEO veri tabanından alınarak analiz edildi. Her iki hastalıkta da ortak DEG'ler tanımlandı ve bunların moleküler yolaklarda ve biyolojik süreçlerde işlevlerini tanımlamak için fonksiyon zenginleştirme analizleri yapıldı. Bu analizler, ortak DEG'lerin bağışıklık tepkisi ve bununla ilgili hücresel süreçler üzerindeki varsayılan etkilerine ışık tutmaktadır. PPE ağı ve hub gen analizlerimiz, ağda yüksek derecelere sahip 5 hub geni (*HLA-DRB1, HLA-DQB2, TRIM31, HLA-C, HLA-A*) ortaya çıkardı. *HLA-DRB1* ve *HLA-A*'nın her iki veri setinde de aynı yönde düzenlendiği gözlenmiştir, ancak diğer hub genlerin iki hastalığa ait veri setlerinde zıt yönlerde regüle edildikleri gözlenmiştir. Özellikle belirtmek gerekir ki, bahsedilen genler bağışıklık tepkisinin iyi bilinen araçlarıdır; AD⁴³⁻⁴⁵ ve HCC⁴⁶⁻⁴⁸ dahil olmak üzere enflamasyon ile ilişkili hastalıkların patogeneziinde önemli rol oynadıkları bilinmektedir. Ayrıca, tespit edilen hub genlerinin de içinde bulunduğu majör doku-uyumluluk kompleksi (MHC) genlerinin tümör gelişimi ve metastazındaki rolleri geniş çapta araştırılmaktadır ve kanser tedavisinde immünoterapi uygulamaları için hedef moleküller olarak önerilmektedir.^{49,50,51} Aynı zamanda nörodejenerasyona bağlı immün cevabın da AH patogeneziinde önemli rolü olduğu bilinmektedir.⁵²⁻⁵⁵ Diğer hub olarak önerdiğimiz *TRIM31* (E3 Ubiquitin-Protein Ligase) geni ayrıca, doğuştan gelen bağışıklık tepkisi ve kanser metabolizmasındaki önemli rolü nedeniyle HCC'de terapatik hedef olarak gösterilmektedir.⁵⁶ Analizlerimizde LOAD veri setinde aşağı-regüle olduğu gözlenen *TRIM31* geni daha önceki çalışmalarla AH'de aktif olan *NLRP3* inflamazomunun inhibitörü olarak gösterilmiştir.^{57,58} Bu bağlamda, kanser tedavisinde *TRIM31*'i hedef alan terapatik yaklaşımlar kişilerde AH gelişme riskini artırabileceği değerlendirilerek özenle uygulanmalıdır.

Ek olarak, LOAD ve HCC için ortak anahtar biyobelirteçleri belirleme çabalarımız, her iki hastalıkta da hub olarak önerilen genlerin regülasyonunda önemli olması olası 40 miRNA'yı ortaya çıkarmıştır (Tablo VI). Gen ekspresyonunun post-translasyonel regülasyonunda görevli miRNA'ların kanser ve nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere bir çok hastalığın patogeneziine önemli katkıları olduğu

bilinmektedir⁵⁹⁻⁶¹. Ortak hub genlerini düzenlemesinde rolü olduğu tahmin edilen miRNA'lar arasında olan "miR-143-3p" beş hub geninin hepsinin hedef regülasyonu olma potansiyeli açısından iki hastalık için ortak anahtar miRNA olarak düşünülmektedir. Bu sonucumuz HCC ve AH'de miRNA-143'ün düzensiz ekspresyonunu gösteren önceki çalışmaların sonuçları ile de uyumludur^{62,63,64}. MiRNA-143'ün LOAD ve HCC'deki olası ortak rolü ileriki çalışmalarla aydınlatılmalıdır.

Çalışmamızda toplum sağlığı açısından önemli iki hastalığın ortak mekanizmasına ait *in siliko* bulgularımız yeni araştırmalara yön verme açısından son derece önemlidir. Bu alanda Lai ve ark. tarafından yapılan bir araştırmada yeni HCC tanısı konmuş kişiler ve HCC olmayan kontrol grubu arasında AH komorbiditesi istatistiksel olarak hesaplanmış ve iki hastalık arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır⁶⁵. Önemle belirtmek gerekir ki bu çalışma metodoloji açısından iki hastalık arasında ortak bir mekanizma olmadığını savunmak için yeterli kanıtlara sahip değildir. HCC tanısı konmuş bireyleri ve eşleşen kontrolleri uzun dönemde takip ederek AH oluşma riskinin gözlenmesi ile bu iki hastalık arasındaki korelasyonun gözlenmesi ile daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilir.

Bununla beraber bizim çalışmamızın sonuçlarını destekler nitelikteki güncel bir derlemede ise karaciğer disfonksiyonunun AH oluşumuna zemin hazırlayacak moleküler yolları etkileyebileceği tartışılmıştır⁶⁶. Bu çelişen sonuçların güçlü metodolojilerle düzenlenmiş epidemiyolojik ve omik çalışmalarla daha fazla araştırılması gerekmektedir.

Bu çalışmanın *in siliko* tasarımından kaynaklı ve sonuçlarımızın deneysel olarak test edilmediği için bazı sınırlamaları vardır. Ancak bulgularımız, metodolojimizin ve analizlerimizin güçlü yönlerini destekleyen literatürle son derece uyumludur. Önemle not etmek isteriz ki, bu sonuçların iki hastalığın moleküler epidemiyolojisindeki ortak katkıları aydınlatmak için bağımsız veri setlerinde değerlendirme yapılması gerekir.

Sonuç olarak, bulgularımız HCC ve LOAD patogenezi ortak yolların ve moleküler biyobelirteçlerin olduğunu ve bunların her iki hastalık için risk değerlendirmesinde ve terapötik uygulamalar geliştirirken dikkate alınması gerektiğini önermektedir. Mevcut çalışmanın *in siliko* bulgularının ileri deneysel araştırmalarla da doğrulanması gerekmektedir ve ileriki çalışmalarla desteklenen sonuçlarının ilaç yeniden amaçlandırma araştırmalarına da veri oluşturma potansiyeli vardır.

Etik Kurul Bilgisi:

Araştırmamızda Etik Kurulu onayı gerektiren hiçbir insan/hayvan örneği kullanılmamıştır. Analizlerde kullanılan veri setleri araştırmacıların farklı analizlerine olanak sağlamak amacıyla halka açık erişimli sunulan NCBI GEO veri tabanından indirilmiş dolayısıyla etik kurul onayı gerekmemektedir.

Kaynaklar

1. Uddin MS, Ashraf GM. Introductory Chapter: Alzheimer's Disease-The Most Common Cause of Dementia. *Advances in Dementia Research*, London: IntechOpen; 2019. 1-8.
2. Bekris LM, Yu CE, Bird TD, et al. Genetics of Alzheimer disease. *J Geriatr Psychiatry Neurol* 2010;23(4):213-27.
3. Goldman JS, Hahn SE, Catania JW, et al. American College of Medical Genetics and the National Society of Genetic Counselors. Genetic counseling and testing for Alzheimer disease: joint practice guidelines of the American College of Medical Genetics and the National Society of Genetic Counselors. *Genet Med* 2011;13(6):597-605.
4. Kunkle BW, Grenier-Boley B, Sims R, et al. Alzheimer Disease Genetics Consortium (ADGC); European Alzheimer's Disease Initiative (EADI), Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology Consortium (CHARGE), Genetic and Environmental Risk in AD/Defining Genetic, Polygenic and Environmental Risk for Alzheimer's Disease Consortium (GERAD/PERADES), Genetic meta-analysis of diagnosed Alzheimer's disease identifies new risk loci and implicates Aβ, tau, immunity and lipid processing. *Nat Genet* 2019;51(3):414-430.
5. Ozaki K, Niida S. Genetic Background for Alzheimer's Disease: Knowledge Accumulated from AD GWAS. *Brain Nerve* 2019;71(10):1039-1051.
6. Alzheimer's Association. 2019 Alzheimer's Disease Facts and Figures. *Alzheimers Dement* 2019;15(3):321-387.
7. Toledo JB, Arnold M, Kastenmüller G, et al. Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative and the Alzheimer Disease Metabolomics Consortium. Metabolic network failures in Alzheimer's disease: A biochemical road map. *Alzheimers Dement* 2017;13(9):965-984.
8. Clarke JR, Ribeiro FC, Frozza RL, et al. Metabolic Dysfunction in Alzheimer's Disease: From Basic Neurobiology to Clinical Approaches. *J Alzheimers Dis* 2018;64(s1):S405-S426
9. Kapogiannis D, Mattson MP. Disrupted energy metabolism and neuronal circuit dysfunction in cognitive impairment and Alzheimer's disease. *Lancet Neurol* 2011;10(2):187-98.
10. Craft S. The role of metabolic disorders in Alzheimer disease and vascular dementia: two roads converged. *Arch Neurol* 2009;66(3):300-5.
11. Majd S, Power J, Majd Z. Alzheimer's Disease and Cancer: When Two Monsters Cannot Be Together. *Front Neurosci* 2019;13:155.
12. Frain L, Swanson D, Cho K, et al. Association of cancer and Alzheimer's disease risk in a national cohort of veterans. *Alzheimers Dement* 2017;13(12):1364-1370.
13. Musicco M, Adorni F, Di Santo S, et al. Inverse occurrence of cancer and Alzheimer disease: a population-based incidence study. *Neurology* 2013 23;81(4):322-8.
14. Driver JA, Beiser A, Au R, et al. Inverse association between cancer and Alzheimer's disease: results from the Framingham Heart Study. *BMJ* 2012;344:e1442.
15. Catalá-López F, Suárez-Pinilla M, Suárez-Pinilla P, et al. Inverse and direct cancer comorbidity in people with central nervous system disorders: a meta-analysis of cancer incidence in 577,013 participants of 50 observational studies. *Psychother Psychosom* 2014;83(2):89-105.
16. Roe CM, Behrens MI, Xiong C, et al. Alzheimer disease and cancer. *Neurology* 2005;64(5):895-8.
17. Roe CM, Fitzpatrick AL, Xiong C, et al. Cancer linked to Alzheimer disease but not vascular dementia. *Neurology* 2010;74(2):106-12.
18. Ou SM, Lee YJ, Hu YW, et al. Does Alzheimer's disease protect against cancers? A nationwide population based study. *Neuroepidemiology* 2013;40(1):42-9.

LOAD ve HCC İle İlişkili Ortak Moleküler Yolaklar

19. Lee JE, Kim D, Lee JH. Association between Alzheimer's Disease and Cancer Risk in South Korea: an 11-year Nationwide Population-Based Study. *Dement Neurocogn Disord* 2018;17(4):137-147.
20. Zhang Q, Guo S, Zhang X, et al. Inverse relationship between cancer and Alzheimer's disease: a systemic review meta-analysis. *Neurol Sci* 2015;36(11):1987-94.
21. Shafi O. Inverse relationship between Alzheimer's disease and cancer, and other factors contributing to Alzheimer's disease: a systematic review. *BMC Neurol* 2016;16(1):236.
22. Nudelman KNH, McDonald BC, Lahiri DK, Saykin AJ. Biological Hallmarks of Cancer in Alzheimer's Disease. *Mol Neurobiol* 2019;56(10):7173-7187.
23. Behrens MI, Lendon C, Roe CM. A common biological mechanism in cancer and Alzheimer's disease? *Curr Alzheimer Res* 2009;6(3):196-204.
24. Lehrer S. Glioma and Alzheimer's Disease. *J Alzheimers Dis Rep* 2018;2(1):213-218.
25. Lehrer S, Rheinstein PH. Alzheimer's Disease Susceptibility Genes in Malignant Breast Tumors. *Cancer Transl Med* 2019;5(2):42-46.
26. Holohan KN, Lahiri DK, Schneider BP, Foroud T, Saykin AJ. Functional microRNAs in Alzheimer's disease and cancer: differential regulation of common mechanisms and pathways. *Front Genet* 2013;3:323.
27. Nagaraj S, Zoltowska KM, Laskowska-Kaszub K, Wojda U. microRNA diagnostic panel for Alzheimer's disease and epigenetic trade-off between neurodegeneration and cancer. *Ageing Res Rev* 2019;49:125-143.
28. Monacelli F, Cea M, Borghi R, Odetti P, Nencioni A. Do Cancer Drugs Counteract Neurodegeneration? Repurposing for Alzheimer's Disease. *J Alzheimers Dis* 2017;55(4):1295-1306.
29. Vargas DM, De Bastiani MA, Zimmer ER, Klamt F. Alzheimer's disease master regulators analysis: search for potential molecular targets and drug repositioning candidates. *Alzheimers Res Ther* 2018;10(1):59.
30. Clough E, Barrett T. The Gene Expression Omnibus Database. *Methods Mol Biol* 2016;1418:93-110.
31. Mahi NA, Najafabadi MF, Pilarczyk M, Kouril M, Medvedovic M. GREIN: An Interactive Web Platform for Re-analyzing GEO RNA-seq Data. *Sci Rep* 2019;9(1):7580.
32. Szklarczyk D, Gable AL, Lyon D, et al. STRING v11: protein-protein association networks with increased coverage, supporting functional discovery in genome-wide experimental datasets. *Nucleic Acids Res* 2019;47(D1):D607-D613.
33. Chin CH, Chen SH, Wu HH, Ho CW, Ko MT, Lin CY. cytoHubba: identifying hub objects and sub-networks from complex interactome. *BMC Syst Biol* 2014;8 Suppl 4:S11.
34. Ideker T, Sharan R. Protein networks in disease. *Genome Res* 2008;18(4):644-52.
35. Xia J, Gill EE, Hancock RE. NetworkAnalyst for statistical, visual and network-based meta-analysis of gene expression data. *Nat Protoc* 2015;10(6):823-44.
36. Tokar T, Pastrello C, Rossos AEM, et al. mirDIP 4.1-integrative database of human microRNA target predictions. *Nucleic Acids Res* 2018;46(D1):D360-D370.
37. Seddighi S, Houck AL, Rowe JB, Pharoah PDP. Evidence of a Causal Association Between Cancer and Alzheimer's Disease: a Mendelian Randomization Analysis. *Sci Rep* 2019;9(1):13548.
38. Ibáñez K, Boulossa C, Tabarés-Seisdedos R, Baudot A, Valencia A. Molecular evidence for the inverse comorbidity between central nervous system disorders and cancers detected by transcriptomic meta-analyses. *PLoS Genet* 2014;10(2):e1004173.
39. Lehrer S, Rheinstein PH. Alzheimer's Disease Susceptibility Genes in Malignant Breast Tumors. *Cancer Transl Med* 2019;5(2):42-46.
40. Sánchez-Valle J, Tejero H, Ibáñez K, et al. A molecular hypothesis to explain direct and inverse co-morbidities between Alzheimer's Disease, Glioblastoma and Lung cancer *Sci Rep* 2017;7(1):4474.
41. Battaglia C, Venturin M, Sojic A, et al. Candidate Genes and MiRNAs Linked to the Inverse Relationship Between Cancer and Alzheimer's Disease: Insights From Data Mining and Enrichment Analysis. *Front Genet* 2019;10:846.
42. Tunissiolli NM, Castanhole-Nunes MMU, Biselli-Chicote PM, et al. Hepatocellular Carcinoma: a Comprehensive Review of Biomarkers, Clinical Aspects, and Therapy. *Asian Pac J Cancer Prev* 2017;18(4):863-872.
43. Kinney JW, Bemiller SM, Murtishaw AS, Leisgang AM, Salazar AM, Lamb BT. Inflammation as a central mechanism in Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement (N Y)* 2018;4:575-590.
44. Newcombe EA, Camats-Perna J, Silva ML, Valmas N, Huat TJ, Medeiros R. Inflammation: the link between comorbidities, genetics, and Alzheimer's disease. *J Neuroinflammation* 2018;15(1):276.
45. Heppner FL, Ransohoff RM, Becher B. Immune attack: the role of inflammation in Alzheimer disease. *Nat Rev Neurosci* 2015;16(6):358-372.
46. Keenan BP, Fong L, Kelley RK. Immunotherapy in hepatocellular carcinoma: the complex interface between inflammation, fibrosis, and the immune response. *J Immunother Cancer* 2019;7(1):267.
47. Bishayee A. The role of inflammation and liver cancer. *Adv Exp Med Biol* 2014;816:401-435.
48. Yu LX, Ling Y, Wang HY. Role of nonresolving inflammation in hepatocellular carcinoma development and progression. *NPJ Precis Oncol* 2018;2(1):6.
49. Garrido C, Paco L, Romero I, et al. MHC class I molecules act as tumor suppressor genes regulating the cell cycle gene expression, invasion and intrinsic tumorigenicity of melanoma cells. *Carcinogenesis* 2012;33(3):687-693.
50. Garrido F. MHC/HLA Class I Loss in Cancer Cells. *Adv Exp Med Biol* 2019;1151:15-78.
51. Axelrod ML, Cook RS, Johnson DB, Balko JM. Biological Consequences of MHC-II Expression by Tumor Cells in Cancer. *Clin Cancer Res* 2019;25(8):2392-2402.
52. Ciccocioppo F, Lanuti P, Pierdomenico L, et al. The Characterization of Regulatory T-Cell Profiles in Alzheimer's Disease and Multiple Sclerosis. *Sci Rep* 2019;9(1):8788.
53. Chitnis T, Weiner HL. CNS inflammation and neurodegeneration. *J Clin Invest* 2017;127(10):3577-3587.
54. Nataf S. Autoimmunity as a Driving Force of Cognitive Evolution. *Front Neurosci* 2017;11:582.
55. Baruch K, Rosenzweig N, Kertser A, et al. Breaking immune tolerance by targeting Foxp3(+) regulatory T cells mitigates Alzheimer's disease pathology. *Nat Commun* 2015;6:7967.
56. Guo P, Ma X, Zhao W, et al. TRIM31 is upregulated in hepatocellular carcinoma and promotes disease progression by inducing ubiquitination of TSC1-TSC2 complex. *Oncogene* 2018;37(4):478-488.
57. Yang Y, Wang H, Kouadir M, Song H, Shi F. Recent advances in the mechanisms of NLRP3 inflammasome activation and its inhibitors. *Cell Death Dis* 2019;10(2):128.
58. Yin J, Zhao F, Chojnacki JE, et al. NLRP3 Inflammasome Inhibitor Ameliorates Amyloid Pathology in a Mouse Model of Alzheimer's Disease. *Mol Neurobiol* 2018;55(3):1977-1987.
59. Danborg PB, Simonsen AH, Waldemar G, Heegaard NH. The potential of microRNAs as biofluid markers of neurodegenerative diseases-a systematic review. *Biomarkers* 2014;19(4):259-268.
60. Van Giau V, An SS. Emergence of exosomal miRNAs as a diagnostic biomarker for Alzheimer's disease. *J Neurol Sci* 2016;360:141-152.

61. Tan W, Liu B, Qu S, Liang G, Luo W, Gong C. MicroRNAs and cancer: Key paradigms in molecular therapy. *Oncol Lett* 2018;15(3):2735-2742.
62. Zhang ZQ, Meng H, Wang N, et al. Serum microRNA 143 and microRNA 215 as potential biomarkers for the diagnosis of chronic hepatitis and hepatocellular carcinoma. *Diagn Pathol* 2014;9:135.
63. Dong H, Li J, Huang L, et al. Serum MicroRNA Profiles Serve as Novel Biomarkers for the Diagnosis of Alzheimer's Disease. *Dis Markers* 2015;2015:625659.
64. Cheng L, Doecke JD, Sharples RA, et al. Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle (AIBL) Research Group. Prognostic serum miRNA biomarkers associated with Alzheimer's disease shows concordance with neuropsychological and neuroimaging assessment. *Mol Psychiatry* 2015;20(10):1188-1196.
65. Lai SW, Chen HJ, Lin CL, Liao KF. No correlation between Alzheimer's disease and risk of hepatocellular carcinoma in older people: an observation in Taiwan. *Geriatr Gerontol Int* 2014;14(1):231-232.
66. Estrada LD, Ahumada P, Cabrera D, Arab JP. Liver Dysfunction as a Novel Player in Alzheimer's Progression: Looking Outside the Brain. *Front Aging Neurosci* 2019;11:174.