

Cerrahi Birimlerde Yatan Hastalarda Uyku Kalitesi

The Sleep Quality of the Patients in Surgical Units

Ebru ÖNLER*, Aytül YILMAZ**

İletişim / Correspondence: Ebru Önler Adres / Address: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 100. Yıl Mah. Uğur Mumcu Cad. İtfaiye arkası Tekirdağ Tel: 0282 262 75 85/121 Fax: 0282 261 21 80 E-mail: ebru_onler@yahoo.com

ÖZ

Amaç: Araştırma, genel cerrahi birimlerinde yatan hastaların uyku kalitelerinin değerlendirilerek, uykularını etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.

Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Birimlerinde, yataşının en az birinci haftasını doldurmuş 164 hastaya, Kişiisel Bilgi Formu, Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenler Formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ) uygulanarak elde edilen veriler yüzdelik dağılım ve tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi.

Sonuç ve Öneriler: Hastaların uyku kalitelerinin sıklıkla ağrı, anksiyete, yapılacak girişimlerle ilgili yeterli bilgi verilmemesi ve çevredeki gürültülerden etkilendiği belirlenerek, ağrının giderilmesi için etkin ağrı kontrol yöntemlerinin kullanılması, hastaların hastalıkları ve yapılacak girişimlerle ilgili bilgilendirilmesi, hastaları dinlemek için zaman ayrılarak anksiyete düzeylerinin belirlenmesi ve anksiyete düzeyi yüksek olan hastaların profesyonel yardım almalarının sağlanması, gürültüye neden olan etmenlerin bir çalışmaya belirlenip, azaltılması ya da yok edilmesi önerildi.

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, cerrahi girişim, hemşirelik.

ABSTRACT

Purpose: This descriptive study was conducted for the purpose of determining the sleep quality and to examine factors that affect this quality.

Method: The study was carried out on 164 patients in İstanbul University İstanbul Medical Faculty. In collecting data, the below tools were made use of: a patient information form prepared separately in the light of literature, an information form of factors that affect sleep quality and Pittsburgh Sleep Quality Inventory. Percentage and One-way Anova were also made use of in analysing the data obtained from this study.

Results and Conclusion: It was determined quality of sleep was influenced by such factors as pain, anxiety, noise and not to give sufficient information about procedures. It was proposed to use effective pain control methods, give sufficient information to patients about procedures, determine to patients' level of anxiety and if it is so high, direct them for professional aid and determine factors that is the cause of noise in the hospital for reducing and existing them.

Key Words: Sleep quality, surgical, nursing.

GİRİŞ

İnsan; fiziksel, ruhsal, sosyal, entelektüel ve spiritiüel gereksinimleri ile bir bütündür. Sağlıklı olabilmesi için bu gereksinimlerin dengeli bir şekilde karşılanması gereklidir. Eğer bir gereksinim zamanında ve tam olarak karşılanmazsa hastalık/sorun ortaya çıkar. Hemşireliğin temel amacı; temel gereksinimlerini karşılayamayan bireye yardım etmektir. Günümüze kadar Nightingale, Maslow gibi birçok kuramçı, insanın temel gereksi-

nimleri üzerine değişik kuramlar ortaya koymuslardır (Akdemir 2003; Çakırcalı 2000a; Çakırcalı 2000b). İnsan yaşamının 1/3'ünü kapsayan, sağlık durumunun sürdürülmesinde önemli rol oynayan uyku, temel gereksinimler arasında yer almaktadır (Çakırcalı 2000b; Tosunoğlu 1997).

Bohr; uyku bireyin ruhunu, aklını ve bedenini yeniden şarj etmek için bir molaya gerek duyduğunda sorumluluk ve stresten arınma süreci olarak tanımlar. Uyku bilinen fakat açıklanamayan

*Araş. Gör. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

**İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

bir dinlenme durumudur. Yaşadığı sırada algılamayan yani bilincin farkında olmadığı süreçlerin, akıl dışı yaşıntıların, eylemlerin yerini eylemzsizliğin aldığı bir zaman diliminin yaşanmasıdır (Tosunoğlu 1997). Sağlık durumundaki bir bozulma kendini, uyku düzensizliği ile ortaya koyması gibi; uyku düzenindeki bir

bozulma da genel sağlık ve yaşam aktiviteleri üzerinde doğrudan etkiye yol açabilmektedir (Tosunoğlu 1997).

Birey, hasta olma ve hastaneye yatmaya bağlı artan stresle baş etmeye çalışırken, temel gereksinimlerini de karşılamak durumunda olduğundan normal uyku ve dinlenmenin sağlanması, sağlıkta sapma durumlarında daha çok önem taşır. Hastalığın yeni tanılanması ve hastanenin yeni bir çevre olması, ev ortamından ayrılmak, bakım ve tedaviler için erken uyandırılmak, erken saatte kahvaltı verilmesi, değişik kaynaklı gürültüler, ağrı, kalabalık ve benzeri durumlar normal uyku sürecini bozduğundan, çoğu hasta birey hastaneye yatışlarının ilk günlerinde regresif davranışlar gösterebilir (Akdemir 2003; Doğan, Ertekin ve Doğan 2005; Ertekin 1998; Tosunoğlu 1997). Hasta uyuduğu ve dinnendiği zaman her şey kontrolü altında, huzur ve güven duygusu içinde olduğunu hisseder, yardıma gereksinimi olduğunda da yardım edileceği güvencesiyle hastalığının seyrini değerlendirebilir. İnsanların yaklaşık 1/3'inin uyku sorunu olduğu ve hasta bireylerde ise bu oranın arttiği bilindiğinden dolayı, öncelikle hastaların uykularını etkileyen etmenlerin saptanarak, çözüm üretmesi yoluna gidilmesi gerektiği düşünülmektedir (Tosunoğlu 1997).

Hastaların uyku düzenini etkileyen başlıca etmenler: Ağrı, uyku bozukluğunda en kuvvetli etmendir. Ağrı uyku döneminde değişikliğe neden olurken, uykusuzlukta ağrıya karşı toleransı azaltmaktadır.

Stres ve Anksiyete: Hasta birey hastalığın fiziksel etkileriyle baş etmeye çalışırken, bir yandan da hastalığı nedeniyle birçok işlemle karşılaşmaktadır ve sürekli bilinmeyenlerle yüzüze gelmekte-

dir.. Stres içindeki birey, uykuya dalmakta zorlanmakta ve mental dinlenme sağlanamamaktadır. Hastane ortamında psiko-fizyolojik iyileşme gereksinimi olan bireyin, stres ve anksiyetesinin giderilmesi önemlidir.

Gürültü: Hastane ortamında diğer hastaların çıkarıldığı sesler, ayak sesleri, telefon sesi, sağlık personeli sesi, kapı-pencere,pansuman arabası ve benzeri araç-gereçlerin çıkardığı sesler gibi birçok etken hasta birey için önemli bir stresör olan gürültüye neden olmakta ve kontrol altına alınamamaktadır.

Ayrıca odanın kalabalık olması, yatağın temiz ve düzenli olmaması, gece ışığın açık olması, odanın sıcak ya da soğuk olması, uyku saatinde yapılan tıbbi ya da hemşirelik uygulamaları, sağlık çalışanlarının uyku saatinde odaya giriş-çıkışı, yapılacak girişimler ve hastalık ile ilgili yeterli bilgi verilmemesi neden olarak sıralanabilir (Doğan ve ark 2005; Ertekin 1998; Tosunoğlu 1997).

Cerrahi servisinde yatan hastaların ağrı, hastalıkla ilgili kaygıları, cerrahi girişim sonrası bilinmeyenlerle karşılaşmaları, cerrahi girişim sonrası pozisyon kısıtlılığı gibi nedenlerle uyku kalitelerinin düşük olduğu belirtilmektedir (Akdemir 2003).

Hastaların uyku gereksinimlerinin karşılanması etki eden etmenlerin saptanıp ortadan kaldırılması ve normal uyku sürecinin sağlanması, bağımsız hemşirelik işlevleri arasındadır (Akdemir 2003). Hastanede yatan hastaların uykusıyla ilgili sorunları ve hemşirelerin bu sorunlara ilişkin tutumları ile ilgili Kara'nın yaptığı araştırmada; hastaların uyku problemini çözmede hemşirelerin, % 11.8'sinin kendilerini yeterli, % 68.2 'sinin yetersiz, % 20'sinin kısmen yeterli gördüklerini saptamıştır (Kara 1996). Temel hemşirelik girişimleriyle kontrol altına alınabileceği açık olan uykunun, yeterince sağlanıp sürdürülüğünü söylemek olası değildir (Akdemir 2003). Çalışma bir üniversitede hastanesinin, genel cerrahi birimlerinde yatan hastaların uyku kalitelerinin değerlendirilecek, uykularını etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Birimlerinde Haziran 2004 ile Mayıs 2005 tarihleri arasında, serviste yatişının en az birinci haftasını doldurmuş, basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilen, araştırmaya katılmaya gönüllü 164 hastaya gerçekleştirilmiştir.

Veriler Kişisel Bilgi Formu, Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenler Formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ) uygulanarak elde edilmiştir. Veri formları, hastalar bilgilendirildikten ve izinleri alındıktan sonra yüz yüze uygulanmıştır.

Bilgi formu; hastanın yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, medeni durumu, gelir düzeyi, hastalığı hakkında bilgisinin olup olmadığı, ameliyat olup olmadığı, uyku sorunu olduğunda kime iletiştiği gibi soruları içermektedir.

Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ); 1989 yılında Buysse ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, geçmiş 1 aylık sürede uyku kalitesi ve bozukluğunu değerlendiren bir özbildirim ölçeği olup, Türkiye'de geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Ağargün, Kara ve Argun tarafından 1996 yılında yapılmıştır. Ölçek toplam 24 soru içerir, bu soruların 19'u kendini değerlendirme sorusu; 5 tanesi ise bireyin es ya da oda arkadaşı tarafından yanıtlanacak olan sorulardır. Bu 5 soru yalnız klinik bilgi için kullanılır ve puanlamaya katılmaz. Kendini değerlendirme sorularından 19. soru bir oda arkadaşının ya da eşin bulunup bulunmadığıyla ilgilidir ve ölçegin toplam ve bilesen puanlarının saptanmasında dikkate alınmaz. Kendini değerlendirme soruları, uyku kalitesi ile ilgili değişik etkenleri içerir. Bunlar uyku süresini, uyku latensini ve uyku kalitesi ile ilgili özel sorunların sıklık ve şiddetini saptamak için dir. Puanlanan 18 madde 7 bilesen puanı şeklinde gruplandırılmıştır. PUKÖ' nün 7 bileseni şu şekilde sıralanabilir: Öznel uyku kalitesi (bileşen1), uyku latensi (bileşen 2), uyku süresi (bileşen 3), alışılmış uyku etkinliği (bileşen 4), uyku bozukluğu (bileşen 5), uyku ilaçlı kullanımı

(bileşen 6) ve gündüz işlev bozukluğu (bileşen 7). Bileşenlerin bazıları tek bir maddeden oluşmakta, bazıları birkaç maddenin grupperlendirilmesiyle elde edilmektedir. Her madde belirti sıklığına göre, 0-3 arasında puanla değerlendirilir. Puanlama, geçen ay boyunca hiç olmamışsa 0, haftada birden az ise 1, haftada bir ya da iki kez ise 2, haftada üç ya da daha fazlaysa 3 olarak yapılmaktadır. Bu bilesen puanlarının toplamı ölçek puanını verir. Toplam puan 0-21 arasındadır. Toplam puanın 5 ve üzerinde olması uyku kalitesinin kötü olduğunu göstermektedir. Ölçek uyku bozukluğu olup olmadığını ya da uyku bozukluklarının yaygınlığını göstermez (Çölbay ve ark 2007; Doğan ve ark 2005; Ertekin 1998; Uran 2001).

Uykuyu Etkileyen Etmenler Formu; hastanın uykusunu etkileyen etmenler yatak, ışık, ısı, gürültü gibi çevresel etmenler, hastalığı hakkında yeterli bilgi verilip verilmemesi, kaygı düzeyi gibi psikolojik etmenler olarak ele alınmıştır (Tosunoğlu 1997). Veriler; t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilerek değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya katılan hastaların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 1); hastaların %50,6'sı kadın %49,4'ü erkek, %59,8'i 50 yaş ve üzeri, %70,7'si evli, %46,3'ü ilköğretim mezunu, %40,2'si ev hanımı, %27,4'ü emekli, % 78'inin hastalığı hakkında bilgisi var, %89,5'i bilgiyi hekimden almış, %74,4'ü ameliyat olmuş, %64'ü orta halli ve %37,2'sinin uyku sorununu hemşireye传递 etti belirlenmiştir

Hastaların uyku düzenlerinin; yattıkları yatak ve yastıktan (%56,1 ve %54,8), odanın havasız (%63,4), fazla ışıklı (%53) ve kalabalık olmasından (%62,2), ağrından (%81,7), vücuda takılı tıbbi cihazlardan (%70,1), hastalıkları ile ilgili kaygıları olmasından (%73,8), yapılacak girişimler ile ilgili yeterli bilgi verilmemesinden (%65,9), evlerindekileri ya da işyerlerini düşünmekten (%60,4), çevredeki gürültülerden (%64,9),

gündüz yapacak faaliyet olmaması ve sürekli yattıktan (%57,5) etkilendiği, yatak takımlarının kirli ve düzensiz oluşundan (%54.8), odanın karanlık olmasından (%75,6), odada yalnız olmasından (%69,5), yanında refakatçi olmasından (%78), odaya sık sık girilip çıkışmasından (%49,4) uyku saatlerinde yapılan girişim ve tedavilerden (%59,4), çok aç yada çok tok olmaktan (%53), kendilerini güvende hissetmemekten (%68,5), uyku öncesi alışkanlıklarını uygulayamamaktan (%58,3), hastanenin uyuma ve uyanma saatlerinden (%69,8) etkilenmediği saptanmıştır (Tablo2).

Araştırma kapsamına alınanların, hastaların hastalık öncesi ve sonrası ölçekteki puan ortalamaları arasındaki ilişki, gürültüden etkilenme durumuna göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı ($p<0.05$), ağırda etkilenme durumuna göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı ($p<0.05$) bulunmuştur. Cerrahi girişim sonrasında hastanın bedenine uygulanan tıbbi cihazlardan ($p<0.05$) ve hastalığıyla ilgili kaygılarından ($p<0.05$) uyku kalitesinin etkilendiği bulunmuştur.

Tablo 1.Hastaların Sosyo Demografik Özelliklerinin Dağılımı

DEĞİŞKEN		SAYI (=n)	%
CİNSİYET	Erkek	81	49.4
	Kadın	83	50.6
YAŞ	18-29	13	7.9
	30-39	29	17.7
	39-49	24	14.6
	50 ve üzeri	98	59.8
MEDENİ DURUMU	Evli	116	70.7
	Bekar	16	9.8
	Dul - Boşanmış	32	19.5
EĞİTİM DURUMU	Okuryazar değil	17	10.4
	Okur yazar	9	5.5
	İlköğretimim	76	46.3
	Ortaöğretimim	45	27.4
	Yüksekoktetim	17	10.4
İŞ MEŞGULİYET DURUMU	İşsiz	3	1.8
	Ev hanımı	66	40.2
	Memur	10	6.1
	İşçi	15	9.1
	Esnaf	5	3.0
	Çiftçi	6	3.7
	Emekli	45	27.4
	Diğer	14	8.5
HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ	Var	128	78
	Yok	36	22
HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİYİ VERENLER	Hekim	119	89.5
	Hemşire	14	10.5
	Aile/Hasta yakını	31	18.9
AMELİYAT OLMA DURUMU	Evet	122	74.4
	Hayır	42	25.6
GELİR DURUMU	İyi	36	22
	Orta	105	64
	Kötü	23	14
UYKU PROBLEMİNİ İLETME DURUMU	Hemşire	61	37.2
	Hekim	32	19.5
	Refakatçi	52	31.7
	Diğer	19	11.2

Tablo 2 .Hastaların Uykularını Etkileyen Etmenlerden Etkilenme Derecelerine Göre Dağılımı

	Hiç Etkilemiyor		Etkilemiyor		Kararsızım		Etkiliyor		Çok Etkiliyor	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Yatağın rahatsız edici olması	37	22,6	28	17,1	7	4,3	62	37,8	30	18,3
Yastığın rahatsız edici olması	40	24,4	34	20,7	—	—	56	34,1	34	20,7
Yatak takımlarının rahatsız edici olması	47	28,7	49	29,9	—	—	43	26,2	25	15,2
Odanın havasız olması	38	23,2	16	9,8	6	3,7	65	39,6	39	23,8
Odanın fazla ışıklı olması	43	26,2	34	20,7	54	32,9	33	20,1	—	—
Odanın karanlık olması	55	33,5	69	42,1	11	12,1	20	12,2	9	5,5
Odanın kalabalık olması	27	16,5	24	14,6	11	6,7	59	36	43	26,2
Odada yalnız olması	51	31,1	63	38,4	8	4,9	30	18,3	12	7,3
Yanında refakatçi olması	55	33,5	73	44,5	8	4,9	20	12,2	8	4,9
Odaya sık girilip çıkışması	26	15,9	44	26,8	13	7,9	45	27,4	36	22
Uyku saatinde yapılan girişim ve tedaviler	29	17,7	52	31,7	10	6,1	34	20,7	39	23,8
Ağrısının olması	8	4,9	13	7,9	9	5,5	63	38,4	71	43,3
Vücutunda takılı tıbbi cihazlar olması	12	7,3	26	15,9	11	6,7	65	39,6	50	30,5
Çok aç ya da tok olmak	42	25,6	45	27,4	5	0,3	52	31,7	20	12,2
Hastalığı ile ilgili kaygılarının olması	5	0,3	31	18,9	7	4,3	73	44,5	48	29,3
Yapılacak girişimler ve hastalığı ile ilgili yeterli bilgi verilmemesi	8	4,9	2917,1	17,7	19	11,6	77	47	31	18,9
Kendini güven ve emniyette hissetme	42	25,6	54	32,9	6	3,7	41	25	21	12,8
Çevredeki gürültüler	19	11,6	44	26,8	11	6,7	53	32,3	37	22,6
Gündüzleri yapacak faaliyet olmaması,sürekli yatmak	33	20,1	40	24,4	13	7,9	54	32,9	24	14,6
Uyku öncesi alışkanlıklarını uygulayamamak	48	29,3	48	29,3	7	4,3	49	29,9	12	7,3
Hastanenin uyuma ve uyanma saatleri	41	25	57	34,8	8	4,9	38	23,2	20	12,2

Tablo 3. Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenlere Göre Uyku Kalitesi Ortalama Puanları

	Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenler	Ortalama	Std. Sapma	t	p
³ OPUKO1	Ağrı	1982	4712	3,339	001
⁴ OPUKO2	Gürültü	.1809	4406	2,989	004w
OPUKO1-OPUKO2	Cihazlar	.2287	4053	4,550	000
OPUKO1 OPUKO2	Kaygı	.1887	,4207	3,834	000

³ OPUKO1: Son bir hafta içinde Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği'nden Alınan Ortalama Puan

⁴ OPUKO2: Hastalık Öncesi Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği'nden Alınan Ortalama Puan

TARTIŞMA

Kara'nın yaptığı çalışmada, hastaların %40,9'unun uyku sorununu kimseye iletmemişti, %29,9'unun hekime ve %29,2'sinin hemşireye ilettiği görülmektedir. Çalışmamızda ise hastaların %37,2'sinin uyku sorununu hemşireye ilettiği saptandı. Elde edilen bu sonuç, hemşirelerin çalışma sürelerinin büyük bir bölümünü hasta yanında ve onlarla birlikte geçirmelerine bağlanabilir.

Çalışmada hastaların uykularını etkileyen etmenlerden etkilenme durumuna göre dağılımı incelenliğinde (Tablo 2); hastaların % 56,1'i yataktan uyku düzenlerinin etkilendiği yanıtını verdi. Bu sonuç Tosunoğlu'nun hastanede yatan yetişkin hastaların uyku gereksinimlerini etkileyen etmenleri incelediği, çalışmasındaki %60 etkilemiyor yanıyla uygunluk göstermemektedir. Hastaların % 34,1'i yastığın rahatsız olmasından etkilenmemişlerdir. Tosunoğlu'nun çalışmada hastalar %64,5 etkilenmemiştür yanıtını vermişlerdir. Bu sonuç, bize cerrahi servisinde yatan hastaların ameliyat sonrası, pozisyon kısıtlılığına bağlı olarak daha fazla yataklarında kalma-

larından etkilendiklerini düşündürmektedir.

Hastalar yatak ve yastıktan etkilenmelerine karşın, yatak takımlarının kirli ve düzensiz oluşandan %29,9'u etkilenmemiştir, %28,7'si hiç etkilenmemiştir yanıtını verdi. Tosunoğlu 'nun çalışmasında %65 etkilenmemiştir cevabını vermiştir. Uyku düzenlerinin odanın havalandırılması ile ilişkisi incelenliğinde %39,6 etkiliyor, %23,8 çok etkiliyor yanıtı, uyku düzenlerinin odanın havalandırılmasından etkilendiğini düşündürmektedir.

Hastaların odanın fazla ışıklı olmasından %32,9 etkilenmemiştir, %20,1 çok etkilenmemiştir yanıtı; çoğunu ışıktan etkilendiğini göstermektedir.

Hastaların uyku düzenlerinin karanlıktan etkilenme durumu incelenliğinde %42,1 etkilenmemiştir, %33,5 hiç etkilenmemiştir yanıtını verilmesi; hastaların çoğunu uyumak için karanlığı tercih ettiğini göstermektedir.

Hastaların uyku düzenlerinin odanın kalabalık olması ile ilişkisi incelenliğinde; %36'sının etkilenmemiştir, %26,2 sinin çok etkilenmemiştir yanıtını hastaların kalabalık nedeniyle uyku düzenlerinin değiştiğini göstermektedir.

Hastaların uyku düzenlerinin odada yalnız olmalarından etkilenme durumu incelenliğinde ; %38,4'ünden etkilenmemiştir, %31,1'inden hiç etkilenmemiştir yanıtının alınması, hastaların uyumak için sessiz sakin bir ortam tercih ettiğini kanıtladır.

Uyku düzenlerinin, hasta yakınının olmasından etkilenme durumu incelenliğinde ; %44,5'inin etkilenmediklerini %33,5'inin hiç etkilenmediklerini belirtmesi; yabancı ve yardıma gereksinim duyulan bir ortamda hasta bireyin yanında tanık birinin olmasının rahatlatıcı olduğunu göstermektedir.

Hastaların odaya sık sık girilip çıkışlarından; hastaların %27'sinin etkilendiği %22'sinin çok etkilendiği yanları, çoğunu uyku düzeninin uyku saatinde yapılan girişim ve tedavi için odaya sık sık girilip çıkışlarından etkilendiği ni göstermektedir. Tosunoğlu'nun (1997) yaptığı çalışma

da hastaların %62 si etkilenmeyorum yanıtını vermiştir. Bu bize cerrahi servisinde hastaların uyku saatinde daha sık tedavi ve takip amaçlı odalara girme zorunluluğu nedeniyle olabileceğini düşündürmektedir.

Uyku saatinde yapılan girişim ve tedavilerden; hastaların %31,7'sinin etkilenmeyorum, %17,7'sinin hiç etkilenmeyorum yanıtına karşılık, %23,8'i çok etkilenmeyorum yanıtı verdi. Tosunoğlu (1997) ve Kara'nın (1996) araştırma sonucu ile uyumlu olan bu sonuç, anketi uygulayan kişilerin hastanın tedavisini uygulayan hemşire olmasından dolayı, hastaların bu durumdan etkilenip gerçek düşüncelerini aktardıklarını düşündürmektedir.

Hastaların uyku durumlarının ağrından etkilenme durumu incelendiğinde; Tosunoğlu (1997) ve Kara'nın (1996) araştırma sonuçları ile uygunluk gösterdiği görülmektedir. Hastaların %43,3 ü çok etkiliyor, %38,4'ü etkiliyor yanıtını vermiştir.

Hastaların bedenlerinde bulunan tıbbi cihazlardan etkilenme durumu incelendiğinde; %39,6 etkiliyor, %30,5'i çok etkiliyor yanıtını verdi. Bu sonuçta hastaların çögünün, bedenlerindeki cihazların uyku düzeninde değişikliğe neden olduğunu göstermektedir.

Çok aç yada tok olmaktan hastaların; %43,9'unun etkilenmeyorum yanıtına karşılık, %53,0'ı etkilenmeyorum yanıtı verdi. Hastaların %43,9'unun etkilenmesi de hastaların uzun süre oral yoldan beslenememesi, hastanedeki yemek saatlerinin farklı olması ya da akşam yemeklerinin erken dağıtıması gibi nedenlere bağlanabilir.

Hastaların hastalıkları ile ilgili kaygılarından dolayı uyku düzenlerinin etkilenme durumu incelendiğinde; %44,5'i etkilenmeyorum, %29,3'ü çok etkilenmeyorum yanıtlarını verdiler. Bu sonuç Kara (1996) ve Tosunoğlu'nun (1997) araştırma sonuçları ile benzerdir. Hastaneye yatan bireylerin işsel ve çevresel olarak birçok sorunla baş etmeye çalışması, hasta rolüne girmesi, hastalığının seyri ve sağlığına kavuşma konusunda kaygısının olması gibi durumlar, uyku sürecini bozmaktadır.

Uyku düzenlerinin yapılacak girişimler ve hastalıkları konusunda yeterli bilgi verilmemesinden %47'si etkilenmeyorum yanıtını verdi. Bu sonuç yapılacak tüm girişimler öncesinde, hastaya bilgi vermenin uyku düzenini olumlu etkilemesinin yanısıra, hasta hakları açısından sağlık ekibinin önemli bir görevi olduğunu vurgulamaktadır..

Hastaların kendilerini güven ve emniyyette hissetme durumları ile uyku durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; %32,9'u etkilemiyor yanıtı verdi. Bu hastaların hastane ortamını güvenlik ve emniyet yönünden tedirgin edici bir ortam olarak görmediklerini göstermektedir.

Hastaların çevredeki gürültülerden etkilenme durumu incelendiğinde; %32,3'ü etkilenmeyorum, %22,6'sı çok etkilenmeyorum yanıtı verdi. Gürültü, hastane ortamında daha da önem kazanmaktadır. Hasta bireylerin çevrelerindeki tolere edebilecekleri gürültü seviyesi, sağlıklı durumlarındaki gürültü seviyesinden daha düşük olmasına karşın, hastanedeki gürültü seviyesi sıklıkla hastayı olumsuz etkileyerek düzeyin üzerine çıkmaktadır. Araştırmamızın sonucu Kara'nın (1996) ve Tosunoğlu'nun (1997) sonuçlarıyla uyumludur. Bu sonuç da hastanede gürültüye neden olan çeşitli etmenlerin olduğunu ve bunların uyku etkilediğini gösterir.

Hastaların gündüzleri yapacakları faaliyetleri nin olmaması ve sürekli yatmaktan etkilenme durumu sorgulandığında; %32,9'unun etkilenmeyorum yanıtını vermesi hastaların çögünün etkilendiğini göstermektedir. Hem gece hem de gündüz yataktakalmanın uyku düzenini etkilemesi doğaldır. Hastalar için gündüz uyanık kalmalarını sağlayacak bazı aktivitelerin planlanması önemlidir.

Hastaların uyku öncesi alışkanlıklarını uygulayamamaktan etkilenme durumu incelendiğinde; %29,9'unun etkilenmeyorum yanıtına karşılık %29,3'ü etkilenmeyorum ve %29,3 hiç etkilenmeyorum yanıtı verdi. Bu sonuç da hastaların, hastanede uyku öncesi alışkanlıklarını yapabildiğini göstermektedir.

Hastaların uyku düzeninin hastanenin uyuma ve uyanma saatlerinden etkilenme durumu incelendiğinde; %25'i hiç etkilenmiyorum, %34.8'i etkilenmiyorum yanıt verdi. Bu sonuç, hemşirelerin hastaların uyuma uyanma saatlerine uygunluk gösterdiğini ya da hastaların hemşirelerin çalışma düzene uyum sağladığını düşündürmektedir. Bu sonuçta Tosunoğlu'nun (1997) araştırma sonucuya uyumludur. Hastalık sonrası hastaların gürültüden etkilenme durumu puan ortalamalarıyla, hastalık öncesi gürültüden etkilenme durumu puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0.05$).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonucunda; hastaların uyku düzenlerinin, sıkılıkla ağrından, hastalıklarıyla ilgili kaygıları olmasından, bedenlerine takılı tıbbi cihazlardan ve çevredeki gürültülerden etkilentiği bulundu. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; hastaların hastalıkları ve yapılacak girişimlerle ilgili bilgilendirilerek, bunun stres kaynağı olup uyku düzenini etkilemesinin önlenmesi, bir araştırmaya gürültüye neden olan etmenlerin belirlenip yok edilmesine ya da azaltılmasına çalışılması, hastanın tedavi ve bakım girişimlerinin uyku düzeneinde değişikliğe neden olmayacak şekilde planlanması, eski yatakların yenilenmesinin sağlanması, yastıkların hastanın tercihine göre olmasının sağlanması, hastaları dinlemek için zaman ayrılarak, yaşadıkları stres düzeyinin değerlendirilmesi ve azaltılmaya çalışılması, anksiyete düzeyi yüksek hastaların profesyonel yardım almasının sağlanması, uyku düzenini en fazla etkileyen etmen olan ağrının giderilmesi için etkin farmakolojik ve farmakolojik olmayan ağrı kontrol yöntemlerinin kullanılması önerildi.

KAYNAKLAR

Ağargün, M. Y., Kara, H. Anlar, Ö. (1996). Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi'nin geçerliliği ve güvenirliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 7(2).

Akdemir, N. (2003). Dinlenme-Uyku ve Düzensizlikleri. Akdemir, N., Birol, L. (Eds). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 1.baskı, Ekin Tıbbi Yayıncılık Ltd.Şti., Perspektif Matbaası, İstanbul, 129-139.

Çakırçalı, E. (Ed.) (2000a). Sağlık ve hemşirelik. Hasta Bakımı ve Tedavisinde Temel İlkeler ve Uygulamalar. 3. Basım, EÜ. Basımevi, İzmir, 1-5.

Çakırçalı, E. (Ed.). (2000b). Uyku ve dinlenme. Hasta Bakımı ve Tedavisinde Temel İlkeler ve Uygulamalar. 3. Basım, EÜ. Basımevi, İzmir, 25-36.

Çölbay, M. ve ark (2007). Hemodiyaliz hastalarının Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksiyle değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 55(2): 167-173.

Doğan, O., Ertekin, Ş., Doğan, S. (2005). Sleep quality in hospitalized patients. Journal of Clinical Nursing; 14, 107-113.

Ertekin, Ş. (1998). Hastanede yatan hastaların uyku kalitesinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Kara, M. (1996). Hastanede yatan hastaların uyku ile ilgili sorunları ve hemşirelerin bu sorunlara ilişkin tutumları. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Tosunoğlu, A. (1997). Hastanede yatan yetişkin hastaların uyku gerekliliklerini etkileyen etmenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Uran, G. (2001). Kırsal kesimde evde ve huzurevlerinde kalan 60 yaş üzeri yaşlılarda Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksiyle uyku kalitelerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çalışmaya katkılarından dolayı başta Hem. Hatice Çebişli ve Hem. Nilüfer Pusat olmak üzere tüm İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. hemşirelerine teşekkür ederiz.