

Elazığ'da 1990 - 1992 yıllarındaki cinsel suçların incelenmesi

Dr.H.Ergin DÜLGER*

Incelediğimiz, Cinsel saldırıya maruz kalan 55 olgunun % 92.7'si kadın %7.3'ü erkek olup, yaş ortalaması 15.5'ti. Olguların % 55'i hymen, % 29'u gebelik, % 9'u livata muayenesi için gönderilmişti. Hymen muayenesi yapılan olguların % 40 'ında zarda deflorasyon olmadığı, deflora olgularda; zarın en çok saat kadranına göre 6 hizasında yırtıldığı saptanmıştır. Olguların % 90.9 'u Devlet Hastanesi tarafından muayene ve rapor edildi. [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1(4):285-287,1994]

Anahtar Kelimeler: Cinsel suç, kızlık zarı, adli rapor

Evaluation of sexual assaults in Elazığ, during 1990-1992

On fifty five sexual assult cases, the finding was that of victims 92.7% female, average age was 15.5. The cases seen were 55% of hymen, 29% of pregnancy, 9.1 % of anal intercourse. 7 % of hymen and anal intercourse. Hymenal defloration was not seen on 40 % of these cases. The ruptures around six were mostly seen in the cases of hymenal defloration. Nearly all of sexual assault cases (90.9 %) were taken by the State Hospital. [Journal of Turgut Özal Medical Center 1(4):285-287,1994]

Key Words: Sexual assault, hymenal defloration, forensic report.

Cinsel saldırılar; insan temel hak ve özgürlüklerine, bireysel özerkliğine ve bütünlüğüne yönelmiş, en ağır ve en yüz kızartıcı fiziksel saldırılar olarak tanımlanmaktadır¹. Bunlar Adli Tıp'da ve toplumda önemli bir yer tutmakta^{2,3}, ülkemizde ve dünyada güncelliğini korumaktadır¹. Örneğin ABD'de cinsel saldırı prevalansı % 25'dir⁴. Ayrıca; cinsel temas sonucu geçen hastalıkların (gonore, HIV enfeksiyonu v.s.) bu yolla da yayılabildiği^{2,5,6}, cinsel saldırıların her zaman yabancı biri değil, akraba gibi tanınan, bilinen biri tarafından da gerçekleştirilebildiği bilinmektedir^{1,3,7}.

YÖNTEM

Elazığ'da 1990-1992 yılları arasındaki üç yıllık periyotta, Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), F.Ü. Araştırma ve Uygulama ve Askeri hastane olmak üzere adli rapor vermeye yetkili 4 kamu hastanesince verilmiş kati adli raporların arasından cinsel suçlar kavramı içinde değerlendirilen 55 olgunun adli rapor özeti çıkartılarak incelenmiştir.


BULGULAR

Cinsel suçlar kavramı içinde değerlendirilen 55 olgunun 51'i (% 92.7) kadın, 4'ü (% 7.3) erkek, yaş ortalaması 15.5'ti.

Olguların 30'u (% 55) kızlık zarı (hymen, kızlık) muayenesi için gönderilmiştir (Şekil 1). Bunların 12'sinde (% 40) zarda yırtık (deflorasyon) tesbit edilmemiştir. Hymende deflorasyon tesbit edilen 18 olgunun (% 60) biri yeni, diğerleri eski yırtıktı. Bir olguda da kısmi yırtık varlığı saptandı. Yırtıkların yeri, litotomi pozisyonunda saat kadranına göre; 7 olguda (% 38.9) "6" hizasında, 2 olguda (% 11.1) "7" hizasında, 5 olguda (% 27.8) ise iki yerde tesbit edilmiştir. İki yerinde deflorasyon olan zarlarda yırtıklar; 5 ve 7, 6 ve 9, 6 ve 8, 7 ve 8, 10 ve 12 hizalarındaydı. Dört olguda (% 22.2) deflorasyon lokalizasyonu belirtilmemiştir.

Olguların % 29'u (16) gebelik muayenesi için gönderilmişti (Şekil 1). Bunların 8'inde gebelik tespit edilmemiş, diğer 8'inde ise; 2-9 aylığa kadar değişen sürelerde hamilelik tespit edilmiştir.

* : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - Elazığ



Şekil 1. Olguların muayene sebeplerine göre dağılımı

Şekil 1'de görüleceği gibi, 5 olgu (% 9) livata muayenesi için gönderilmişti. Bunlardan sadece bir erkek ve bir kadında livataya delalet eden maddi bulgu saptanmıştır. Kızlık ve livata muayenesi için gönderilen 4 olguda (% 7) ise deflorasyona veya livata bulgularına rastlanmamıştır.

Hastanelere dağılım incelendiğinde; büyük çoğunluğun 50 olgu (% 90.9) ile Devlet hastanesinde yoğunlaştığı, Araştırma'nı 4 (% 7.3) ve Askeri Hastane'nin 1 (% 1.8) olgu ile Devlet Hastanesini izlediği görülmektedir. SSK Hastanesinde cinsel saldırı olgusuna rastlanmadığı saptanmıştır.

TARTIŞMA

Bu çalışmada deflore olgular (% 60), bakire olanlardan (% 40) fazla bulunmuştur. Özkök ve ark.ları ise bunun aksine, hymeni % 53.9 oranında intakt, % 46.1 oranında deflore bulunmuştur². Karadeniz ve ark⁸.larının bildirdiği intakt hymen oranı (% 72.7) da bizimkinden yüksektir. İki olgu (% 16.7) "dühule müsait zar" olarak değerlendirilmiş, yırtık tespit edilmeyen olgular içinde değerlendirilmiştir. Diğer araştırmacılar tarafından yırtık tespit edilmeyen olgular içinde değerlendirilen vakaların, % 22.9 ve % 34 oranında bulunduğu bildirilmektedir^{2,8}. Bu tür kızlık zarları normal cesametteki penis ve benzeri cisimlerle yırtılmazlar ve bunlar raporlarda; "anatomik anlamda bakire, dühule müsait zar" olarak belirtilirler.

Kızlık zarının tek yerden deflore olduğu olgularda "6" ve "7" hizaları, en yüksek oranlarda (sırayla: % 38.9 ve % 11.1) yırtık rastlanılan lokalizasyonlardır. Bu bulgular ile tamamen uyumlu olarak; hymenin 5, 6, 7 hizalarında, en çok da "6" hizasında yırtıldığı belirtilmektedir^{2,9}. İki yerde

lokalizasyonlar ise; Özkök ve ark².larının bulgularına benzemektedir. O halde izlendiği gibi 6 hizası ve civarı her zaman yırtık açısından daha dikkatli incelenmelidir.

Yeni yırtık görülen bir olgu (% 65.6) dışında, 17 olguda (% 94.4) zarda eski yırtık tesbit edilmiştir. Bu da incelenen kaynaklar^{2,8} ile benzerlik göstermektedir.

Cinsel saldırı sonucu gebeliğin de oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Şekil 1'de görüldüğü gibi, gebelik; cinsel suçlar için muayeneye gönderilen olgular arasında ikinci sırada (% 29) gelmektedir.

Devlet Hastanesi olguların % 90.9'unun muayenesini yaparak, raporunu düzenlemiştir. Buna neden olarak adli makamların çoğunlukla cinsel suç olgularının raporlarını bu hastaneden istemeleri gösterilebilir.

Cinsel saldırı sonucu mağdurelerde; uzun süreli korku, anksiyete depresyon, utangaçlık, günlük fonksiyonların yapılmasında güçlük, özsaygı azalması, psiko-sosyal disfonksiyon ve birtakım somatik şikayetler görülmektedir^{3,4,10,11}. Bu yönü ile cinsel suçlar, adli tabiblerin yanında diğer hekimleri de ilgilendirmektedir. Dolayısıyla onların da dikkatlerinin bu konuya çekilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Polat O, Topaloğlu Ş, Kesim NZ. Cinsel suçlarda psikososyal faktörlerin araştırılması. 1. Adli Bilimler Kongresi, Adana (1994) Poster sunusu.
2. Özkök SH, Katkıcı U, Örsal M. Hymen muayene bulguları: 89 olgunun retrospektif incelenmesi. 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Poster Sunuları Kitabı.1993;63-8.
3. Yavuz MF, Öz H. Çocuklara yönelik cinsel suçlar. 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Poster Sunuları Kitabı.1993;357-64.
4. Sebwartz II. Sexual viyolence against women: prevalence, consequences, societal factors, and prevention. Am J Prtev Med 1991;7:363-73.
5. Rambow B, Adkinson C, Frost TH, Petorson GF. Female sexual assault:medical and legal implications. Ann Emerg Med 1992;21:727-31.
6. Zierler S, Feingold L, Laufer D, Velentgas P, Kantrowitz-Gordon I, Mayer K. Adult survivors of childhood sexual abuse and subsequent risk of HIV infection. Am J Puplic Health 1991;81:572-5.
7. Bewres TT, O' Gormen EC, Sayers A. Rape - a

Dülger HE.

Elazığ'da 1990 - 1992 yıllarındaki cinsel suçların incelenmesi

deflorasyon tesbit edilen olgularda (% 27.8) görülen

- comparison of stranger and acquaintance assaults. Med Sci Law 1991;31:102-9.
8. Karadeniz Z, Hancı İH, Gövsa F, Arısoy Y, Yavuz C, Ege B. Kızlık zarları. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya. Poster Sunuları Kitabı 1993;343-8.
9. Slaughter L, Rawn CRV. Colposcopy to establish physical findings in rape victims. Am J Obstet Gynecol 1992;166:83-6.
10. Mackey TF, Hacker SS, Weissfeld LA, Ambrose NC, Fisher MG, Zobel DL. Comparative effects of sexual assault on sexual functioning of child sexual abuse survivors and others. Issues Mend Health Nurs 1991;12:89-112.
11. Wivell F. Alleged sexual assault. Aust Fam Physician 1991;20:399-401.

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr.H.Ergin DÜLGER
F.Ü. Adli Tıp ABD Bşk.
Tlf: 0-424-2128500/3396
23159 ELAZIĞ