

Bilgisayar Destekli Eğitim Kurslarının Oluşturulması

Novruz BEŞİROV¹, Ali Rıza KUL¹, Aynurra BEŞİROVA²

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van

²QAFQAZ Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bakü

Özet

Bu çalışmada bilgisayar destekli eğitim kurslarının (BDEK) oluşturulması ve öğretme-öğrenme etkinliklerinde kullanılmasının çok yararlı olduğu gösterilmiştir. Bu tür kurslar herhangi bir dersin bilgisayara öğretilmesi için gerekli olan bütün teorik ve pratik materyalleri, aynı zamanda soruları ve diğer kaynakları kapsamaktadır.

BDEK'nın oluşturulması aşağıdaki sıraya göre sağlanır |

1. BDEK'nın oluşturulması amacının açıklanması;
2. BDEK için öğretim materyallinin seçimi;
3. BDEK'hri faaliyet algoritmasının oluşturulması;
4. Oluşturulan algoritmanın programlanması;
5. Oluşturulmuş BDEK'nın doğru çalışmasının testle kontrolü.

Yapılan çalışmada bu aşamaların her biri açıklanmış, aynı zamanda BDEK'nın oluşum algoritmasının şeması ve BDEK'nın oluşturulmasının optimum varyantı gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler : algoritma, oluşturma amacı, öğretim materyalleri, optimum varyant.

Development of Rates of Training With The Help of The Computer

Abstract

In this study, the utility of developing automated educational rates (AER) was investigated for teaching various disciplines with the help of the computer. Such rates contain all theoretical and practical materials as well as different applications of any given scientific discipline.

For the creation of automated processes the following steps are needed:

1. Painting out the objectives in developing AER.
2. Choice of theoretical and practical materials.
3. Developing an algorithm for the activities of AER.
4. Programming the developed algorithm.
5. Testing the accuracy and the relevance of the programme.

In this study, each of the above steps has been explained. Also, the developed algorithm of AER together with its optimal variant has been shown.

Key words: algorithm, objectives in developing, theoretical and practical materials, optimal variant.

Giriş

Bilgisayar ve yeni teknolojiler yardımcı ile eğitim ve öğretimi nitelikli olarak yüksek düzeyde gerçekleştirmeye, bütün kesimlerde ve bilim alanlarında anlamlı olduğu kadar, aynı zamanda yaratıcı bir öğretim ve öğrenme sürecini de bir olumsuz katkılarını, bireyin düşünme, araştırma ve üretme boyutunda uygulamalı olarak açıkça ortaya sermektedir (İsmail İpek 2001). Eğitimin temel görevi insan davranışlarında istendik, planlı ve yaratıcı yönde değişiklik süreci oluşturmaktadır. Bu öğretimi gerçekleştirmeye süreci ve onun etkileri de okullarımızdan endüstriye kadar uzanan bütün basamaklarda üretimi artırmaya yönelik, çok yönlü, toplamsal ve sosyal işlevleri yerine getirmektedir. Bu işlevler çok yönlü insan davranışının olumlu ve oluşturma olarak tanımlandığına göre; insan, teknoloji ve öğrenilmesi istenen konu ile etkileşimi sağlama yanında, bu sürecin sonunda bir ürünü ortaya koyma gereksinimi duymaktadır. Bu ürün,

"öğrenme" olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü, teknolojik ve bilimsel gelişmeler, bilgisayarlara ve yeni teknolojlere dayalı ve zorunlu yeni öğretim süreçlerini ortaya koymaktadır. Ekonomik etkenler, harcanan zaman, bireysel bekentiler ve gereksinimler bilimsel arayışın etkileyip bireylerin ve toplum sorunlarını çözümüne yönelik davranışlar içinde olmasını zorunlu kılmaktadır (Güriz İmer, 1998).

Eğitim sistemlerinde bilgisayardan genel olarak beş temel alanında yararlanıldığını belirtmek olanağıdır. Bu alanlar, eğitim araştırmaları, eğitim hizmetleri yöntemi, ölçme-değerlendirme ve rehberlik hizmetleri, bilgisayar öğretimi ve öğretme-öğrenme etkinlikleridir. Bunlar içerisinde en önemlisi öğretme-öğrenme sürecidir (Gibbons A. S. ve ark. 1998).

Materyal ve Yöntem

Bilgisayarların eğitimde kullanılması öğrenme sürecinde öğrencilere bireyselleştirilmiş öğretim sağlanmaktadır, bu yolla öğrenciler kendi yetenekleri doğrultusunda ilerleyebilmektedirler. Bunun yanısıra bilgisayar, öğretim sürecinde kullanıldığından öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirebilir, başarı düzeylerini artırabilir, derslere ve bilgisayara karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlayabilir.

Bilgisayarların öğretme-öğretim etkinliklerinde kullanılması sürecinde en zor olan iş, bilgisayar destekli eğitim kurslarının (BDEK) oluşturulmasıdır (N. Beşirov, 2008). Bu kurslar herhangi bir dersin bilgisayara öğretilesi için gereken bütün teorik ve pratik materyalleri, aynı zamanda soruları ve kaynakları kapsamaktadır. Bu materyallarda cetveller, grafikler, formüller, şemalar olabilir.

BDEK'nın oluşturulması aşağıdaki sıraya göre sağlanır:

- 1 BDEK'nın oluşturulması amacının açıklanması;
- 2 BDEK için öğretim materyallerinin seçilmesi;
- 3 BDEK'nin faaliyet algoritmasının oluşturulması;
- 4 Oluşturulan algoritminin programlanması;
- 5 Yaratılmış BDEK'in doğruluğunun testle kontrolü.

BDEK'nın oluşturulması algoritmasının şeması Şekil 1'de verilmiştir (Novruz Bashirov, 2008).

BDEK'nın oluşturulması amacının açıklanmasında öğretilecek materyallann seçilmesi, seçilmiş materyallann psikolojik ve metodik bakımdan analizi, modelin kurulması, hemde BDEK'nin şemasının oluşturulması dahildir. Bu, en önemli meseledir ve farklı branşlardan olan uzmanların olmasını gerektiriyor. Bundan dolayı bu süreçte hem farklı branşlardan olan öğretim Üyelerinin, hem psikologların, hem de bilgisayar programcılannın birer birer çalışmaları gerekir.

İkinci aşama BDEK'nin faaliyet algoritmasının oluşturulmasıdır. Bu da modelin kurulmasına dayanır. Bu aşamayı bilgisayar uzmanları gerçekleştirir. Onlar BDEK'nin hem faaliyet algoritmasını, hemde o algoritmaya uygun bilgisayar programını oluştururlar.

Oluşturulan bilgisayar programları multimediyalı ve multimediyasız olmak üzere iki türdür (H. Başırov, 2002).

Multimediyalı bilgisayar programlarında öğretilecek materyallara ek olarak örnekler ve onların uygulamaları, çözümleri ile yanıtı seslerden de istifade yararlanılır. BDEK'larda seslerden yararlanmak öğrencilerin büyük ilgilerine sebep olur.

Multimediyasız bilgisayar programlarında öğrencilere öğretilecek materyallerde seslerden yararlanılmaz (H. Başırov, 2009).

Üçüncü evrede kağıtta yazılmış bilgisayar programının ve öğretilecek materyallerin klavyeden bilgisayara dahil edilmesi ve yanlışlıkların düzeltilmesi sağlanır.


Dördüncü evrede artık hazır olan ve bilgisayarda normal çalışan BDEK programının kontrolünde karşıya çıkan kusurlar ortadan kaldırılır. Bu aşama çok zaman gerektiriyor. Bu zaman zarfında BDEK farklı bilim seviyesine


sahip olan öğrenciler, öğretim Üyeleri, psikologlar ve bilgisayar programcıları tarafından yararlanıyor, daha sonra onların önerileri dikkate alınarak bu bilgisayar programı daha da iyileştiriliyor. Bundan sonra BDEK'nın son optimum variyantının kopyaları çoğaltılarak YÖK'ten onların eğitimde kullanılması için izin alınıyor.

Beşinci aşamada, oluşturulmuş ve YÖK tarafından onaylanmış BDEK'nin eğitimde uygulanması evresidir. Bu aşama uzun yıllar devam ediyor ve çok nadiren (eğitim programı değiştirildiği zaman) değiştiyor.

BDEK'nın oluşturulması amacının açıklanması aşamasında farklı disiplin elemanlarının ve bilgisayar uzmanlarının aşağıdaki işleri yerine yetirmeleri gerekir (Başırov H. A. ve ark. 2009):

- 1 Öğrencilere öğretilecek bilgilerin ve pratik derslerin içeriğine bağlı olarak öğretimme amacıyla formalaştırılmalı ve bu amaca ulaşmak için optimum yol gösterilmelidir.
- 2 Eğitim araçları seçilmelidir.
- 3 Seçilmiş bütün öğretim araçları psikolojik ve metodik bakımdan araştırılmalıdır.





Öğretim araçlarının psikolojik, pedagojik ve metodik bakımdan analizi öğrencilerin bilim seviyesine, ahlak düzeyine ve eğitim sürecine uygun olmalıdır.

BDEK'nın oluşturulması amacının açıklanması evresinde farklı eğitim yöntemleri değerlendirilir, meselenin çözümü için optimum yöntem seçilir ve öğretim sürecinin modeli oluşturulur. Öğretim sürecinin modeli dedikte, ders zamanı öğrenci ile bilgisayar arasında karşılıklı alaka varyantları anlaşılır.

Bu aşamanın en önemli meselesi – öğretim yönteminin seçilmesidir. Bu durumda öğretimin optimal yöntemi oluşturulması ve BDEK'nın optimum varyantının şeması tayin edilmelidir. BDEK'nın optimum varyantının şeması Şekil 2'de verilmiştir (Başirov H. A. ve ark. 2009).

BDEK birkaç programlar paketinden ibaret oluşuyor. Bu programlardan biri başka programların işini yönlendirir ve ona göre de bu program aparıcı program adlanır. Diğer programlar bu esas programla birlikde bir paket oluşturur.

Sonuç

BDEK'nın oluşturulması zamanı öğretilecek araçlar birbirini izleyen forma programlaştırılır. Bu kısmın her biri bir program modülü olarak adlandırılır.

BDEK'nın böylece modüllük prensibi ile oluşturulması büyük önem taşıyor. Çünkü bu yapı çok basittir ve herhangi bir modülde olan yanlışlıklar düzeltmek çok kolaydır. Hem de bir modülde edilen değişiklik diğer modüller etkilemez.

BDEK'dan istifade edilmesi öğretmenlerin işini kolaylaştırır, öğrencilerde ilme büyük merak uyandırır ve öğrencilere derslerini çalışmalarında kolaylık sağlar.

Kaynaklar

- Bashirov N., Aliyev A., Bashirova A. 2008. Computer Educational Technology Publications. training and self-training. Научные труды ЮКГУ им. М. Ауезова, № 16, 2008 г. з. 61 – 66.
- Bashirov N., Aliyev A., Bashirova. A 2008. Algorithms for creation of Automated teaching courses. Научные труды ЮКГУ им. М. Ауезова, № 16, 2008 г. з. 66 – 70.
- Баширов Н. А. 2002. Экспертные системы. Баку, «Нурлан», 2002. 164 с.
- Баширов Н. А., Баширова А. Н., Баширов Ф. Н. 2009. Проблемы создания автоматизированных учебных курсов. Современные гуманитарные исследования, М., № 1 (26).
- Баширов Н. Ф., Баширова А. Н., Баширов Ф. Н. 2009. Области применения автоматизированных учебных курсов. Педагогические науки, № 1 (34), М., 2009, стр. 77 – 81
- Dick, W., & Carey, L. 1996. The systematic design of instruction (4th ed.). New York, NY: HarperCollins College Publishers.
- İpek, İ., 2001. Bilgisayara öğretim tasarım, Gelişimsel Yöntemler. Kitapçılık Ltd. Şti. Ankara, 2001. 360 s.
- İmer, G., 2000. Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının bilgisayara ve bilgisayarı eğitimde kullanmaya yönelik nitelikleri. Eskişehir, 2000. 201 s.
- Gibbons, A. S., & Fairweather, P. G. 1998. Computer-based instruction: Design and development. Englewood Cliffs, New Jersey: c. 122 – 127.
- Gronlund, N. E.,& Linn, R. L., 1990. Measurement and evaluation in teaching, (6th ed.) New York: NY: Macmillan Publishing Company.
- İpek, İ. 1995. The effects of window presentation type and field dependence on learning from a CBI geology tutorial. Dissertations Abstracts International. (University Microfilms No DAO 72699 Ann Arbor, MI).
- Jonassen, D. H., (Ed.) 1988. Instructional design for microcomputer courseware. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Nitko, A. J. 1989. Designing tests that are integrated with instruction. In R. L. Linn (Ed.) Educational measurement (3rd ed.). New York, NY: Macmillan Publishing Company.
- Merrill, M. D. 1994. The new component design theory: Instructional design for courseware authoring. In D. G. Twitchell (Ed.), Instructional design theory (pp- 353-366). Englwood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
- Price, R. V. 1991. Computer-aided instruction: A guide for authors. Belmont, CA: Wadsworth, Inc.
- Seels, B., & Glasgow, Z. 1998. Making instructional design decisions, (2nd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Schoenfeldt, L. F. 1989. Guidelines for computer-based psychological tests and interpretations, Computers in Human Behavior. 5, 13-21.
- Seinberg, E. R. 1984. Teaching computers to teach. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Venezky, R., & Osin, L. 1991. The intelligent design of computer-assisted instruction. White Plains, New York: Longman Publishing.

Van Gölü Kuzey Havzası'nın Son 1000 Yıllık Polen Profili: İlk Sonuçlar

Güldem KAPLAN¹, Georg HEUMANN²

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van/Türkiye

²Steinmann Institute of Geology, Mineralogy and Palaeontology, University of Bonn, Bonn/ Germany

Özet

Bu çalışma Van Gölü Kuzey Havzası'nın tabanında yer alan çökellerin palinolojik içeriğinin belirlenmesi ile birlikte paleoflora değişimlerinin ve çökelleme süresi boyunca insan etkisinin flora üzerindeki yansımalarının gözlemlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Palinolojik incelemelerin yapıldığı Van 04-5V sondajı 247 m su derinliğinden gravite sondajlama yöntemi ile alınmıştır. Sondajın kestiği istifin polen analizine dayalı değişimlerin yaşı yaklaşık olarak günümüzden önce (G.O.) 1000 yıldır. Polen analizi sonuçlarına göre, otsu polen yüzdesi % 65-75 arasında değişen değerlere sahiptir ve odunsu polen yüzdesine göre fazladır. Poaceae, Chenopodiaceae ve Artemisia polenleri otsu polenler arasında en baskın olanlardır. Elde edilen bu polen profili son 1000 yıldır çoğunlukla step vejetasyonunun hakim olduğu bir paleofloraya işaret etmektedir. Cerealia-tip, Juglans ve Pinus polenleri antropojenik göstergeler olarak baz alınmış ve bu polenlerin varlığı ve göreceli bollukları, çökelim süresince insan etkisinin varlığının bir yansımı olarak tanımlanmıştır. Buna göre, günümüzden yaklaşık 100 yıl önce insan etkisi belirgin olarak artmaya başlamıştır.

Anahtar kelimeler: İnsan etkisi, Palinoloji, Van Gölü Kuzey Havzası,

Pollen Profile of the Last 1000 Years of Lake Van Northern Basin: Preliminarily Results

Abstract

The aim of this palynological study was first to determine paleofloral changes and second to observe the human impacts on the flora around Lake Van archived in sediments at the bottom of the Lake Van Northern Basin. Sediment core Van04-5V has been drilled in a water depth of 247 m using a gravity corer. The tentative time scale based on pollen analysis of the sequence is about 1000 BP. According to the pollen analysis nonarboreal pollen percentages are varying about 65-75 % and dominates the palynoflora. Poaceae, Chenopodiaceae and *Artemisia* pollen grains are most abundant among nonarboreal grains. The pollen diagram indicates a paleoflora mostly dominated by steppe vegetation for the last 1000 years. Based on Cerealia-type, *Juglans* and *Pinus* pollen grains as anthropogenic indicators and their presence and relatively abundance interpreted as human impact during sedimentation. The anthropogenic indicators show that human impact started to intensify distinctively during last 100 years.

Key words: Human Impact, Lake Van Northern Basin, Palynology.

Giriş

Polen analizleri, polen diyagramlarındaki odunsu ve otsu polenlerin bolluk değişimlerini kullanarak, iklimsel değişimlerin, floranın zaman ve mekan boyunca değişimlerinin ve göreceli bolluklarının, insan etkisinin (ormanlık alanların tahribi ve tamam gibi), paleokolojik ve paleoflora değişimlerinin yorumlanması için birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır (van Zeist ve Woldring, 1978; van Zeist ve Bottema, 1988; van Zeist ve Bottema, 1991; Ediger, 1995; Kutluk, 1994; Akgün, 1995; Bottema, 1995; Eastwood ve ark., 1999; Vernooye ve ark., 2000; Wick ve ark., 2003; YiYin ve ark., 2008).

Van gölü maksimum derinliği (460 m), hacmi (607 km^3) ve yüzey alanı (3570 km^2) ile Türkiye'nin en büyük gölüdür (Litt ve ark., 2009). Van Gölü'nün batı, kuzey ve kuzeybatı kısımları ağırlıklı olarak Nemrut, Süphan, Tendürek, Etrük ve Girekol volkanlarına ait volkanik ve volkanoklastik kayaçlar ile örtülüdür (Keskin, 2003; Özdemir ve ark., 2006; Oyan ve ark., 2007; Şengör ve ark., 2008). Gölün güney kısmında, Bitlis Masifine ait metamorfikler (Tolluoğlu, 1981; Şengün, 1984, Göncüoğlu ve Turhan, 1985; Oyan, 2004), doğu kısmında ise ofiyolitik melanj ve sedimanter kayaçlar yer almaktadır (Schwiezer,

1975; Valeton, 1978; Acarlar ve ark., 1991; Kempe ve ark., 2002).

Van Gölü'nü çevreleyen alanlar Doğu Anadolu meşe ormanı, Doğu Anadolu ova bozkırı, Doğu Anadolu yüksek dağ bozukları, Doğu Anadolu yüksek dağ çayırları ve Doğu Anadolu dağ bozukları fitocoğrafik alanları ile çevrilidir (Eken ve ark., 2006).

Van Gölü taban çökelleri üzerinde yapılan önceki palinolojik araştırmalar Van Gölü'nün Tatvan Havzası ve Ahlat Sırtı kesimlerinde gerçekleştirilmiştir (van Zeist and Woldring, 1978; Wick et al., 2003; Litt et al., 2009). Bu çalışma Van Gölü'nün Kuzey Havzası kesiminde yapılan ilk palinolojik çalışmındır.

Çalışma Alanı:

Bu araştırma kapsamında yapılan 04-5V sondajlarının karot ömekleri Van Gölü'nün Kuzey Havzası kesiminden alınmıştır (Şekil 1). Kuzey Havzası, Tatvan Havzası'nın kuzeyinde ve Ahlat Sırtı ile Bitlis ilinin Ahlat İlçesi arasında yer almaktadır. Van Gölü'nde yapılan jeofizik araştırma sonuçlarına göre sondaj yapılan noktalar bir profil boyunca belirlenmiştir ve göl tabanında bulunan yıllık laminalanmış sedimanlar palinolojik çalışmalar için son derece uygun niteliktir (Litt ve ark., 2009). Sondaj yapılan noktalar için


ritmik sedimentasyonun en iyi gözlendiği alanlar temel alınmıştır.

Kuzey Havzası ortalama olarak 260 m su derinliğine sahiptir ve Tatvan Havzasına (yaklaşık 450 m) göre belirgin şekilde sidirdir.

Materyal ve Yöntem

Çalışmanın materyalini Van Gölü tabanından gravite sondaj yöntemi ile alınan sedimanlar ve bu sedimanların içерdiği fosil polenler oluşturmaktadır. Karotun kestiği istif laminalanmalı kıl, normal derecelenmeli türbiditik çökél, kayma ve göçme çökelleri ve piroklastik malzeme içermektedir. Karotlardan örnek alma ve hazırlama çalışmalarının tamamı ve incelemelerinin bir bölümü Bonn

Üniversitesi Paleontoloji Enstitüsü'nde (Almanya) gerçekleştirilmiştir. Polen analizi yapmak için uygulanan yöntem, Faegri ve Iversen (1989) tarafından geliştirilen yöntemdir. Yöntem için kullanılan kimyasalların uygulama miktarları ve süreleri için, Bonn Üniversitesi Paleontoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Örnekler sırasıyla HCl (hidroklorik asit), KOH (potasyum hidroksit), HF (hidroflorik asit), H_2SO_4 (sülfürik asit) ve asetik asit anhidrit ile hazırlanan asetoliz sıvısı ile işleme tabi tutularak hazırlanmıştır. Hazırlanan her bir ömek için 500 adet polen sayımı yapılmış ve sayım sonuçları Tilia (E. C. Grimm, Springfield, USA) isimli bilgisayar programına yüklenerek polen diyagramları oluşturulmuştur.



Şekil 1. Van 04-5V sondajının konumu (Litt ve ark., 2009'dan düzenlenerek alınmıştır).

Bulgular


Litoloji: Van 04-5 V sondajının kestiği istifin kahverengi, yeşil, yeşilimsi gri renkli killerin laminalanması ile oluşmuş ritmik çökeller (varv), kayma göçme çökelleri (slump), türbiditik çökeller ve piroklastik malzeme içeren seviyelerden oluşmaktadır (Şekil 2). Esas olarak varv tanımlaması; buzul göllerindeki (glaciolacustrine) yıllık laminalanma için kullanılmaktadır (De Geer, 1912). Bu tanımlama ayrıca farklı türde kirintısız malzemenin yıllık laminalanma durumu için de yaygın olarak kullanılmaktadır (Lotter et. al., 1997; O'Sullivan, 1983; Simola, 1992). Bu nedenle laminalanmalı çökeller varv olarak adlandırılmıştır.

Laminalanma gösteren ritmik çökellerin (varv) düşük enerjili ortam koşullarında oluşturduğu düşünülmektedir. Kayma göçme çökeli (slump) olarak adlandırılan çökeller içinde gözlenen karışık haldeki laminalı çökellerin varlığı, kayma göçme yapılarının çökelmeden sonra meydana

gelmiş bir kayma sebebiyle, kütle akmaları ile veya tektonik bir aktivite sonucunda oluşmuş olabilir. İstif içerisinde masif ve/veya yukarıya doğru derecelenme gösteren değişik kalınlıklarda türbiditik çökeller yamaç eğiminde meydana gelen bir değişim, türbiditik akıntıları tetikleyen deprem gibi olaylar veya akarsuların göle girişi ve yoğunluk farkı nedeniyle yamaç aşağı akma sonucunda oluşmuş olabilir.

Palinoloji ve Yaşı: Van Gölü Kuzey Havzası'nın polen analizine göre, otsu polenler odunsulara göre çoğunluktadır (Şekil 3). Otsu polen yüzdesinin maksimumum ve minimum değerleri % 75 ile % 60 arasında değişmektedir. Otsu polenler arasındaki en büyük yüzde Poaceae, Chenopodiaceae ve *Artemisia* polenlerine aittir. Poaceae polenlerinin % 30 ile % 15, *Artemisia* polenleri % 25- % 8 ve Chenopodiaceae polenleri ise % 18- % 5 arasında değişen değerlerde gözlenmiştir. Bu otsulara daha düşük yüzdeler ile Liguliflorae-tip, Tubuliflorae-tip, Apiaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae ve Rumex, Sanguisorba


minor, *Plantago lanceolata* polenleri eşlik etmektedir ve bu polenler hemen her seviyede gözlenmiştir. Odnsu polenler arasında seyrek olarak tanımlanan polenler ise *Anemone coronaria*-tip, *Fabaceae*, *Polygonum aviculare*-tip, *Sisyrinchium* polenleridir. *Helleborus*, *Scabiosa*, *Fumana*, *Tordylium* polenleri de birkaç seviyede tanımlanan polenler arasındadır. Odunsu polenler arasındaki en büyük yüzde değeri *Quercus* polenlerine aittir. Tüm karot boyunca tanımlanan *Quercus* poleninin maksimum ve minimum değerleri % 30 ile % 8 arasında değişmektedir.



Şekil 2. Van 04-5V sondajının stratigrafik istif.


Odnsu polenler arasında 2. büyük yüzde değerine sahip olan *Pinus* polenleridir ve maksimum ve minimum değerleri % 15 ile % 5 arasında değişmektedir. Bu odunsu polenlere daha düşük yüzdelerle *Alnus*, *Carpinus*, *Pistacia*, *Betula*, *Fraxinus*, *Olea*, *Salix* gibi odunsu polenler daha düşük yüzdeler ile eşlik etmektedir.

Karot boyunca tanımlanan laminalli düzeylerin turbiditik çökeller, kayma göçme çökelleri (slumps) ve piroklastik malzeme ile kesilmiş olması nedeniyle düzenli ve kesiksiz bir laminalanma gözlenmemektedir. Bu nedenle Van 04-5V karotunun kestiği istif için varv kronolojisi oluşturarak varv yaşlandırması yapmak mümkün olmamıştır. Van Gölü'nün Tatvan Havzası ve Ahlat Sırı kesimlerinden elde edilen ömekler üzerinde daha önce yapılmış olan polen analizlerinin varv kronolojisine dayalı yaşlandırımları (Kempe ve Degens, 1978; Landmann ve ark., 1996b; Wick ve ark., 2003; Litt ve ark., 2009) baz-



Şekil 3. Van 04-5V sondajının polen diyagramı.


yüzdesinde azalma ve *Artemisia* polenlerindeki artış ile günümüzden önce yaklaşık 1000 yılına yaşalandırılmıştır (Şekil 4).



Şekil 4. Van Gölü Kuzey Havzası istifinin polen analizine dayalı yaşalandırılması.

İnsan Etkisi:

İnsanların geçmiş dönemlerden günümüze kadar flora üzerindeki etkileri polen analizleri ile birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur. Antropojenik göstergeler olarak kullanılan polenler çoğunlukla "cereal-tip" olarak adlandırılan tahıl polenleridir. Bunun yanı sıra *Plantago lanceolata*, *Juglans*, *Sanguisorba minor*, *Rumex*, *Cannabis*, *Urtica*, *Centeurea solstitialis*-tip gibi polenler de insan etkisinin varlığının kanıtları olarak kullanılmıştır (Bottema, 1975; Behre, 1981; Bottema, 1986; İnceoğlu ve Pehlivan, 1986; Behre, 1990; Bottema, 1995; Roberts, 1998; Eastwood ve ark., 1999; Vermoore ve ark., 2000; Roberts ve ark., 2001; Wick ve ark., 2003; YiYin ve ark., 2008).



Şekil 5. Van 04-5V sondajı boyunca tanımlanan antropojenik polenlerin dağılımı.

Iran-turan flora bölgesine dahil olan Van Gölü ve çevresinin doğal yayılmış bitki örtüsünde antropojenik göstergeler olarak temel alınan bu bitkilerin zaten var olduğu arazi gözlemleri ile belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında antropojenik göstergeler olarak baz alınan polenler bu bölgede yetiştirciliğinin yapıldığı bilinen *Cerealia*-tip, *Juglans* ve *Pinus* polenleridir (Şekil 5). Bu polenlerin

sondajın üst kesimlerine doğru artış gösterdiği belirlenmiştir ve bu durum ormanlaştırma, tarım ve ticari amaçlı olarak yetiştiricilik olarak yorumlanmıştır.

Tartışma ve Sonuçlar

Kuzey Havzası karot ömeklerinin içерdiği piroklastik malzemenin Van Gölü'nün batı ve kuzey kesimlerinde yer alan Nemrut ve/veya Süphan volkanlarından çıkan malzemeler olduğu düşünülmektedir.

Van 04-5V sondaj karotunun polen verilerine göre, otsu ve odunsu polen yüzde değişimleri tüm karot buyurucu istikrarlı bir gidiş sunmaktadır ve yaklaşık olarak son 1000 yıldır Van Gölü Kuzey Havzası'nın yakın çevresinde step vejetasyonu hakimdir.

Yapılan arazi gözlemleriyle palinolojik içerik karşılaştırıldığında paleoflora ve flora arasında büyük benzerlikler gösterdiği görülmüş ve en azından son 1000 yıldır Van Gölü'nün Kuzey havzası Çevresinde ağırlıklı olarak step vejetasyonunun hakim olduğu belirlenmiştir.

Juglans ve *Pinus* polenlerinin polen diyagramının üst kesimlerinde gözlenen artışı bu polenlerin ait oldukları bitkilerin yetiştirciliğinin yapıldığı, *Quercus* polenlerinde gözlenen azalmanın ise yakacak malzeme temini için ormanlık alanların tahrip edilmesinden kaynaklanan insan etkilerinin yansımaları olarak yorumlanmıştır. Muradoğlu ve Bahta (2010), net bir tarih belirtmemekle birlikte, Ahlat İlçesinde ceviz yetiştirciliğinin yaygın ve ekonomik olarak sürdüründüğünü belirtmişlerdir. *Pinus* (çam) polenlerinin varlığının ve karotun üst kesimlerine doğru gözlenen artışın günümüze doğru gelindiğe artan ormanlaştırma çalışmalarıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim günümüzde Van Gölü çevresindeki yerleşim yerlerinde park ve bahçe düzenlemelerinde yoğun olarak çam ağacı kullanıldığı görülmektedir.

Elde edilen bu ilk veriler günümüz ve geçmiş florası arasında büyük benzerlikler sunmakla beraber son 100 yıldır insan etkisinin de artışını ve antropojenik bir step vejetasyonuna işaret etmektedir.

Katkı belirtme:

Bu çalışmanın yapılması için gerekli tüm maddi olanakları sağlayan Bonn Üniversitesi Paleontoloji Enstitüsü Başkanı sayın Prof. Dr. Thomas LITT'e ve sondaj ömeklerinin alınması sırasında emeklerinden dolayı PALEOVAN çalışma ekibine teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- Acarlar, M., Bilgin, E., Elibol, E., Erkal., T., Gedik, I., Güner, E., Hakyemez, Y., Sen, A.M., Oğuz, M.F., Umut, M., 1991. Van Gölü Doğu ve Kuzeyinin Jeolojisi. MTA Genel Müd. Jeoloji Etüt Dairesi Yayınevi, Rapor No: 9469, 94 s. (yayınlanmamış).
- Akgün, F., 1995. İzmit Körfezi (Hersek Burnu - Kaba Burun) Kuvatemer İstifinin Palinolojisi. İzmit Körfezi Kuvatemer İstifi (Editör: Engin Meriç), 179-199.
- Behre, K. E., 1981. The interpretation of anthropogenic indicators from pollen diagrams. *Pollen et Spores*. 23, 225-245.
- Bottema, S., 1975. A pollen Diagram From the Syrian anti Lebanon. *Paleorient* 3, 259-268.

- Bottema, S., 1986. A Late Quaternary Pollen Diagram From Lake Urmia (Northwest Iran). *Review of Palaeobotany and Palynology*, 47, 241-261.
- Bottema, S., 1995. Holocene vegetation of the Van area: palynological and chronological evidence from Söğütlu, Turkey. *Vegetation History and Archaeobotany*, (4): 187-193.
- De Geer, G., 1912. A geochronology of the last 12 000 years. *Proc. 11th Internat. Geological Congress* 1910: 241-253.
- Eastwood, W. J., Roberts, N., Lamb, H. F. ve Tibby, J. C., 1999. Holocene Environmental Change in Southwest Turkey: a palaeoecological record of lake and catchment-related changes. *Quaternary Science Reviews*, (18), 671-695.
- Ediger, V. Ş., 1995. Palinoloji, Bölüm 6. İstanbul Boğaziçi Güneyi ve Haliç'in Geç Kuvatemer (Holosen) Dip Tortulları (Editör: Engin Meric). İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, İstanbul, 59-69.
- Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T., Lise, Y., (editörler) 2006. Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, Ankara.
- Faegri, K., Iversen, J. 1989. Textbook of pollen analysis. 4th edition. John Wiley & Sons Ltd. Norway. 328 s.
- Göncüoğlu, M. C., Turhan, N., 1985. Bitlis Metamorfik kuşağı orta bölümünün temel jeolojisi. M.T.A. Raporu, Rapor No:7707, Ankara. 225.
- İnceoğlu, Ö., Pehlivan, S., 1987. İç Anadolu Bölgesindeki Tuz Gölü Kuvaterner Tabakalarında Palinolojik Bir Araştırma. DOĞA TU Botanik D. 56-85.
- Kempe, S., Degens, E.T., 1978. Lake Van varve record: the past 10,420 years. In: Degens, E.T., Kurtman, F. (Eds.), *Geology of Lake Van*. MTA Press, Ankara, pp. 56-63.
- Kempe, S., Landmann, G., and Müller, G., 2002. A floating varve chronology from the last glacial maximum terrace of Lake Van/Turkey. *Zeitschrift für Geomorphologie*, (126): 97-114.
- Kerey, İ.E., Meric, E., Nazik, A., Tunoğlu, C., Avşar, N., Kapan-Yeşilyurt, S., Akgün, F., Uludağ, M., Agası, N., Tıraş, M., Çil, E., Akkiraz, M. S., 2004. İzmit Körfezinin doğusu, Adapazarı, Sakarya Deltası ve çevreleri Geç Kuvatemer (Holosen) çökellerinin özellikleri. *Yerbilimleri* 29, 55-76.
- Keskin, M., 2003. Magma generation by slab steepening and breakoff beneath a subduction-accretion complex: An alternative model for collision-related volcanism in Eastern Anatolia, Turkey. *Geophysical Research Letter*, 30, (24): 8046-8050.
- Kutluk, H., 1994. Haliç Holosen Polenleri (doktora tezi, basılmamış). İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.
- Landmann, G., Reimer, A., Lemcke, G. and Kepenne, S., 1996b. Dating Late Glacial abrupt climate changes in the 14,570 long continuous varve record of Lake Van, Turkey. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, (122): 107-118.
- Litt, T., Krastel, S., Sturm, M., Kipfer, R., Örcen, S., Heumann, G., Franz, S. O., Ülgen, U. B., Niessen, F., 2009. 'PALEOVAN', International Continental Scientific Drilling Program (ICDP): site survey results and perspectives. *Quaternary Science Reviews* (28) 1555-1567.
- Lotter A. E, Sturm M., Teranes J. L., Wehrli B., 1997. Varve formation since 1885 and high-resolution varve analyses in hypertrophic Baldeggerrsee (Switzerland). *Aquatic Sciences*, (59): 304-325.
- Muradoğlu, F., Balta, F., 2010. Ahlat (Bitlis) Yöresinden Selekte Edilen Cevizlerin (*Juglans regia* L.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. *YYÜ Tarım Bil. Dergisi*, 20(1): 41-45.
- O'Sullivan, P. E., 1983. Annually-laminated lake sediments and the study of Quaternary environmental changes - a review. *Quaternary Science Reviews*, 1:245-313.
- Oyan, V., 2004. Bülükyazı-Hizan (Bitlis Masifi) Çevresindeki Na-Feldispat Oluşumlarının Jeolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemi (Yüksek Lisans tezi, basılmamış). Y.YÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, VAN.
- Oyan, V., Ünal, E., Tolluoğlu, A.Ü., Keskin, M., 2007. Volcanostratigraphic and Petrologic Properties of the Etrusk Stratovolcano, SE Turkey. The 2nd International Scientific Conference of Young Scientists and Students, "New Directions of Investigations in Earth Sciences", October 08-09, Baku, Azerbaijan, 45-46.
- Özdemir, Y., Karaoğlu, Ö., Tolluoğlu, A.Ü., Güleç, N., 2006. Volcanostratigraphy and petrogenesis of the Nemrut stratovolcano (East Anatolia High Plateau): The most recent post-collisional volcanism in Turkey. *Chemical Geology*, (226): 189-211.
- Roberts, N., 1998. *The Holocene*. Second Edition. Blackwell, USA. 316 s.
- Roberts, N., Reed, J.M., Leng, M.J., Kuzucuoğlu, C., Fontugne, M., Bertaix, J., Woldring, H., Bottema, S., Black, S., Hunt, E., Karabiyikoğlu, M., 2001. The Tempo of Holocene Climatic Change in the Eastern Mediterranean Region: New High-Resolution Crater-Lake Sediment Data From Central Turkey. *The Holocene*, (11,6): 721-736.
- Schweizer, G., 1975. Untersuchungen zur Physiogeographie von Ostanatolien und Nordwestiran, geomorphologische, klima- und hydrogeographische Studien im Vansee- und Rezaiehsee-Gebiet. *Tübinger Geogr. Studien*, Tübingen. 145 s.
- Simola, H., 1992. Structural elements in varved lake sediments. *Geological Survey of Finland, Special Paper*, 14:5-9.
- Şengör, A.M.C., Özeren, S., Keskin, M., Sakınç, M., Özbaşır, A.D., ve Kayan, I., 2008. Eastern Turkish high-plateau as a small Turkish type orogen: Implications for post-collisional crust-forming processes in Turkic type orogens, *Earth sciences Reviews*, 90: 1-48.
- Şengün, M., 1984. Bitlis Masifi Tatvan güneyinin jeolojik/petrografik incelenmesi (Doktora tezi, basılmamış). H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Tolluoğlu, A. Ü., 1981. Mutki (Bitlis) Yöresi Metamorfiklerinin Petrografisi / Petrolojisi. (Yüksek lisans tezi, basılmamış). H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Valeton, I., 1978. A Morphological and Petrological Study of the Terraces Around Lake Van, Turkey. In: *The Geology of Lake Van*. (Editors Degens E.T., Kurtman, F.), The Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Publication No:169. Ankara, 158s.
- van Zeist, W., Woldring, H., 1978. A polen Profil From Lake Van: A Preliminary Report in *The Geology of Lake Van*, (Editors: Degens, E.T., Kurtman, F.). 115-123.
- van Zeist, W., Bottema, S., 1988. Late Quaternary Vegetational And Climatic History Of Southwest Asia. *Proc. Indian natn . Sci. Acad*, (No.3): 461-480.
- van Zeist, W., Bottema, S., 1991. Late Quaternary Vegetation of the Near East. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, 3882265302, Germany. 156 s.

- Vermoere, M., Degryse, P., Vanhecke, L., Muchez, Ph.; Paulissen, E., Smets, E. ve Waelkens, M. 1999. Pollen analysis of two travertine sections in Basköy (southwestern Turkey): implications for environmental conditions during the early Holocene. Review of Palaeobotany and Palynology 105, 93-110.
- Vermoere M., Smets E., Waelkens M., Vanhaverbeke H., Librecht I., Paulissen L., Vanhecke L., 2000. Late Holocene Environmental Change and the Record of Human Impact at Gravgaz near Sagalassos, Southwest Turkey. Journ. of Archaeological Science 27: 571-595.
- Wick, L., Lemcke, G., Strunn, M. 2003. Evidence of Lateglacial and Holocene climatic change and human impact in eastern anatolia: high resolution pollen, charcoal, isotopic and geochemical records from the laminated sediments of Lake Van, Turkey. The Holocene, 13 (5): 665-675. Blackwell Scientific Publications.
- Wodehouse, R.P., 1935. Pollen Grains. Their Structure, Identification and Significance in Science and Medicine. McGraw-Hill Book Company. NewYork and London. 574 s.
- YiYin, L., LiPing, Z., HaiTing, C., 2008. Pollen Indicators of Human Activity. Chinese Science Bulletin, 53:9, 1281-1293.