

MEDİAL PERİORBİTAL BÖLGE VE BURUN YAN DUVARI TAM KAT DEFEKTLERİNİN "MEDİAL TABANLI ÜST GÖZKAPAĞI MYOKUTAN FLEBİ" İLE REKONSTRÜKSİYONU

Levent YOLERİ, Sema ÖZDEN, Ahmet SEYHAN

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa

ÖZET

Medial periorbital bölge ve burun yan duvarı ince cilt yapısı ve cilt altında önemli anatomi yapıları barındırmamasından dolayı rekonstrüksiyonu güç bölgelerdir. Genellikle glabellar, frontal, yanak ya da nasolabiyal bölgelerden çevrilen fleplerle onarım yapılır, ancak bu fleplerde renk ve doku uyumu iyi değildir, donör saha skarları yüzün orta bölgesinde belirgindir. Burun sırtından çevrilecek flepler ise geniş defektler için yetersiz kalır. Klinigimizde medial periorbital bölge ve burun yan duvarında 1,5 - 3 cm boyutlu tam kat doku defekti bulunan 5 hastaya "medial tabanlı üst gözkapığı flebi" uygulandı. Primer kapatılacak flep genişliği saptanarak, flep lateralinden mediale doğru orbikularis okulu kasıyla birlikte medialde yaklaşık 5 mm çaplı pedikül üzerinde kaldırıldı. Pedikül, defekt ile flep donör sahası arasında açılan kanal içine yerleştirildi. Donör saha üst gözkapığı blefaroplastisindeki gibi kapatıldı. Hastalar ortalama 13 ay takip edildi. Tüm flepler yaşadı. Fleplerin renk ve doku uyumları iyiydi. Donör saha morbiditesi olmadı. Hastalarda oluşan venöz konjesyon 10 gün içinde kendiliğinden geriledi. Medial tabanlı üst gözkapığı flebi, medial periorbital bölge ve burun yan duvarı orta boyutlu tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonlarında uygulanabilecek alternatif bir fleptir.

Anahtar Kelimeler: Medial periorbital bölge, üst gözkapığı flebi

SUMMARY

Resurfacing of medial periorbital and lateral nose wall defects constitutes a major problem for plastic surgeons. Skin flaps transferred from the glabellar, frontal, cheek and nasolabial areas are usually preferred. However, these flaps are quite thick and bulky when compared with the native skin of the medial periorbital region, and the donor scar is visible. The lateral nose wall flaps are not suitable for closure of large defects. Medially pedicled myocutaneous flap was used for resurfacing of 1,5 - 3 cm medial periorbital and lateral nose wall defects in 5 patients. Flap widths enabling primary closure were determined, and the flaps were dissected with the orbicularis oculi muscle from lateral to medial over a pedicle with a diameter of approximately 5 mm. The pedicle was placed in a channel that was opened between the defect and the donor site. The donor site was closed in a similar fashion as in an upper lid blepharoplasty. The mean follow-up period was 13 months. All flaps survived, and skin match was good and no donor site morbidity was observed. Spontaneous regression of venous congestion was observed in 10 days. The medially based upper eyelid myocutaneos flap can be a good alternative for the reconstruction of medial periorbital and lateral nose wall defects.

Keywords: Medial periorbital region, upper eyelid flap.

GİRİŞ

Medial periorbital bölge ve burun yan duvarı bazal hücreli karsinomaların sık tuttuğu ve nüks oranlarının yüksek olduğu bir bölgedir. Kompleks anatomi yapısı, cildinin ince olması ve yüzün orta kısmında bulunmasından dolayı rekonstrüksiyonu güçlük göstermektedir^{1,2,3}. Periosteum tümörle birlikte eksize edildiğinde ya da medial kantal yapılar açığa çıktığında greft ile rekonstrüksiyon yapılamamaktadır. Bu durumda rekonstrüksiyonda glabellar,

frontal, yanak ya da nasolabial bölgelerden lokal flepler kullanılır⁴. Ancak bu fleplerin renk ve doku uyumları iyi değildir, donör saha morbiditeleri yüzün orta kısmında belirgin olmaktadır⁵. Burun sırtından çevrilebilecek lokal flepler ise geniş defektleri kapatmada yetersiz kalmakta, ayrıca anatomi yapılarında distorsyon yaratılmaktadır⁵.


Gözkapığı derisi renk ve doku yapısı açısından medial periorbital bölge ve burun yan duvarı bölgelerine iyi uyum

gösterir, gözkapığında donör saha morbiditesinin belirgin olmaması bir diğer avantajdır⁶. Porfiris ve ark. üst gözkapığı cildini myokutan flep olarak alt gözkapığı ve periorbital rekonstrüksiyonda kullanmıştır^{7,8}. Tezel ve ark pedikülü deepitelize ederek gerek ipsilateral, gerekse kontralateral defektlerde, lateral nasal duvarda ve burun sırtında kullanmışlardır^{6,9}.

Çalışmada medial periorbital bölge ve burun yan duvarı küçük ve orta boy defektlerinin rekonsrüksyonunda, medial tabanlı üst gözkapığı myokutan flebi uygulanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM:


Medial tabanlı üst göz kapığı myokutan flebi basal hücreli karsinomal 5 hastada, eksizyon sonrası oluşan medial periorbital bölge ($n = 2$) ve burun yan duvari ($n = 3$) tam kat defektlerinin rekonsrüksyonunda uygulandı. Hastaların yaşıları 52 - 79 arasındaydı. En küçük defekt boyutu $2 \times 1,5$ cm, en büyük defekt boyutu ise 3×3 cm olarak ölçüldü (Tablo). Hastaların tümünde tek taraflı flep uygulaması yeterli oldu. Flebin en geniş yeri defektin çapına eşit olarak tasarılandı. Hastanın "çimdirik testi"yle gözkapığındaki fazla cilt miktarı belirlendi. Primer kapatılabilen flep genişliği saptanarak rekonstrükte edilebilecek uygun genişlikte defektler seçildi. İşlemler lokal veya genel anestezi altında uygulandı. Operasyonda 3,5 büyütülmeli loupe kullanıldı. Klasik blefaroplasti insizyonu ile operasyona başlandı. Flep lateralden mediale doğru orbikularis okulu kası dahil edilerek medialde yaklaşık 5 mm çaplı pedikül üzerinde kaldırıldı (Resim 1). Fleplerin rotasyon açıları 110 - 130 derece arasında değişti, bir flebin distal ucuna ayrıca 180 derece rotasyon yapıldı. (Tablo) Medialde flebin pedikülini oluşturan supratrochlear, infratrochlear, medial palpebral damarların ince dallarının içinde bulunduğu yağ doku devamlılığı korundu. Pedikül, defekt ile flep donör sahası arasında açılan kanal içine yerleştirildi. Donör saha üst gözkapığı blefaroplastisindeki gibi kapatıldı.



Şekil 1: Flebin rotasyon arkı

Hasta Adı - Soyadı	Defektin Boyutu	Defektin Yeri	Flep Yaşayabilirliği	Flep Rotasyon
CD	2×2 cm	Medial kantal bölge	% 100	130 derece
NT	3×2 cm	Burun yan duvari	% 70	110 derece / (180 derece)*
MK	$2 \times 1,5$ cm	Burun yan duvari	% 100	120 derece
GA	3×3 cm	Burun yan duvari	% 100	110 derece
SY	2×2 cm	Medial kantal bölge	% 100	110 derece

*Distal ucu 180 derece kendi üzerinde döndürüldü.



Resim 1: Flebin medial yağ doku içinde bulunan pedikülü

BULGULAR:

Hastalar ortalama 13 ay takip edildi (7 ay - 2 yıl). Fleplerin tamamında postoperatif erken dönemde venöz konjesyon oluştu. Konjesyon 3-10 gün arasında kendiliğinden geriledi. Flebin distal ucunun 180 derece döndüğü 1 hastada distalde kısmi flep kaybına rastlandı, problemsiz sekonder iyileşme oldu. Bu hasta dışında tüm hastalarda flep yaşabilirliliği tamdı. Postoperatif geç dönemde tüm hastalarda medial kantal bölgede, pedikül kitlesine bağlı küçük bir perde oluştu ve 2 hastada kendi istekleri üzerine revizyonu yapıldı. Defekti 3 cm olan bir hastada oluşan ektropiyon 2. bir operasyonla düzeltildi. Fleplerin renk ve doku uyumunun iyi olduğu, donör sahada belirgin skar bırakmadığı gözlandı (Resim 2a, 2b, 3a, 3b).

TARTIŞMA:

Medial periorbital bölge ve burun yan duvarının tam kat defektlerinde iyi bir rekonstrüksiyon seçeneği bulmak zordur. Basitliği, renk ve doku uyumunun iyi olması nedeniyle deri grefti iyi bir seçenek olmasına karşın iyi kanlanan bir alicı yatak gerektirmektedir. Medial periorbital bölge deri kanserlerinin sık nüks ettiği bir bölgedir^{2,3}. Eksizyonun yeterli olması için sıkılıkla periosteum da eksizyona dahil edildiğinden fleple onarım gereklidir. Rekonstrüksiyonda frontal, glabellar, yanak ya da nasolabiyal bölgelerden kaldırılan flepler kullanılsa da renk ve doku uyumunun iyi olmaması, yüzün orta kısmında belirgin donör saha morbiditesi yaratması, glabellar flepte olduğu gibi kaş medialinde distorsiyon yapması ya da medial kantal alana kıl taşması nedeniyle yüz güldürücü sonuçlar alınamamaktadır^{5,6,9}. Burun sırtından burun yan duvarına ya da medial kantal bölgeye lokal flepler çevrilebilmekte, ancak bu flepler geniş defektleri kapatmadı yetersiz kalmakta ve burun anatomik yapısında distorsiyon yaratabilmektedir⁵. Gillies' in "benzer dokularla tamir prensibi"ne göre bölgeye renk ve doku açısından en uygun doku gözkapasıdır^{9,10}.

Medial tabanlı üst gözkapası myokutan flebi "Medial tabanlı unilateral Tripier flebi" ile aynı prensiplere dayanmaktadır⁹. Flebin pedikülü zengin vasküler ağa-



Resim 2a : Olu 1 Basal hücreli karsinom. Ameliyat öncesi görünüm



Resim 2b: Olu 1: Ameliyat sonrası 1.5 yıldaki görünüm

sahiptir. Hem infratrocchlear ve angüler arter yoluyla eksternal karotid arterden hem de supraorbital, supratrocchlear, dorsal nasal, medial palpebral arterler yoluyla internal karotid sistemden beslenir. Medial palpebral arter flebin asıl pediküllerini oluşturur. Venöz drenajı da arteriyel dolaşımı takip eder^{10,11,12}.



Resim 3a : Olgu 2 Basal hücreli karsinom. Ameliyat öncesi görünüm

Flep Porfiris ve ark tarafından periorbital ve alt gözkapığı defektlerine uygulanmış⁸, Tezel ve ark tarafından karşı medial kantal bölge defektlerine çevrilmiş ve pedikülü deepitelize edilerek geliştirilmiştir; ayrıca defekte uygun flep kaldırırmak yerine tam blefaroplasti şeklinde tüm kapak cildi kaldırılmış, flep daha sonra defekte uygun hale getirilmiştir^{6,9}. Flep alıcı sahaya çevirirken subkutan tünelden geçirilebilir, ancak medial kantal yapıların ve ince flep pedikülünen zarar görme riski vardır. Flep distal ucunun 180 derece kendi üzerine döndürüldüğü bir hastada ince pedikülü kırılması nedeni ile uç kısmında nekroz olmuş, ancak problemsiz iyileşme görülmüştür. Yaşlı hastalarda cilt bolluğu ve elastisite kaybı nedeniyle daha az donör saha morbiditesi ile geniş flepler kaldırırmak olasıdır. Simetri sağlamak için aynı seansta karşı üst gözkapığına blefaroplasti yapılabilir⁶. Medial kantal flebin geniş bir rotasyon arkı mevcuttur (Şekil 1). Medial periorbital rekonstrüksiyonda diğer yöntemlerde karşılaşılabilen komplikasyonlardan medial kantusun



Resim 3b : Olgu 2: Ameliyat sonrası 1. yıldaki görünüm

yukarıya ya da aşağıya doğru yer değiştirmesi ya da açının deformasyonu söz konusu olmamakta; lakovral sistem hasarları oluşmamaktadır. Pedikülünlük kalınlığı nedeniyle ameliyat sonrası geç dönemde medial kantal alanda küçük bir perde oluşumu flebin dezavantajıdır. Üst gözkapığı cildinin yeterli genişlikte olmaması durumunda bu flep uygulanamaz. İlk günlerde görülen konjesyon 10 gün içinde kendiliğinden gerilemeye herhangibir morbidite yaratmamaktadır.

Medial tabanlı myokutan flep ince, kolay şekil verilebilen, rotasyon arkı geniş, güvenilir bir flep olup, medial periorbital ve burun yan duvarı defektlerine renk ve doku uyumu iyidir. Donör saha morbiditesinin olmaması da diğer bir avantajıdır.

SONUÇ:

Orta büyülükteki medial periorbital bölge tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonunda medial tabanlı üst gözkapığı flebi alternatif olabilecek uygun bir seçenekir.

*Dr. Sema ÖZDEN
Adres: 6346 sok. 7 / 8 Bostanlı
İZMİR*

KAYNAKLAR

- Rodriguez RL, Zide BM. Reconstruction of the medial canthus. Clin Plast Surg. 15:255, 1988.
- Jelks G, Glat P, Jelks EB, Longaker MT. Medial canthal reconstruction using a medially based upper eyelid myocutaneous flap. Plast Reconstr Surg Vol 110(7): 1636, 2002.
- Moy, R. L, Ashjian, A. Periorbital reconstruction. J. Dermatol. Surg. Oncol. 17: 153, 1991.
- Jackson I,T. Eyelid and canthal region reconstruction. In: Local flaps in head and neck reconstruction. St. Louis, Missouri, Quality Medical Publishing, 273-326, 2002.
- Jackson I,T. Nose reconstruction. In: Local flaps in head and neck reconstruction. St. Louis, Missouri, Quality Medical Publishing, 87-188, 2002.
- Tezel E, Sönmez A, Numanoğlu A. Medial pedicled orbicularis oculi flap. Ann Plast Surg, Vol 49 (6) : 599, 2002.

- Porfiris E, Georgiou P, Popa CV, et al. Island orbicularis oculus myocutaneous flap from the upper eyelid for lower eyelid reconstruction. Eur J Plast Surg 21:246, 1998.
- Porfiris E, Kalokerinos D, Christopoulos A, et al. Upper eyelid island orbicularis oculi myocutaneous flap for periorbital reconstruction. Ophthal Plast Reconstr Surg 16:42, 2000.
- Tezel E, Sönmez A, Numanoğlu A. Medial pedicled orbicularis oculi flap for medial canthal resurfacing. Ann Plast Surg 47(2):213, 2001.
- Stagno d'Alcontres F, D'Amico E, Colonna MR, Quatra F, Lupo F. The orbicularis oculi myocutaneous flap in the repair of the medial canthal region. A new strategy for canthal resurfacing. Br J Plast Surg. 57(6):540, 2004.
- Lembke BN, Lucarelli MJ. Anatomy of the ocular adnexa, orbit and related facial structures. In: Nesi FA, Lisman RD, Levine MR, eds. Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2 nd ed. St. Louis: Mosby, 42-6, 1998.
- Tezel E, Sönmez A, Numanoğlu A. Medial pedicled orbicularis oculi flap. Plast and Reconstr Surg, Vol 112 (7) : 1964, 2003.