

GENİŞ TUTULUMLU BİR ENFLAMATUAR LİNEER VERRÜKÖZ EPİDERMAL NEVUS OLGUSU (ILVEN)

Birol CİVELEK, Selim ÇELEBİOĞLU, Tayyar SELÇUK, Mustafa DEVECİ

S.B. Yıldırım Beyazıt Ankara-Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ve GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

ÖZET

Epidermal nevus, keratinositlerin aşırı üretilmesiyle ortaya çıkan hamartomadır. Enflamatuar lineer verrüköz epidermal nevus (ILVEN) nadir görülen bir cilt hastalığıdır. ILVEN, lineer yayılımı olan kaşıntılı, eritemli ve verrüköz plaklar oluşturan enflamatuar papüllerden oluşur. Topikal uygulanan ilaçlardan cerrahi girişimlere kadar uzanan tedavi metodları mevcuttur. Bu yazında geniş tutulumu olan bir ILVEN olgusu sunulmaktadır. Daha önce medikal tedaviye rağmen düzelleme olmayan olgumuzda eksizyon ve lokal flaperlerle rekonstrüksiyon yapılmıştır. Olgumuz geniş tutulumu olması nedeniyle dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: ILVEN, epidermal nevus.

SUMMARY

Inflammatory linear verrucous epidermal nevus (ILVEN) is a relatively uncommon skin disorder. It is characterized as a benign cutaneous hamartoma with pruritic, erythematous, inflammatory papules coalescing into verrucous plaques. Various modalities of treatment for ILVEN have been suggested. However, no single treatment method has been successful consistently. In our report, we present a case of ILVEN in a young girl. She has widely spread lesions from scalp and neck extending to axilla and forearm on the left side of her body. Her most symptomatic lesions were treated with excision and local flaps successfully.

GİRİŞ

Epidermal nevus, keratinositlerin aşırı üretilmesiyle ortaya çıkan hamartomadır. Genellikle doğumda ya da adölesan evrede lokalize ya da yaygın lezyonlar olarak ortaya çıkar¹. Enflamatuar lineer verrüköz epidermal nevus (ILVEN) ilk olarak 1971'de Altman ve Mehregan tarafından tanımlanmış nadir görülen bir cilt hastalığıdır². ILVEN, lineer yayılımı olan kaşıntılı, eritemli ve verrüköz plaklar oluşturan enflamatuar papüllerden oluşur. Literatürdeki kayınlarda, topikal uygulanan ilaçlardan cerrahi girişimlere kadar uzanan tedavi metodları mevcuttur. Fakat tek başına bu metodların başarılı olmadığı bildirilmektedir³. Medikal tedavi metodları farklılık göstermekte ve tedavinin sürekli olmaması durumunda nükslerle karşılaşılmaktadır. Bu yazında geniş tutulumu olan bir ILVEN olgusu sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU

7 yaşındaki bayan hasta sol temporoparietal bölgede saçsız koyu renkli alan, sol aksillada geniş alanı tutan kaşıntılı, psoriyatik görünümülü papüler lezyonlar ile boynun sol tarafını tutan lezyonlarla kliniğimize başvurdu. Hastanın bu lezyonlarının doğumdan beri var olduğu öğrenildi. Birkaç ay öncesine kadar topikal steroidlerin uygulandığı öğrenildi. Ancak son zamanlarda bu lezyonların büyüdüğü ve özellikle aksilladaki lezyonda zaman zaman akıntı






Resim 1A-1B: Hastanın preoperative görünümü. Lezyonlar yaygın bir şekilde scalp, aksilla, boyunda izlenmekte.



görüldüğü saptandı. Fizik muayenede, sol temporoparieatal bölgede 7 cm x 5 cm boyutlarında alopesiye yol açan nevus ve boyun sol lateralde farklı alanları tutan papüler tarzda nevus ve sol aksillanın tamama yakını tutan papüler, yer yer pürülün akıntıları lezyonlar izlendi (Şekil 1). Papüler lezyonların sol önkol dorsolateral yüzde ve sol skapular bölgede de var olduğu izlendi. Hastanın sistemik muayenesinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Kan biyokimyası ve kan sayısı (beyaz küre, hemoglobin) değerleri normal olarak alındı. Hastanın ailesiyle konuşularak lezyonlarının yaygın olması nedeniyle sadece skalp ve aksilladaki lezyonların eksize edilmesi planlandı. Genel anestezi altında bu lezyonlar totale yakın eksize edildi ve lokal flepler ile rekonstrüksiyon yapıldı. Postoperatif dönemde komplikasyonla karşılaşılmadı. Histopatolojik değerlendirme enfiamatuvar epidermal nevus ile uyumlu olarak alındı (Şekil 2). Postoperatif 6. aydaki kontrol muayenesinde rekürrensle karşılaşılmadı (Şekil 3). Hasta lezyonları için takibe alındı.



Resim 2: Histopatolojik değerlendirmede enfiamatuvar lineer verrüköz epidermal nevus tanısını destekleyen yaygın hyperkeratosis, papillomatosis ve mononükleer enfiamatuvar hücre infiltrasyonu izlenmektedir.



Resim 3A-3B: Hastanın postoperative 6. aydaki görünümü.

TARTIŞMA

Lineer verrüköz epidermal nevus, genellikle doğumda ya da doğumu izleyen aylarda ortaya çıkan epidermal yapılarının lineer hamartomudur^{4,5} ve ilk olarak von Baerensprung tarafından 1863'de tanımlanmıştır⁶. Lineer verrüköz epidermal nevus üç tipte görülür: lokalize, sistemik ve enfiamatuar lineer verrüköz nevus. Lineer verrüköz epidermal nevus ayırcı tanısında, lineer psoriazis, lineer liken simpleks kronikus ve nevus unius lateralis ayırdedilmelidir⁷.

ILVEN, verrüköz epidermal nevusun bir klinik formudur ve interlokin 1, 6 ile TNF ve intersellüler adhezyon molekülün artışı ile ortaya çıkmaktadır. Kronik semptomatoloji nedeniyle hastalar için son derece rahatsız edici ve sosyal hayatı engelleyicidir. ILVEN tanımı yapılmadan önce lineer psoriazis olarak tanımlanan birçok olgunun daha sonra ILVEN olduğu ortaya konmuştur¹. Lineer psoriazis ile ILVEN tanılarının dikkatli bir şekilde araştırılarak yapılması gerekmektedir.

ILVEN tedavisi güçtür. Tedavisi medikal ya da cerrahi yaklaşımlar ile olmaktadır. Dithranol, intralezyonel kortikosteroid, sıvı nitrojen ile kriyoterapi, podofilin, retinoidler, topikal kalsitriol, topikal 5-flourourasil ve D3 vitamini medikal tedavide kullanılan ajanlardır^{8,9}. CO2 lazer, flashlamp pulsed-dye lazerle ve dermabrazyonla

başarılı sonuçlar bildirilmiştir^{10,12}. Cerrahi yaklaşımların, lezyonların ortadan kaldırılması için en etkin yol olduğu bildirilmekle beraber, kayda değer ölçüde skar oluşumuna yol açtığı unutulmamalıdır.

Olgumuzda ILVEN tanısı için klasik kriterler² ortaya konmuştur: 1)Unilateral, kaşılılı lineer verrüköz lezyonlar, 2)Erken yaşta görülmesi, 3)medikal tedaviye yanıt olmaması². Sunduğumuz olguda, özellikle aksilladaki lezyonun enfiamasyonlu olması ve patoloji bulguları ILVEN tanısını doğrulamaktadır. Lezyonların skalpte, fasyal bölgede, boyunda ve aksilla ile sol önkolda bulunması ise lezyonların yaygınlığını göstermesi yönünden olguya ilginç kilmaktadır. Bu kadar geniş tutulumu olan ILVEN olgusu literatürde rapor edilmemiştir. Olgumuzda cerrahi eksiyonu tercih etmemizin sebebi hastanın daha önceki medikal tedaviye yanıt vermemesi olması, enfiamasyonun ağır ve semptomatik seyretmesi ve kozmetik görünümün sosyal hayatı engelleyici olmasıdır.

ILVEN'deki histopatolojik bulgular psoriazise çok benzer ve patognomonik olmayan ancak tipik orto ve parakeratosis ile görülür¹.

ILVEN tanısı Plastik Cerrahi'nin karşılaşabileceği hastalık spektrumunda bulunmaktadır. Tedavisinin düzenlenmesi aşamasında da Plastik Cerrahi uzmanı önemli rol oynamaktadır.

*Birol CİVELEK
Kehribar Sokak 9/ 24
G.O.P. Çankaya Ankara 06700*

KAYNAKLAR

- Menni S, restano L, Gianotti R, Boccardi D. Inflammatory linear verrucous epidermal nevus (ILVEN) and psoriasis in a child? *Int J Dermatol* 39:30-40, 2000
- Altman J, Mehregan AH. Inflammatory linear verrucous epidermal nevus. *Arch Dermatol*, 104: 385-389, 1971.
- Lee BJ, Mancini AJ, Renucci J, Paller AS, Bauer BS. Full thickness surgical excision for the treatment of inflammatory linear verrucous epidermal nevus. *Ann Plast Surg* 47(3): 285-292, 2001.
- Özçelik D, Parlak AH, ÖzTÜRK A, Kavak A, Çelikel N. Unilateral Linear verrucous epidermal nevus of the face and the oral mucosa. *Plast Reconstr Surg*, 115(2), 17e-19e, 2005.
- Aşkar İ, Aytekin S. Linear verrüköz epidermal nevus with cutaneous horn. *J Eur Acad Dermatol Venereol*, 17(3); 353-55, 2003.
- Nelson BR, Kolansky G, Gillard M, Ratner D, Johnson TM. Management of linear verrucous epidermal nevus with topical 5-fluorouracil and tretinoin. *J Am Acad Dermatol*, 30;287-88, 1994.
- Silver GS, Ho VCY. Benign epithelial tumors. *Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine*. Ed. I Fredberg, Wolff, Austen, Goldsmith, Katz). Sixth Edition 2003, Volume I, 770-775.
- Kim JJ, Chang MW, Shwayder T. Topikal tretinoïn and 5-fluorouracil in the treatment of linear verrucous epidermal nevus. *J Am Acad Dermatol*, 43(1), 129-132, 2000.
- Rulo HFC, van de Kerkhof PCM. Treatment of inflammatory linear verrucous epidermal nevus. *Dermatolgica* 182:112-114, 1991.
- Ülkür E, Çeliköz B, Yüksel F, Karagöz H. Carbon dioxide laser therapy for an inflammatory linear verrucous epidermal nevus: A case report. *Aesthetic Plast Surg*. 28(6):428-30, 2004.
- Alster TS. Inflammatory linear verrucous epidermal nevus: successful treatment with the 585 nm flashlamp-pulsed dye laser. *J Am Acad Dermatol*:31, 513, 1994.
- Fox BJ, Lapins NA. Comparison of treatment modalities for epidermal nevus: a case report and review. *J Dermatol Surg Oncol* 9;879-885, 1983.