

Bellevalia clusiana Griseb. (Hyacinthaceae)'nin Sitotaksonomik Özellikleri

Ö. Koray Yayınlı¹, Onur Koyuncu¹, Derviş Öztiirk², Süleyman Tokur¹

Özet

Bu çalışmada endemik bir tür olan *Bellevalia clusiana* Griseb.'nın sitotaksonomik özellikleri incelenmiştir. Bitkinin kök ucu hücrelerinde yapılan sitolojik incelemelerde $2n=16$ kromozomlu ve tetraploid olduğu tespit edilmiştir. Bölünür hücrelerin kromozomlarında yapılan çalışmalar sonucunda karyotip ve idiyogramı hazırlanmıştır. Kromozom boyları 4,827-9,975 μm arasında bulunmuştur. Sentromer pozisyonlarına göre ise kromozomlardan sekizinin submetasentrik (submedyan), dördünün metasentrik (medyan), ve dördünün de subtelosentrik (subterminal) olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: *Bellevalia clusiana* Griseb., Hyacinthaceae, Sitotaksonomi, Geyve, Sakarya, Türkiye.

Abstract

In this study cytological characteristics of *Bellevalia clusiana* Griseb. which is an endemic species are examined. Through the cytological examinations on root tip cells of the plant it is determined that the plant have $2n=16$ chromosomes and is tetraploid. As a result of the examinations on chromosomes of divisible cells idiogram and karyotype of the species have been prepared. Chromosome length is determined as 4,827- 9,975 μm . According to the centromer positions, it is observed that eight of the chromosomes are submetacentric, four of them are metacentric and four of them subtelocentric.

Keywords: *Bellevalia clusiana* Griseb., Hyacinthaceae, Cytotaxonomy, Geyve, Sakarya, Turkey.

¹ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Meşelik, Eskişehir.
E-mail: okoyuncu@ogu.edu.tr

² Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksekokulu, Mahmudiye, Eskişehir.

1. Giriş

Yeryüzünde yaklaşık 50 türü olan *Bellevalia* Lapeyr (Hyacinthaceae) cinsi, ülkemizde 21 türle temsil edilmektedir (Davis 1984, Davis et al. 1988, Güner et al 2000, Persson 2006). *Bellevalia* (Hyacinthaceae) türlerinin yaklaşık % 80'nin kromozom sayısı bilinmemektedir. Temel kromozom sayısı $x = 4$ olan *Bellevalia* cinsinin poliploid serisi gösteren türleri vardır Poliploidler, tetraploid ($2n=16$), hekzaploid ($2n=24$) ve oktaploid ($2n=32$)'dır. Triploid ($2n=12$) ve pentaploid ($2n=20$) örneklerinin de varlığı kayıtlıdır. (Darlington and Janaki 1945, Özhatay et al 1991a, Dane 1999, Özhatay et al 1991b, Mirici 1994).

Taksonomik çalışmalarında genetik bulguların önemli bir yeri vardır. Sitotaksonomi karyotiplerin durumu, kromozom sayısı, kromozom yapısı ve kromozom büyüklükleri gibi sitolojik bulgular yardımıyla klasik taksonomideki tartışmalı durumların aydınlatmasına katkıda bulunmaktadır (Levan 1944, Stebbins 1971, Tokur ve ark. 1988). Evrimsel ve sistematik ilişkilerin daha verimli olarak ortaya konulabilmesi için bitkilerin biyolojik özelliklerinin, sitotaksonomik çalışmalarla desteklenmesi düşüncesi bizi bu çalışmaya yönlendiren etmenlerden biridir.

Bu çalışmada endemik bir tür olan *Bellevalia clusiana* Griseb.'nın (Müskülm) sitotaksonomik özellikleri belirlenmeye çalışılmış ve bu sayede ilgili taksonomik araştırmalara katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

Materyal

Çalışma materyali Geyve (Sakarya) ve çevresinde yapılan botanik arazi çalışmaları sırasında toplanmıştır. Çalışma materyalinin lokalite, fitocoğrafik ve endemizm bilgileri; A3 Sakarya; Melekşesolak köyünün batısında *Quercus* sp. çalılıklarının kenarları ve açık alanlar, $40^{\circ}34'12.9''$, $30^{\circ}14'52.9''$, 375 m, 18.05.2003, Endemik, İran-Turan Elementi, OUFE 12763.

Yöntem

Suda çimlendirilen soğanların kök uçları sabah 8.00-10.00 saatleri arasında kesilerek alınmıştır. Bu kök uçları 8-hidroksikinolinin sudaki doymuş çözeltisinde, oda sıcaklığında 6 saat bekletilmiştir. 8-hidroksikinolinden alınan kök uçları, %100 saf glasial asetik asit içinde 40 dakika süre ile oda sıcaklığında bekletilerek fiksasyon yapılmıştır. Kök uçları %70'lik alkol içerisinde $+4^{\circ}\text{C}$ 'de buz dolabında saklanıp stok materyali olarak muhafaza edilmiştir. Fiksasyon sonrasında boyamadan önce kök uçları 1N HCl çözeltisinde 60°C 'lik etüvde 12 dakika bekletilmiştir. Kromozomların daha belirgin gözlenebilmesi


icin aseto orsein ile boyanmıştır. Boyadan alınan kök uçları % 45'lik asetik asitte 1 dk. bekletilmiştir. % 45'lik asetik asitli ortamda ezme-yayma yöntemi ile preparat yapılmıştır. Preparatlar alkol buharı değişim-tokuş yöntemi kullanılarak daimi hale getirilmiştir. Preparatlar içinde absolü alkol bulunan şalelerde + 4 °C'de buzdolabında 24 saat bekletilmiştir. Hazırlanan preparatlardan Karyogram ve idiyogramlar, her türe ait bir populasyondaki 5 ayrı preparatta ve her bir preparattaki 5 metafaz safhasında incelenip ölçüm ve değerlendirmeler toplam 25 veri üzerinden yapılmıştır (Elçi 1982). İyi dağılım gösteren hücrelerin fotoğraf çekimleri, Spot Advanced Software (V.3.2.4; Diagnostic Instruments) programlı Spot Inside Colour 3.2.0 Diagnostic Camera entegreli Olympus CH 20 araştırma mikroskopunda yapılmıştır.

3. Bulgular


B. clusiana'nın soğan çapı yaklaşık 2-3 cm'dir. Yaprak sayısı genellikle 3-4 nadiren de 2'dir. Yapraklar skaptan uzundur. Boyu yaklaşık 15-30 cm, eni 0,5-1 cm.'dir. Yapraklar şeritsi (linear), donuk yeşilimsi renkli (glauca), uzun sıvri uçlu (acuminatis) ve yaprak kenarlarının pürüzlüdür (scabrid). Bitki 1-2 skaplı olabileceği gibi uzunluğu da 15-20 cm'dir. Bir skaptaki çiçek sayısı 25-75'dir. Çiçek tomurcukları mor, kuru örneklerde kahverengiye döner. Periant çansı (campanulat), anterler mor renklidir. Tohum yüzeyi çukurculudur (alveolat). Bataklıklarda, nadasa bırakılmış tarlalarda, buğday tarlalarında yayılış göstermektedir (Davis 1984).

B. clusiana Türkiye'nin tehlike altındaki nadir ve endemik bitkileri, IUCN risk kategorilerine göre Lr (lc) kategorisine girmektedir. Lr (lc): Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit altında olmayanlar anlamına gelmektedir (Ekim ve ark 2000).


B. clusiana Griseb'nin kök ucu hücrelerinde yapılan sitolojik incelemelerde bitkinin 2n=16 kromozomlu olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1). Temel kromozom sayısı 4'tür. Bölünür kök ucu hücrelerinde bir mitoz anomalisine rastlanmamıştır. Bölünür hücrelerin mitotik metafaz düzlemindeki kromozomların çalışmalar sonucu aynı düzlemden olması ve birbirinden ayrılması nedeni ile karyotip ve idiyogram çalışmaları yapılmıştır. Bu bitkinin idiyogramı (Şekil 2) ve karyogramı (Şekil 3) verilmiştir. Kromozom boyları 4,827-9,975 µm arasında bulunmuştur. Sentromer pozisyonuna göre kromozomlardan biri metasentrik (medyan), ikisi submetasentrik (submedyan) ve biri de subtelosentrik (subterminal) (Şekil 2-3).



Şekil 1: *B. clusiana* Metafazdaki Somatik Kromozomları, $2n=16$



Şekil 2: *B. clusiana*'nın İdiyogramı



Şekil 3: *B. clusiana*'nın Karyogramı

Tablo 1. *B. clusiana*'nın ($2n=16$) Kromozomlarının Boy Ölçümleri

Kromozom Boyu (μm)			
Kromozom Çiftleri	Ortalama	Minimum	Maksimum
I	9,985	8,304	11,345
II	7,547	6,334	8,166
III	5,727	4,605	6,096
IV	4,827	3,602	5,304

Tablo 2. *B. clusiana*'nın ($2n=16$) Kromozomlarının Oransal Boyu

Oransal Boy			
Kromozom Çiftleri	Ortalama	Minimum	Maksimum
I	8,888	7,391	10,098
II	6,717	5,638	7,269
III	5,097	4,099	5,426
IV	4,296	3,206	4,721

Kromozomların boyları ölçüülerek oransal boyları hesaplanmıştır;

Kromozom I- *B. clusiana*'nın en uzun kromozomudur. Sentromerin bulunduğu yere göre kromozom metasentrik (medyan). Ortalama kol indeksi 1,412, ortalama oransal boy 8,888 ve ortalama boyu 9,985 μm'dir (Tablo 1-2).

Kromozom II- İkinci derecede uzun olan kromozomdur. Sentromerin bulunduğu yere göre kromozom metasentrik (medyan). Ortalama kol indeksi 4,769, ortalama oransal boy 6,717 ve ortalama boyu 7,547 μm'dir (Tablo 1-2).

Kromozom III- Üçüncü derecede uzun olan kromozomdur. Sentromerin bulunduğu yere göre kromozom subtelosentrik (subterminal). Ortalama kol indeksi 1,765, ortalama oransal boy 5,097 ve ortalama boyu 5,727 μm 'dir (Tablo 1-2).

Kromozom IV- Dördüncü derecede uzun olan kromozomdur. Sentromerin bulunduğu yere göre kromozom subtelosentrik (subterminal). Ortalama kol indeksi 1,831, ortalama oransal boy 4,296 ve ortalama boyu 4,827 μm 'dir (Tablo 1-2).

4. Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada *B. clusiana* Griseb. taksonu sitotaksonomik açıdan incelenmiş ve taksonun $2n=16$ kromozomlu diploid bireyler oldukları saptanmıştır. Daha önceden bu bitki üzerinde yapılan sitotaksonomik çalışmalarla bu cinsin taksonlarının $2n=8$, $8+3B$, 16, 24, 31, 32, $32+B$ kromozomlarına sahip diploid'den oktoploid'e ploidinin bütün düzeyleri, B-kromozomları ve kromozom sayıları, populasyon içi varyasyonları bildirilmiştir (Bentzer and Bothmer 1972, Federov 1974, Wendelbo 1984, Özhatay 2002, Özhatay et al 1991a, Özhatay et al 1991b, Mirici 1994). Ayrıca kromozom morfolojisini yönünden yapılan incelemeler sonunda; I. Kromozomun metasentrik (medyan), III. ve IV. kromozomların submetasentrik (submedyan) ve II. kromozomun ise subtelosentrik (subterminal) oldukları görülmüş olup bu durum Mirici (1994) ile uygunluk göstermektedir. *B. clusiana* Griseb'in kromozom sayısını 16 olarak belirttiği çalışmada ise çalıştığı materyalin tetraploid olduğu düşünülmüştür (Davis et al 1984). Dolayısıyla yapılan bu çalışmada da materyal tetraploid olarak belirlenmiştir. Mitoz bölünme preparatları incelendiğinde, metafaz safhasında, herhangi bir anomalide rastlanmamıştır. Kromozom büyüklükleri dikkate alındığında homolog kromozom çiftlerinden ikisinin, diğer kromozom çiftlerine nazaran oldukça büyük olduğu görülmüştür.

Bu çalışmada saptanmış olan kromozom ölçülerinin Bentzer and Bothmer 1972 ve Wendelbo 1984'ün Temel Karyotip'i ile uygunluk gösterdiği görülmüştür. Kromozom boyları (ortalama) 4,827-9,975 μm arasında bulunmuştur.

Kaynaklar

- Bentzer B. & Bothmer R., Chromosome Morphology in Afghanian *Bellevalia*, Bot. Notiser 125 (1972) 153-156.
- Dane F., Hekzaploid ($2n=24$) *Bellevalia edirnensis* Özhatay & Mathew'in Polen Mitozu ve Polen Morfolojisinin İncelenmesi, Turkish Journal of Botany, 23, (1999) 357-368.
- Darlington C. D. and Janaki Ammal E.K., Chromosome Atlas of Cultivated Plants, London (1945).
- Davis P. H., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. 8, Edinburgh, Edinburgh, University Press, Edinburgh (1984).

- Davis P. H., Mill R. R. and Tan K., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, V. 10, Edinburgh University Press, Edinburgh (1988).
- Ekim T., Koyuncu M., Vural M., Duman H., Aytaç Z. ve Adıgüzel N., Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Barışcan Ofset, Ankara (2000).
- Elçi \$. , Sitogenetikte Gözlemler ve Araştırma Yöntemleri, Fırat Univ., Fen Ed. Fak. Yayınları, Biyoloji 3, Elazığ (1982).
- Federov A., Chromosome Number of Flowering Plants, Press F. Republic of Germany, (1974).
- Güler A., Özhata N., Ekim T. and Başer K. H. C., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh (2000).
- Levan A., Notes on the Cytology of Dipsadi and *Bellevalia*, Hereditas, 30: (1944) 217-224.
- Mirici S., Bellevallia'nın Bazı Endemik Türler Üzerine Karyotipik ve Morfolojik Araştırmalar, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (1994).
- Özhata N., Diversity of Bulbous Monocots in Turkey with Special Reference Chromosome Numbers, Pure Appl. Chem. Vol. 74, No. 4 (2002) 547-555.
- Özhata N., Johnson M. and Mathew B., Chromosome Numbers of *Bellevalia* Species, Including a New Hexaploid from European Turkey, Botanika Chronika 10 (1991a) 813-818.
- Özhata N., Johnson M., Mathew B. and Dalgıç G., A New Hexaploid *Bellevalia* (Hyacinthaceae) From European Turkey, Botanical Journal of the Linnean Society, 107 (1991b) 89-99.
- Persson K., One New and One Emended Species of *Bellevalia* (Hyacinthaceae) from Turkey, Botanical Journal of the Linnean Society, 150 (2006) 253–260.
- Stebbins G. L., Chromosomal Evaluation in Higher Plants, Edward Arnold Publishers Ltd., (1971).
- Tokur, S., Zeybek, N. ve Kesercioğlu, T., Bitki Tayininde Sitotaksonominin Önemi, Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1-1 (1988) 17-23.
- Wendelbo, P., *Bellevalia* Wendelbo, In Davis P.H. (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 8 (1984) 264-274.

