

Trakya Gramineleri II : Aeluropodeae

The Grasses of European Turkey II: Aeluropodeae

Asuman BAYTOP *

Aeluropodeae tribüsü, tek cins ihtiva eden küçük bir tribüdür. Bu cinsteki, Lemée(3) ye göre, Akdeniz bölgesi memleketleri ile Orta ve Tropikal Asyada yayılmış olan 4 tür bulunur.

Memleketimizin Trakya bölgesinde yalnız bir türü yetişmektedir: *Ae. littoralis* (Gouan) Parl. Gerek mevcut literatüre(5), gerekse toplamış olduğumuz örneklerde göre, bu türün Trakyanın Güney sahilinde yer aldığı anlaşılmaktadır.

Trakya graminelerini tanıtan serimizin(2) bu ikinci yazısında, *Aeluropodeae* tribüsü, *Aeluropus* cinsi ve *Ae. littoralis* türü tanıtılmış ve bu türün Trakyadaki yayılışı verilmiştir.

İncelediğimiz örneklerin bir kısmı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun desteği ile yaptığımız gezilerde toplanmıştır. Bu Kuruma müteşekkir olduğumuzu açıklamak isteriz.

AELUROPODEAE Nevski ex Bor Oest. Bot. Zeit., 112, 184 (1965)

Spikula yandan yassılmış, 3 - çok çiçekli. Çiçekler erdişi, Spikula ekseni glumaların üstünden ve lemmaların arasından kırılıcı. Glumalar eşitçe boyda, tepede mukronat, alttaki 1 - 3, üstteki 5 - 7 damarlı. Lemma glumalardan uzun, 7 - 9 damarlı, mukronat. Palea lemma boyundan. Stamen 3. Meyva çiplak. Hilum tabanda nokta şeklinde. Nişasta taneleri bileşik.

Durum, eksen üzerine sık ve az çok tek taraflı dizilmiş, yassi, küçük spikalardan yapılmış, baş şeklinde veya daha uzun bir birleşik spika veya spikaya benzeyen bir panikula. Ligula alçak bir tüy sırasından ibaret. Lamina sert, tepede baticı. Çok senelik otlar.


* Farmasötik Botanik Kürsüsü, Eczacılık Fakültesi, Üniversite, İstanbul.

***Aeluropus* Trin.**

Fund. Agrost., 143 (1820)

Spikula yandan yassılmış, 3 - çok çiçekli. Glumalar zarımsı, eşitçe boyda, tepede mukronat, alttaki 3, üstteki 5 damarlı. Lemma zarımsı, glumalardan uzun, 7 - 9 damarlı, mukronat. Palea lemma boyunda, 2 karinalı.

1. *Ae. littoralis* (Gouan) Parl., Fl. Ital. 1, 461 (1848). Syn. *Poa littoralis* Gouan, Fl. Monsp., 470 (1765), *Dactylis littoralis* Willd., Sp. Pl. ed. 4, 1, 408 (1797). Şek. 1.



Şek. 1. *Aeluropus littoralis*. Spikulanın yandan görünüşü (x 20).

Çok senelik bitkiler. Rizom sürünençü ve uzun stolonlu. Gövde dik veya tabanda dirsekli, kesif skabr, 10 - 30 cm yüksekliğinde. Yapraklar sık ve distik dizilişli. Lamina kısa, sert, mavimsi, yassi, 2 mm genişliğinde, tepede biz şeklinde kıvrılmış, kenarları ve üst yüzü hafifçe skabr. Vagina çiplak, kulakçıklarda birkaç uzun tüylü. Ligula ancak 0.1 - 0.2 mm yüksekliğinde bir tüy sırasından ibaret. Panikula tek taraflı, loplu, ovat veya silendrik, 1 - 5 cm boyunda, 4 - 8 mm eninde. Spikularlar küçük, yassi, ovat spikalar teşkil edecek şekilde sık ve iki taraflı olarak dizilmiş, bu spikalar da, yassi yüzlerini durumun eksenine dayamış olarak, az çok tek taraflı, nihai bir spika veya spikaya benzeyen bir panikula teşkil eder. Kısmi spikaların ve durumun ekseni kesif skabr. Spikula hemen hemen sapsız, yandan yassılmış, 3 - 16 çiçekli, tabanda ekseriya birkaç tüylü. Glumalar oblong, silvriçe tepeli, ke-

narları geniş zarımsı, 2 mm boyunda, alttaki 3, üstteki 5 damarlı, çiplak, karına skabr. Lemmalar geniş ovat, mukronat, kenarları geniş zarımsı, çiplak, 2.5 mm boyunda, 7 - 9 damarlı. Lemma tabanı, sapa bağlandığı yerde az çok tüylü. Palea zarımsı, lemma boyunda, 2 karinalı, karinalar skabr, tepede kütçe. Anter 1 - 1.5 mm boyunda. Meyva oblong, çiplak, serbest, sırttan az çok yassılmış, ancak 1 mm boyunda. Embriyo meyvanın yarı boyunda. Hilum tabanda, küçük, toparlak, esmer bir leke şeklinde. Nişasta taneleri bilesik.

Ae. littoralis, yapraklarının sık ve distik dizilişi, yaprak uçlarının biz şeklinde kıvrılmış ve batıcı oluşu, spikulanın çiplak olması, çiçek durumunun yukarıda belirtilen özel şekli ile kolayca tanılır.

Bu bitki deniz kenarlarında, denize yakın bataklıklarda yetişen, tuzlu toprakları seven, çok senelik, alçak bir graminedir. Memleketimizin sıcak sahil bölgelerinde yettiği gibi, bu bitkiye İç Anadolunun tuzlu topraklarında da rastlanmaktadır. Mayıs - Ağustos aylarında çiçek açar.

A 1 Edirne : Enez, Meriç sahili, 23.vii.1969, A. Baytop, ISTE 15723! **A 1** Te-kırdağ: Tekirdağ Marmara Ereğlisi arası, 13.vi.1968, A. Baytop, ISTE 13368! **A 1 (E)** Çanakkale : Gelibolu (4). **A 2 (E)** İstanbul : Ataköy Yeşilköy arası, tuzlu çayır, 4.viii.1963, A. Baytop, ISTE 7445! Silivri, köprülerin civarı, 7.viii.1967, A. Baytop, ISTE 11736! Florya - Çekmece, Bakırköy - Yeşilköy(1).

Ö Z E T

Türkiye Trakyasında, Gramineae familyasının *Aelropodeae* tribüsünden bir tür bulunur : *Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl. Mevcut literatür ve topladığımız örneklerle göre, bu tür Trakyanın Güney sahilерinde yetişmektedir.

S U M M A R Y

The tribe *Aelropodeae* is represented in European Turkey by *Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl. It has been found in the southern shores of this region.

L İ T E R A T Ü R

1. Baytop, A., *İstanbul Ecz. Fak. Mec.*, **2**, 16 (1966).
2. Baytop, A., *ibid.*, **5**, 119 (1969).
3. Lemée, A., *Dictionnaire descriptif et synonymique des genres de plantes phanérogames*, Tome I, 95, Imprimerie Commerciale et Administrative, Brest (1929).
4. Rechinger, K. H., *Flora Aegaea*, 775, Springer Verlag, Wien (1943).
5. Webb, D. A., *Proceedings of the Royal Irish Academy*, **65**, Section B, No 1, 80 (1966).