

DIETLE ALINAN KURŞUNUN ERİTROSİT OSMOTİK DİRENÇ VE KAN VİSKOZİTESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI*

**Derviş ÖZÇELİK, Selmin TOPLAN, Nuran DARIYERLİ,
Tevfik GÜLYAŞAR, Şefik DURSUN**

- ▼ [Giriş](#)
- ▼ [Yöntem-Gereç](#)
- ▼ [Bulgular](#)
- ▼ [Tartışma](#)
- ▼ [Özet](#)
- ▼ [Kaynaklar](#)

Background.- In this study, the effect of lead concentration on blood viscosity and erythrocyte osmotic resistance were tried to be investigated in rats.

Design.- Fourteen Wistar-Albino type female rats were picked and animals were divided into two as control and experimental groups. Nutrition's type and content of both groups was same. But lead acetate was added to the drinking water of experimental group for four weeks. At the end of fourth week, blood samples were drawn from abdominal aorta of rats. Blood viscosity and erythrocyte osmotic fragility were determined.

Results.- While increase in blood lead concentration values of experimental group was detected, the osmotic resistance and blood viscosity values were found to be decreased according to the same parameters of control group.

Conclusion.- Our study indicated that the intake of lead through the drinking water leads to reduce of blood viscosity and osmotic resistance of erythrocytes.

Özçelik D, Toplan S, Darıyerli N, Gülyasar T, Dursun Ş. The effect of lead concentration on blood viscosity and erythrocyte osmotic resistance. Cerrahpaşa J Med 2000; 31 (3): 129-133.

GİRİŞ ▲

Önemli çevre kirleticileri olmaları nedeniyle ağır metal ve metal bileşiklerinin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri son yıllarda giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Çeşitli yollarla alınan kurşun, kanda yeterli bir düzeye ulaştıktan sonra çeşitli organ ve dokularda birikmeye daha sonra atılmaya başlar. Kan dolaşımına katılan kurşunun %85 ile %90'ı eritrositlere bağlı halde, geri kalanı da kan plazmasındaki proteinlerle birleşmiş olarak bulunur.¹

Doğada yaygın olarak bulunan ve de endüstride fazlaca tüketilen kurşun, insan ve hayvanlarda zehirlenme kaynağı oluşturan metallerin başında yer alır. Genellikle kolay çözünen kurşun bileşiklerinin toksisitesi daha yüksektir. Buna göre kurşun nitrat, kurşun klörür, kurşun asetat, kurşun oksit, kurşun sülfür ve kurşun fosfat bileşiklerinin toksik etkileri çoktan aza doğru sıralanabilir. Bir defada verilince akut kurşun zehirlenmesi doğuran dozlar, küçük dozlara bölünerek verildiğinde de aynı hayvan türünde kronik zehirlenmeye neden olabilmektedir.

Kurşun toksisitesi tümüyle moleküller ve hücresel düzeyde meydana gelir. Değişik enzim sistemleri üzerinde etkili olur. Kurşun, proteinin sülfidril (-SH) grubuna bağlanarak veya diğer metal iyonları ile yer değiştirerek bazı enzimlerin aktivite-sini azaltır. Özellikle ferrokelataz enziminin normal fonksiyonunu bozar. Kurşunun en

belirgin etkisi kendini hemato-poesis ve hem biyosentezinde gösterir.² Kurşun zehirlenmesinin ilk belirtisi olan aneminin nedeni, eritrosit yaşam süresinin normale göre kısalmış olması ve hem sentezindeki bozukluklardır. Bunlara ek olarak, eritrosit Na-K ATPaz enzim etkinliğinin azalığı görülür. Sodyum pompasındaki etkinlik azalması, eritrosit zarlarının bütünlüğünü koruyamamasına yol açar, dolayısıyla eritrosit yaşam süresi kısalır.³⁻⁵ Kanda hücrelerin (Eritrosit, Trombosit, Lökosit) miktarlarında oluşan değişiklikler kann tabakaları arasındaki sürtünmede de değişikliklere neden olur ve bu sürtünmede viskoziteyi belirler.

Bu nedenle çalışmamızda toksik metal olan kurşuna maruz bırakılan sıçanların kan viskozitesindeki değişiklikleri ve eritrositlerin osmotik direncine etkilerinin araştırılması amaçlandı.


YÖNTEM VE GEREÇLER ▲

Çalışmamızda Wistar-Albino türü 14 adet dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol (n=7) ve kurşuna maruz bırakılan (n=7) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup aynı tür katı yem ile beslendi. Kontrol grubuna normal şehir şebekesi suyu verilirken deney grubunun içme suyuna içerisinde 20 ppm kurşun olacak şekilde kurşun asetat katılarak verildi. Dört hafta süren denemenin sonunda anestezi altında abdominal aortadan alınan kan ömeklerinde hemositometrik yöntemle kan sayımları (eritrosit, hematokrit), rotasyonel viskozimetre (*Wells-Brookfield*) ile kan viskoziteleri tayin edildi.⁶ Viskozye ölçümlü 37°C'de 10 rpm rotasyonel hızda, 75s-1'lük kayma hızında tayin edildi. Osmotik direnç tayini, alınan hepa-rinize kan ömeklerinde Suess ve ark.'nın yöntemine göre yapıldı.⁷ pH'sı 7.2 olan fosfat tamponlu %1'lük NaCl stok çözeltisi hazırlandı. Ölçüm için %0.20 - %0.72 arasında değişen 14 farklı osmotik değerde tuz çözeltileri hazırlanarak standart deney tüplerine konuldu. Her tüpe 20µl kan örneği ilave edildi. Tüp ter yüze edilerek hafifçe karıştırıldı. Oda sıcaklığında bir saat bekletildikten sonra yirmi dakika süre ile 2000 rpm'de santrifüj edildi. Her örneğin süpernatındaki hemoglobin konsantrasyonu tayin edildi. Saptanan değerlerden standart hemoliz ve hemolitik inkrement eğrileri çizildi. Bu eğrilerden eritrositlerin osmotik direnç sınırları değerlendirildi. Aynca alevli atomik absorbsiyon spektrometresi [*Shimadzu (AA-680)*] ile kan kurşun konsantrasyonları tayin edildi.⁸ Kontrol ve deney gruplarına ait tüm verilerin istatistiksel değerlendirmeleri "Student's -t" testi ile yapıldı.

BULGULAR ▲

Çalışmamızda kontrol ve kurşun asetat kataklı su verilen deney gruplarında kan kurşun konsantrasyonları sırası ile $30.44 \pm 9.27 \mu\text{g}/\text{ml}$ ve $36.8 \pm 5.72 \mu\text{g}/\text{ml}$ olarak ölçülmüştür. Deney grubunda kan kurşun konsantrasyonunun artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0.05$) (Şekil 1).

Şekil 1. Kontrol grubu ve deney grubunun kan kurşun konsantrasyonlarının karşılaştırılması



Deney ve kontrol grubu kan örneklerinde eritrosit sayıları sırası ile 4.93 ± 1.0 ile 7.37 ± 0.19 milyon/mm³ olarak saptandı. Ayrıca hematokrit (%Hct) değerleri deney grubunda 43 ± 3.67 , kontrol grubunda 48.25 ± 0.96 olarak tayin edildi. Deney grubunun eritrosit sayısı ve %Hct değerlerinin kontrollerinkine göre anlamlı olarak azaldığı gözlendi (Tablo I).


Tablo I. Kurşun Katkılı Su Verilen Deney Grubu ile Kontrol Grubunun Kanlarında Ölçülen Parametrelerin Ortalama (M) ve Standart Sapma (SD) Değerleri

Ölçülen Parametre	Kontrol Grubu ($M \pm SD$)	Deney Grubu ($M \pm SD$)
Kan Kurşun kons.($\mu\text{g}/\text{ml}$)	30.44 ± 9.27	$36.8 \pm 5.72^*$
Max. O. D. (% NaCl)	0.32 ± 0.02	$0.52 \pm 0.05^{***}$
Min. O.D. (% NaCl)	0.52 ± 0.02	$0.64 \pm 0.05^{***}$
% Hemoliz Farkı	0.40 ± 0.02	$0.60 \pm 0.05^{***}$
Hematokrit(% Hct)	48.25 ± 0.96	$43.0 \pm 3.67^*$
Eritrosit sayısı (mil/mm ³)	7.87 ± 0.19	$4.93 \pm 1.01^{**}$
Vizkozite.(m.Pa.s) (10rpm)	6.43 ± 0.36	$5.72 \pm 0.27^*$


* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$; O.D.: Osmotik direnç

Kan viskozite değerleri kontrol grubunda 6.43 ± 0.36 mPa.s, deney grubunda 5.72 ± 0.27 mPa.s olarak saptanmıştır (Şekil 2).


Şekil 2.
Kontrol ve
deney grubu
kan viskozite
değerlerinin
karşılaştırılması



Osmotik direnç sınırları kontrol grubunda maksimal osmotik direnç sınırı $\%0.32 \pm 0.02$ NaCl, minimal osmotik direnç sınırı $\%0.52 \pm 0.01$ NaCl konsantrasyonlarında, % hemoliz farkı ise $\%40$ NaCl konsantrasyonlarında saptanmıştır. Deney grubunda maksimal osmotik direnç sınırı $\%0.52 \pm 0.05$ minimal osmotik direnç sınırı $\%64 \pm 0.05$, % hemoliz farkı $\%0.60 \pm 0.05$ NaCl konsantrasyonlarında bulunmuştur (Şekil 3, 4). Yapılan istatistiksel değerlendirmede eritrositlerin osmotik dirençlerinin deney grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığı bulunmuştur. Benzer şekilde kan viskozite değerleri de kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır (Tablo I).



Şekil 3. Standart hemoliz eğrisi



Şekil 4. Hemolitik inkrement eğrisi

TARTIŞMA ▲

Araştırmamızda kurşun asetat katkılı yemle beslenen deney grubu sığanların kan kurşun konsantrasyonu kontrol grubuna göre anamlı olarak yüksek bulundu. Kandaki kurşun konsantrasyonu verilen kurşun miktarı ve verilme süresine bağlı olarak değişiklik gösterir.^{9,10} Kurşun eritrositlerin yaşam süresini kısaltmakta ve hem sentezini bozmaktadır. Ayrıca koproporfirinojen dekarboksilazı da inhibe eder. Yine kurşun demirin protoporfirin IX'a bağlanması kuvvetle bloke eder ve hipokrom anemi ile eritrosit deformasyon-larına yol açar.^{2,11} Bu bilgiler çalışmamızdaki eritrosit sayısındaki azalmayı açıklayıcı yöndedir. Yine kurşun eritrositlere bağlandığında membran bütünlüğünün bozulmasına yol açmaktadır. Glikolizi inhibe ederek eritrositlerde ATP seviyesini düşürdüğü gösterilmiştir. Ayrıca eritrosit membranlarının $\text{Na}^+ \text{-K}^+$ ATPaz aktivitesini inhibe etmektedir.^{12,13} Kurşuna maruz kalan eritrositlerin rigid bir form kazandığı, eritrositlerin sferosit bir form oluşturduğu bildirilmektedir.^{14,15} Ayrıca eritrositlerin agregasyon özelliğinde azalma söz konusudur, bu rigid hücreler kolaylıkla tekrar bir araya gelemezler. Çalışmamızda kurşuna maruz kalan gruptaki viskozite azalmasının bu oluşumlardan olduğu düşünülmektedir. Bulgularımızda kurşuna maruz kalan sığanların kan viskozitelerinin kontrollere göre azalması eritrosit sayısında azalma ve %Hct değerlerinin düşmesiyle de açıklanabilmektedir. Araştırmamızda kurşuna maruz bırakılan sığanlarda kurşunun eritrosit membranı üzerine etkisini araştırmak için yaptığımız osmotik direnç ölçümleri sonunda, kurşunun eritrositlerin osmotik dirençlerini büyük oranda düşürdüğü görülmüştür. Çalışmamızda deney grubunda osmotik frajilite normale göre oldukça yüksek bulunmuştur. Hipotonik NaCl çözeltilerinde min osmotik direnç sınırı $\%0.64 \pm 0.05$ NaCl, max osmotik direnç sınırı $\%0.52 \pm 0.05$ NaCl olarak bulunmuştur. Maksimal hemolizin erken olması kurşunun eritrositin osmotik direncini büyük oranda düşürduğunu göstermektedir. Hemolitik inkrementinde $\% 0.60 \pm 0.05$ NaCl konsantrasyonunda büyük bir pik yapması da bunu doğrulamaktadır. Normalde % hemoliz farkı, en yüksek düzeyde $\%0.40$ NaCl çözeltisinde bulunmaktadır.

Yapılan çalışmalarda, kurşunun eritrositlerin normal şeklini bozarak sferositoz oluşturduğu ve sferosit formdaki eritrositlerin daha rigid olduğu gösterilmiştir.¹⁴⁻¹⁶ Kurşun Na⁺ ATPaz aktivitesini bozduğu için hücre içeresine sodyum girişi fazla olmakta ve hücrenin osmotik basıncını yükseltmektedir. Ayrıca kurşun ATP düzeyini düşürdüğü için sodyumu dışarı atacak enerji sağlanamamaktadır. Bu nedenle eritrositlere giren su molekülleri hücrelerde osmotik hemolize neden olmaktadır. Osmotik direnç ile ilgili bulgularımız osmotik hemolizi destekler yönündedir.

ÖZET ▲

Bu çalışmamızda diet ile alınan kuşunun kan viskozitesi ve eritrosit osmotik direnci tüberine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 14 Wistar Albino türü dişi sıçan kontrol ve deney grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney süresince her iki grup aynı tür katı yem ile beslenirken deney grubu sıçanlarının içme suyuna kurşun asetat katıldı. Dört hafta süren deney sonunda abdominal aortadan alınan kan örneklerinde kan kurşun konsantrasyonları ölçümlü, kan viskozitesi ve osmotik direnç tayini yapıldı.

Deney grubu sıçanlarda kan kurşun konsantrasyonlarının kontrollere göre arttığı, maksimal ve minimal osmotik dirence anlamlı azalma olduğu ve kan viskozitesi değerlerinin kontrol değerlerine göre anlamlı olarak azlığı saptandı.

Bulgularımız içecek ile alınan kurşunun eritrositlerin osmotik direncini azalttığını, olasılıkla sferosit yapı oluşumu ile osmotik frajilité de artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca kurşunun kan viskozitesini de azalttığı ve kan kurşun konsantrasyonunu artttığı saptanmıştır.

KAYNAKLAR ▲

1. Sanlı Y, Kaya S, Prinçci İ, Yavuz H, Baydan E, Demet Ö, Bilgili A. Veteriner Klinik Toksikoloji (Kaya S. Ed.), Medisan Yayınevi, 1995; 72-90.
2. Masci O, Carelli G, Vinci F, Castellino N. Blood lead concentration and biological effects in workers exposed to very low lead levels. J Occup Environ Med 1998; 40: 886-894.
3. Heard MJ, Chamberlain AC. Effect of minerals and food on uptake of lead from the gastrointestinal tract in humans. Human Toxicol 1982; 1: 411-415.
4. Trace elements in human nutrition and health. World Health Organization. Genava, 1996; 123-141.
5. Air Quality Guidelines For Europe. Who Regional Publication, European Series No. 23, 1987.
6. Wells RE, Denton R, Merrill EW. Measurement of viscosity of biologic fluids by cone-plate viscometer. J Lab Clin Med 1961; 57: 646-656.
7. Suess J, Limington D, Dameshek W, Dolloft JMA. Quantitative method for the determination and charting of erythrocyte hypotonic fragility. Blood 1954; 3: 1250-1303.
8. Taylor A, Brown A. Simple and rapid procedure for the determination of lead whole blood by use of a slotted tube and discrete nebulisation flame atomic-absorption spectrometry. Analyst 1983; 7: 1159-1161.
9. Humphreys DJ. Effects of exposure to excessive quantities of lead on animals. Br Veterinary J 1991; 147: 18-30.
10. Roberts RD, Johnson MS, Hutton M. Lead contamination of small mammals from

- abandoned metalliferous mines. Environ Pollut 1978; 15: 61-69.
11. Zimmermann L, Pages N, Antebi H, Hafi A, Boudane C, Alminder LG. Lead effect on oxidation resistance of erythrocyte membrane in rat triton-induced hyperlipidemia. Biol Trace Elem Res Sep 1993; 38: 311-318.
 12. Grabowska M, Gumińska M. The effect of lead on lactate formation, ATP level and membrane ATPase activities in human erythrocytes *in vitro*. Int J Occup Med Environ Health 1996; 9: 265-274.
 13. Jehan ZS, Motlag DB. Metal induced changes in the erythrocyte membrane of rats. Toxicol Lett 1995; 78: 127-133.
 14. Osterrode W. Hemorheology in occupational lead exposure. Scand J Work Environ Health 1996; 22: 369-373.
 15. Skerfving S, Gerhardsson L, Schütz A, Strömberg U. Lead- biological monitoring of exposure and effects. J Trace Elem Exp Med 1998; 11: 289-301.
 16. La Celle PL. Effect of spherling on erythrocyte deformability. Biochim 1972; 9: 51-59.

Anahtar Kelimeler: Osmotik direnç, Viskozyite, Kurşun; **Key Words:** Osmotic resistance, Viscosity, Lead; **Aldığı Tarih:** 14 Temmuz 1999; **Dr. Durviç Özçelik, Doç.** Dr. Selmin Toplam, Msc.Tevfik Gülyasar, Prof. Dr. Şefik Dursun; İÜ Cerrahpaşa Tip Fakültesi Temel Bilimler Biyofizik Anabilim Dah; Doç. Dr. Nuran Daryerfi; İÜ Cerrahpaşa Tip Fakültesi Temel Bilimler Fizyoloji Anabilim Dah; **Yazışma Adresi (Address):** Dr. D. Özçelik, İÜ Cerrahpaşa Tip Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dah, 34303, Cerrahpaşa, İstanbul.

