

CONTRIBUTIONS TO TIPULIDAE OF TURKEY (INSECTA, DIPTERA)¹

Özgür SERÇE

Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Fen Bilgisi Öğretmeni, 48500 Yatağan, Muğla / Türkiye

Hasan KOÇ*

Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48170 Kötekli, Muğla / Türkiye
e-mail: khasan@mu.edu.tr

ABSTRACT

This study is based on researches that is done in towns of Denizli province, which is Kale, Tavas, Acıpayam., Beyağaç, Çameli, between April 2002 and May 2003, 506 specimens belonging to 35 taxa are investigated from faunistigical and phenological points. *Tipula (Lunatipula) selenis* Loew and *Tipula (Lunatipula) vermoeleni* Theischinger are new records for Tipulidae fauna of Turkey and also 30 taxa for research area, too.

Key words: Diptera, Tipulidae, Fauna, Turkey, Denizli province

TÜRKİYE TIPULIDAE FAUNASINA KATKILAR (INSECTA: DIPTERA)²

ÖZET

Bu çalışma, Denizli ilinin Kale, Tavas, Acıpayam, Beyağaç ve Çameli ilçe sınırları dahilinde Nisan 2002 ile Mayıs 2003 tarihleri arasında yapılan arazi çalışmalarına dayanmaktadır. Toplam 35 taksona ait 506 Tipulid örneği faunistik ve fenolojik yönden incelenmiştir. *Tipula (Lunatipula) selenis* Loew ve *Tipula (Lunatipula) vermoeleni* Theischinger Türkiye Tipulidae faunası için ve 30 takson da araştırma bölgesinde ilk kez kaydedilmektedir

Anahtar Kelimeler: Diptera, Tipulidae, Fauna, Türkiye, Denizli

1. GİRİŞ

Genellikle akarsu kenarlarındaki çayırlık, fundalık ve orman gibi nemli ve gölgeli yerlerde bulunan tipulid'ler iri vücutları, uzun bacakları ve hantal uçuşları ile kolayca tanınabilen nematocerlerdir. Toraksın dorsalinde "V" şeklindeki ek yeri en karakteristik özellikleridir.

Tipulidae dünyada yaklaşık 4200, Palearktik bölgede 17 cins ve 33 altçinse dahil yaklaşık 1250, Avrupa'da ise 400 türle temsil edilmektedir (1, 2).

Tipulidae'ye ait Yunanistan'dan 163, Ermenistan'dan 59, Gürcistan'dan 67, Bulgaristan'dan 56, Azerbaycan'dan 52, İran'dan 28 ve Suriye'den 8 tür bilinmektedir (2). Irak'ın Tipulidae faunası ile ilgili olarak herhangi bir kayıt mevcut değildir. Türkiye'den ise şimdije kadar toplam 132 tür kaydedilmiş olup bunların 55'ü endemik, 68 tanesinin de tip lokalitesi Türkiye'dedir (3, 4).

1. INTRODUCTION

Tipulidae usually associated moist and shadowy environtments of forested or open areas such as swamps, marshes and meadows. Adults characterized by large body, long legs and clumsy fly. Thorax with a transverse V- shaped mesonotal suture.

Tipulidae is represented by approximately 4200 species in worldwide, 1250 species belonging to 17 genus and 33 subgenus in Paleaarchtic, 400 species in Europea (1, 2).

163 Tipulid species are known from Greece, 59 Tipulid species are known from Armenia, 67 Tipulid species are known from Georgia, 56 Tipulid species are known from Bulgaria, 52 Tipulid species are known from Azerbaijan, 28 Tipulid species are known from Iran and 8 Tipulid species are known from Syria. Tipulidae fauna of Iraq isn't known (2). 132 Tipulidae species whose 55 species are endemic and type- locality of 68 species in Turkey are known in Turkey (3, 4).

¹ This is a summary of the M. Sc.Thesis.

² Yüksek Lisans tezinin kısa bir özetiştir.

2. MATERYAL VE METOD

Nisan 2002 ile Mayıs 2003 tarihleri arasında Denizli ilinin güneyinde yer alan Kale, Tavas, Acıpayam, Beyağaç ve Çameli ilçe sınırları dahilinde Tipulidlerin bulunabileceği ortamlarda arazi çalışmaları yapılarak tipulid örnekleri toplanmıştır. Arazi çalışmalarının iklim şartları da dikkate alınarak belirli periyotlar halinde yapılmasına özen gösterilmiştir.

Örnekler gündüz saatlerinde atrap ve ay ışığının olmadığı nemli bazı gecelerde ise basit ışık tuzağı ile yakalanıp etil asetatlı şişelerde öldürülmuştur. Öldürülen örnekler, önceden hazırlanan böcek zarflarına alınarak arazi defterinde habitat bilgilerinin de yer aldığı lokalite numaraları ile numaralandırılmıştır. Laboratuara getirilen örnekler yumuşatma kaplarına alınmış; yumuşatılan örneklerin kanat, anten ve bacakları düzeltilerek iğnelenmiş ve standart müze materyali tipinde etiketlenmiştir.

Ayrıca yumuşatılan örneklerden bazlarının teşhis amacıyla genital preparasyonları yapılmıştır. Örneklerin teşhislerinde ülkemiz ve palearktik türlerin yayılışları ile ilgili kataloglar kullanılmıştır (1, 5-9). Teşhisleri yapılan türler ilgili makalelerle kontrol edilmiştir [*Nephrotoma* (10-18), *Tipula* (*Tipula*) (19), *Tipula* (*Yamatotipula*) (20), *Tipula* (*Acutipula*) (21-22), *Tipula* (*Lunatipula*) (23-29) ve *Tipula* (*Mediotipula*) (30)]. Ayrıca teşhis edilerek standart müze materyali tipinde etiketlenmiş Gazi ve Muğla Üniversitesi Biyoloji bölümlerindeki koleksiyon örnekleriyle de karşılaştırılmıştır.

Teships işlemlerinden sonra örneklerin bir kısmı iğnelenerek, diğer bir kısmı ise böcek zarfları içinde olmak üzere Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji laboratuvarında Dr. Hasan KOÇ'un koleksiyonunda muhafaza altına alınmıştır.

Araştırma alanından tespit edilen türler toplandığı lokaliteleri ile birlikte verilmiştir. Ayrıca araştırma alanındaki yatay yayılışları ile uçuş zamanları tablolar halinde düzenlenmiştir.

3. BULGULAR

3. 1. *Nephrotoma appendiculata appendiculata* (Pierre, 1919)

Lokalite: Denizli. Kale: Koçarboğazı Köyü Çıkışı (37° 23' N/ 28° 53' E), 1240 m., 09.05.2003, 2 ♂♂. Toplam: 2 ♂♂.

3. 2. *Nephrotoma croceiventris lindneri* (Mannheims, 1951)

Lokalite: Denizli. Beyağaç: Kızılıağac Köyü (37° 16' N/ 28° 52' E), 906 m., 18.05.2002, 1 ♀, Kartal Gölüne 2 km kala (37° 05' N/ 28° 50' E), 1851 m., 20.06.2002, 1 ♂, Kartal Gölü (37° 05' N/ 28° 50' E), 1950 m. 20.06.2002, 1 ♂, 1 ♀, Kartal Gölü Koruma Alanına 2 km (37° 07' N/ 28° 51' E), 1410 m., 09.05.2003, 1 ♂. Tavas: Kızılca Köyü (37° 29' N/ 29° 09' E), 1133 m., 22.04.2003, 5 ♂♂, 3 ♀♀. Kale: Koçarboğazı Köyü Çıkışı (37° 23' N/ 28° 53' E),

2. MATERIAL AND METHODS

In Kale, Tavas, Acıpayam, Beyağaç and Çameli, which are in the south of Denizli county are work has been carried out where tipulids specimens were collected from April 2002 to May 2003. Climate conditions were also take into consideration and researches were carried out within determined periods.

Specimens were captured through hand-net during daytime and when there is no moonlight, at night, they were captured using simple light traps and killed in te bottles which contained ethyl acetat. Dead specimens were put into insect envelops and preserved. Samples brought to laboratory were softened and their wings, legs, antenna smooted, pinned and labelled.

Moreover genital preparations of some of the specimens have been done. When diagnosing the specimens, catalogues belonging to our country and catalogues related with extension of specimens have been used (1, 5-9). Specimens diagnosed were controlled through related articles [*Nephrotoma* (10-18), *Tipula* (*Tipula*) (19), *Tipula* (*Yamatotipula*) (20), *Tipula* (*Acutipula*) (21-22), *Tipula* (*Lunatipula*) (23-29) and *Tipula* (*Mediotipula*) (30)]. These specimens were also compared with the specimens' collections at Muğla University and Gazi University, Department of Biology.

Some specimens are pinned and labelled. These specimens are preserved in collections box. Remain of this specimens are enveloped. All specimens are kept in laboratory of Muğla University Science and Art Faculty, Department of Biology.

Species that determined from research area were given with its locality. In addition horizontal distribution of each specimen according to county and flying periods were also illustrated in tables.

3. RESULTS

3. 1. *Nephrotoma appendiculata appendiculata* (Pierre, 1919)

Localities: Denizli. Kale: Koçarboğazı village (37° 23' N/ 28° 53' E), 1240 m., 09.05.2003, 2 ♂♂. Total: 2 ♂♂.

3. 2. *Nephrotoma croceiventris lindneri* (Mannheims, 1951)

Localities: Denizli. Beyağaç: Kızılıağac village (37° 16' N/ 28° 52' E), 906 m., 18.05.2002, 1 ♀, Kartal Lake (37° 05' N/ 28° 50' E), 1851 m., 20.06.2002, 1 ♂, Kartal Lake (37° 05' N/ 28° 50' E), 1950 m. 20.06.2002, 1 ♂, 1 ♀, Kartal Lake (37° 07' N/ 28° 51' E), 1410 m., 09.05.2003, 1 ♂. Tavas: Kızılca village (37° 29' N/ 29° 09' E), 1133 m., 22.04.2003, 5 ♂♂, 3 ♀♀. Kale: Koçarboğazı village (37° 23' N/ 28° 53' E), 1240 m., 09.05.2003, 1 ♂, 1 ♂. Acıpayam: Eskiköy village, 10.05.2003, 1 ♂. Total: 10

1240 m., 09.05.2003, 1 ♂, 1 ♂. Acıpayam: Eskiköy, 10.05.2003, 1 ♂. Toplam: 10 ♂♂, 5 ♀♀.

3. 3. *Nephrotoma guestfalica questfalica* (Westhoff, 1879)

Lokalite: Denizli. Acıpayam: Kelekçi Köyü (37° 15' N/ 29° 18' E), 833 m., 08.06.2002, 1 ♂, 1 ♀. Toplam: 1 ♂, 1 ♀.

3. 4. *Nephrotoma quadrifaria quadrifaria* (Meigen, 1804)

Lokalite: Denizli. Tavas: Karacasu Yolu, Dünberek Dere (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 1 ♂. Acıpayam: Kelekçi Köyü (37° 15' N/ 29° 18' E), 833 m., 08.06.2002, 1 ♀. Toplam: 1 ♂, 1 ♀.

3. 5. *Nephrotoma theowaldi* Oosterbroek, 1978

Lokalite: Denizli. Kale: Muğla Çıkışı (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 1 ♂, Alanyurt Köyü (37° 21' N/ 28° 46' E), 1230 m., 18.05.2002, 4 ♂♂, 1 ♀; Beyağaç Yolu 2. km. (37° 26' N/ 28° 51' E), 1129 m., 25.05.2002, 2 ♂♂, 1 ♀; Muğla Yolu 1. km. (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 22.04.2003, 7 ♂♂, 1 ♀; Ebicek Köyü Çıkışı 3. km., 22.04.2003, 5 ♂♂, 2 ♀♀; Koçarboğazı Köyü (37° 23' N/ 28° 53' E), 1240 m., 09.05.2003, 9 ♂♂, 2 ♀♀; Koçarboğazı Köyü Çıkışı 3. km. (37° 22' N/ 28° 52' E), 1240 m., 09.05.2003, 2 ♂♂. Tavas: Yukarıboğaz Köyü (37° 21' N/ 29° 00' E), 1167 m., 18.05.2002, 1 ♂; Derekuyu Çıkışı (37° 15' N/ 29° 00' E), 1050 m., 18.05.2002, 6 ♂♂, 3 ♀♀; Dereagzı Köyü, 18.05.2002, 3 ♂♂, 1 ♀; Kızılcabölük Köyü (37° 40' N/ 29° 05' E), 1114 m., 08.06.2002, 1 ♂; Pınarlar Köyü (37° 30' N/ 29° 05' E), 1010 m., 22.04.2003, 1 ♀; Derekuyu Çıkışı (37° 15' N/ 29° 00' E), 1050 m., 09.05.2003, 5 ♂♂, 1 ♀; Pınarlı Yolu 6. km. (37° 38' N/ 29° 04' E), 1039 m., 10.05.2003, 2 ♂♂; Karacasu Yolu Dünberek Dere (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 10.05.2003, 3 ♂♂, 2 ♀♀; Pınarlar Köyü (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 10.05.2003, 2 ♀♀. Acıpayam: Eskiköy (37° 12' N/ 29° 20' E), 1137 m., 10.05.2003, 1 ♀. Çameli: Belevi Köyü (37° 06' N/ 29° 22' E), 1482 m., 10.05.2003, 2 ♀♀. Toplam: 60 ♂♂, 17 ♀♀.

3. 6. *Tipula (Tipula) orientalis* Lackschewitz, 1930

Lokalite: Denizli. Acıpayam, Burdur İl sınırı, 05.05.2002, 5 ♂♂, 1 ♀. Tavas: Pınarlar Köyü (37° 30' N/ 29° 05' E), 979 m., 18.05.2002, 4 ♂♂, 3 ♀♀; Pınarlar Köyü (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 22.04.2003, 2 ♂♂, 2 ♀♀; Karacasu Yolu Dünberek Dere (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 10.05.2003, 1 ♀. Çameli: Belevi Köyü (37° 06' N/ 29° 22' E), 1482 m., 10.05.2003, 2 ♀♀. Toplam: 11 ♂♂, 9 ♀♀.

3. 7. *Tipula (Yamatotipula) caesia* Schummel, 1933

Lokalite: Denizli. Acıpayam: Akalan Köyü (37° 22' N/ 29° 17' E), 1112 m., 25.05.2002, 1 ♂. Toplam: 1 ♂.

3. 8. *Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis* Meigen, 1804

Lokalite: Denizli. Tavas: Kızılcabölük Köyü (37° 39' N/ 29° 02' E), 992 m., 08.06.2002, 2 ♂♂; Karacasu Yolu, Dünberek Dere (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 1 ♂; Pınarlar Köyü (37° 30' N/ 29° 05' E),

♂♂, 5 ♀♀.

3. 3. *Nephrotoma guestfalica questfalica* (Westhoff, 1879)

Localities: Denizli. Acıpayam: Kelekçi village (37° 15' N/ 29° 18' E), 833 m., 08.06.2002, 1 ♂, 1 ♀. Total: 1 ♂, 1 ♀.

3. 4. *Nephrotoma quadrifaria quadrifaria* (Meigen, 1804)

Localities: Denizli. Tavas: Karacasu road, Dünberek stream (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 1 ♂. Acıpayam: Kelekçi village (37° 15' N/ 29° 18' E), 833 m., 08.06.2002, 1 ♀. Total: 1 ♂, 1 ♀.

3. 5. *Nephrotoma theowaldi* Oosterbroek, 1978

Localities: Denizli. Kale: Muğla (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 1 ♂, Alanyurt village (37° 21' N/ 28° 46' E), 1230 m., 18.05.2002, 4 ♂♂, 1 ♀; Beyağaç road 2. km. (37° 26' N/ 28° 51' E), 1129 m., 25.05.2002, 2 ♂♂, 1 ♀; Muğla road 1. km. (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 22.04.2003, 7 ♂♂, 1 ♀; Ebicek village 3. km., 22.04.2003, 5 ♂♂, 2 ♀♀; Koçarboğazı village (37° 23' N/ 28° 53' E), 1240 m., 09.05.2003, 9 ♂♂, 2 ♀♀; Koçarboğazı village 3. km. (37° 22' N/ 28° 52' E), 1240 m., 09.05.2003, 2 ♂♂. Tavas: Yukarıboğaz village (37° 21' N/ 29° 00' E), 1167 m., 18.05.2002, 1 ♂; Derekuyu (37° 15' N/ 29° 00' E), 1050 m., 18.05.2002, 6 ♂♂, 3 ♀♀; Dereagzı village, 18.05.2002, 3 ♂♂, 1 ♀; Kızılcabölük village (37° 40' N/ 29° 05' E), 1114 m., 08.06.2002, 1 ♂; Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 1010 m., 22.04.2003, 1 ♀; Derekuyu village (37° 15' N/ 29° 00' E), 1050 m., 09.05.2003, 5 ♂♂, 1 ♀; Pınarlı village road 6. km. (37° 38' N/ 29° 04' E), 1039 m., 10.05.2003, 2 ♂♂; Karacasu road Dünberek stream (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 10.05.2003, 3 ♂♂, 2 ♀♀; Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 10.05.2003, 2 ♀♀. Acıpayam: Eskiköy village (37° 12' N/ 29° 20' E), 1137 m., 10.05.2003, 1 ♀. Çameli: Belevi village (37° 06' N/ 29° 22' E), 1482 m., 10.05.2003, 3 ♂♂. Total: 60 ♂♂, 17 ♀♀.

3. 6. *Tipula (Tipula) orientalis* Lackschewitz, 1930

Localities: Denizli. Acıpayam, 05.05.2002, 5 ♂♂, 1 ♀. Tavas: Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 979 m., 18.05.2002, 4 ♂♂, 3 ♀♀; Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 22.04.2003, 2 ♂♂, 2 ♀♀; Karacasu road Dünberek stream (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 10.05.2003, 1 ♀. Çameli: Belevi village (37° 06' N/ 29° 22' E), 1482 m., 10.05.2003, 2 ♀♀. Total: 11 ♂♂, 9 ♀♀.

3. 7. *Tipula (Yamatotipula) caesia* Schummel, 1933

Localities: Denizli. Acıpayam: Akalan village (37° 22' N/ 29° 17' E), 1112 m., 25.05.2002, 1 ♂. Total: 1 ♂.

3. 8. *Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis* Meigen, 1804

Localities: Denizli. Tavas: Kızılcabölük village (37° 39' N/ 29° 02' E), 992 m., 08.06.2002, 2 ♂♂; Karacasu road, Dünberek stream (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 1 ♂; Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E),

1042 m., 22.04.2003, 1 ♀; Kızılca-Acipayam Yolu 15 km kala ($37^{\circ} 27' N/ 29^{\circ} 13' E$), 1287 m., 22.04.2003, 6 ♂♂, 1 ♀. Acipayam: Çakır Köyü ($37^{\circ} 18' N/ 29^{\circ} 20' E$), 831 m., 08.06.2002, 2 ♂♂; Eskiköy ($37^{\circ} 12' N/ 29^{\circ} 20' E$), 1137 m., 10.05.2003, 1 ♂. Beyağaç: Kale Yolu 5.km. ($37^{\circ} 13' N/ 28^{\circ} 52' E$), 656 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kale Yolu 25.km. ($37^{\circ} 10' N/ 28^{\circ} 52' E$), 1050 m., 20.06.2002, 1 ♀; Kartal Gölü 5. km. ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1495 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kartal Gölü Koruma Alanı ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1460 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kartal Gölüne 5 km. ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1495 m., 09.05.2003, 1 ♀; Kartal Gölü Koruma Alanına 2 km. ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 51' E$), 1433 m., 09.05.2003, 1 ♂; Kartal Gölü Koruma Alanına 3 km. ($37^{\circ} 08' N/ 28^{\circ} 51' E$), 1349 m., 09.05.2003, 1 ♂, 2 ♀♀. Kale: Muğla Çıkışı 1. km. ($37^{\circ} 25' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1008 m., 22.04.2003, 6 ♂♂. Çameli: Belevi Köyü ($37^{\circ} 06' N/ 29^{\circ} 22' E$), 1482 m., 10.05.2003, 10 ♂♂, 3 ♀♀. Toplam: 34 ♂♂, 8 ♀♀.

3. 9. *Tipula (Yamatotipula) submontium Theowald et Oosterbroek, 1981*

Lokalite: Denizli. Tavas: Pınarlar Köyü ($37^{\circ} 30' N/ 29^{\circ} 05' E$), 1010 m., 18.05.2002, 5 ♂♂, 1 ♀. Beyağaç: Kartal Gölü Koruma Alanı ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1433 m., 20.06.2002, 1 ♂. Toplam: 6 ♂♂, 1 ♀.

3. 10. *Tipula (Acutipula) isparta Vermoolen, 1983*

Lokalite: Denizli. Beyağaç: Kale Yolu 5. km. ($37^{\circ} 13' N/ 28^{\circ} 52' E$), 656 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kale Yolu 25. km. ($37^{\circ} 10' N/ 28^{\circ} 52' E$), 1050 m., 20.06.2002, 2 ♀♀; Kartal Gölü Koruma Alanı ($37^{\circ} 04' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1460 m., 20.06.2002, 1 ♀. Toplam: 1 ♂, 3 ♀♀.

3. 11. *Tipula (Acutipula) latifurca Vermoolen, 1983*

Lokalite: Denizli. Acipayam: Akalan Köyü ($37^{\circ} 22' N/ 29^{\circ} 17' E$), 1112 m., 25.05.2002, 1 ♂. Beyağaç: Kartal Gölü Koruma Alanı ($37^{\circ} 04' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1460 m., 20.06.2002, 1 ♂. Tavas: Karacasu Yolu Dünberek Dereesi ($37^{\circ} 37' N/ 28^{\circ} 55' E$), 895 m., 10.05.2003, 2 ♂♂, 1 ♀. Toplam: 4 ♂♂, 1 ♀.

3. 12. *Tipula (Lunatipula) borysthenica Savchenko, 1952*

Lokalite: Denizli. Acipayam: Burdur İl Sınırı, 05.05.2002, 1 ♂, 1 ♀. Toplam: 1 ♂, 1 ♀.

3. 13. *Tipula (Lunatipula) carens Theischinger, 1987*

Lokalite: Denizli. Tavas: Karacasu Yolu Dünberek Dereesi ($37^{\circ} 37' N/ 28^{\circ} 55' E$), 895 m. 08.06.2003, 1 ♂. Toplam: 1 ♂.

3. 14. *Tipula (Lunatipula) dedecor Loew, 1873*

Lokalite: Denizli. Tavas: Pınarlar Köyü Çıkışı ($37^{\circ} 30' N/ 29^{\circ} 05' E$), 1042 m., 18.05.2002, 1 ♂; Yukarıboğaz Köyü ($37^{\circ} 21' N/ 29^{\circ} 00' E$), 1067 m., 18.05.2002, 3 ♂♂; Derekuyu Çıkışı ($37^{\circ} 15' N/ 29^{\circ} 00' E$), 1050 m., 18.05.2002, 1 ♂; Pınarlar Köyü Çıkışı ($37^{\circ} 30' N/ 29^{\circ} 05' E$), 1042 m., 22.04.2003, 4 ♂♂, 1 ♀; Derekuyu Çıkışı ($37^{\circ} 15' N/ 29^{\circ} 00' E$), 1050 m., 09.05.2003, 1 ♂; Pınarlar Köyü Çıkışı ($37^{\circ} 30' N/ 29^{\circ} 05' E$), 1042 m., 10.05.2003, 8 ♂♂, 2 ♀♀. Kale: Alanyurt Köyü ($37^{\circ} 21' N/ 28^{\circ} 46' E$), 1230 m., 18.05.2002, 1 ♂; Koçarboğazı Köyü ($37^{\circ} 22' N/ 28^{\circ} 55' E$), 1042 m., 22.04.2003, 6 ♂♂, 1 ♀.

1042 m., 22.04.2003, 1 ♀; Kızılca-Acipayam road ($37^{\circ} 27' N/ 29^{\circ} 13' E$), 1287 m., 22.04.2003, 6 ♂♂, 1 ♀. Acipayam: Çakır village ($37^{\circ} 18' N/ 29^{\circ} 20' E$), 831 m., 08.06.2002, 2 ♂♂; Eskiköy village ($37^{\circ} 12' N/ 29^{\circ} 20' E$), 1137 m., 10.05.2003, 1 ♂. Beyağaç: Kale road 5.km. ($37^{\circ} 13' N/ 28^{\circ} 52' E$), 656 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kale road 25.km. ($37^{\circ} 10' N/ 28^{\circ} 52' E$), 1050 m., 20.06.2002, 1 ♀; Kartal Lake 5. km. ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1495 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kartal Lake about 5 km. ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1495 m., 09.05.2003, 1 ♀; Kartal Lake 2 km. ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 51' E$), 1433 m., 09.05.2003, 1 ♂; Kartal Lake about 3 km. ($37^{\circ} 08' N/ 28^{\circ} 51' E$), 1349 m., 09.05.2003, 1 ♂, 2 ♀♀. Kale: Muğla Çıkışı 1. km. ($37^{\circ} 25' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1008 m., 22.04.2003, 6 ♂♂. Çameli: Belevi village ($37^{\circ} 06' N/ 29^{\circ} 22' E$), 1482 m., 10.05.2003, 10 ♂♂, 3 ♀♀. Total: 34 ♂♂, 8 ♀♀.

3. 9. *Tipula (Yamatotipula) submontium Theowald et Oosterbroek, 1981*

Localities: Denizli. Tavas: Pınarlar village ($37^{\circ} 30' N/ 29^{\circ} 05' E$), 1010 m., 18.05.2002, 5 ♂♂, 1 ♀. Beyağaç: Kartal Lake ($37^{\circ} 07' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1433 m., 20.06.2002, 1 ♂. Total: 6 ♂♂, 1 ♀.

3. 10. *Tipula (Acutipula) isparta Vermoolen, 1983*

Localities: Denizli. Beyağaç: Kale road 5. km. ($37^{\circ} 13' N/ 28^{\circ} 52' E$), 656 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kale road 25. km. ($37^{\circ} 10' N/ 28^{\circ} 52' E$), 1050 m., 20.06.2002, 2 ♀♀; Kartal Lake ($37^{\circ} 04' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1460 m., 20.06.2002, 1 ♀. Total: 1 ♂, 3 ♀♀.

3. 11. *Tipula (Acutipula) latifurca Vermoolen, 1983*

Localities: Denizli. Acipayam: Akalan village ($37^{\circ} 22' N/ 29^{\circ} 17' E$), 1112 m., 25.05.2002, 1 ♂. Beyağaç: Kartal Lake ($37^{\circ} 04' N/ 28^{\circ} 50' E$), 1460 m., 20.06.2002, 1 ♂. Tavas: Karacasu road Dünberek stream ($37^{\circ} 37' N/ 28^{\circ} 55' E$), 895 m., 10.05.2003, 1 ♂. Total: 4 ♂♂, 1 ♀.

3. 12. *Tipula (Lunatipula) borysthenica Savchenko, 1952*

Localities: Denizli. Acipayam: 05.05.2002, 1 ♂, 1 ♀. Total: 1 ♂, 1 ♀.

3. 13. *Tipula (Lunatipula) carens Theischinger, 1987*

Localities: Denizli. Tavas: Karacasu road Dünberek Dereesi ($37^{\circ} 37' N/ 28^{\circ} 55' E$), 895 m. 08.06.2003, 1 ♂. Total: 1 ♂.

3. 14. *Tipula (Lunatipula) dedecor Loew, 1873*

Localities: Denizli. Tavas: Pınarlar village ($37^{\circ} 30' N/ 29^{\circ} 05' E$), 1042 m., 18.05.2002, 1 ♂; Yukarıboğaz village ($37^{\circ} 21' N/ 29^{\circ} 00' E$), 1067 m., 18.05.2002, 3 ♂♂; Derekuyu village ($37^{\circ} 15' N/ 29^{\circ} 00' E$), 1050 m., 18.05.2002, 1 ♂; Pınarlar village ($37^{\circ} 30' N/ 29^{\circ} 05' E$), 1042 m., 22.04.2003, 4 ♂♂, 1 ♀; Derekuyu village ($37^{\circ} 15' N/ 29^{\circ} 00' E$), 1050 m., 09.05.2003, 1 ♂; Pınarlar village ($37^{\circ} 30' N/ 29^{\circ} 05' E$), 1042 m., 10.05.2003, 8 ♂♂, 2 ♀♀. Kale: Alanyurt village ($37^{\circ} 21' N/ 28^{\circ} 46' E$), 1230 m., 18.05.2002, 1 ♂; Koçarboğazı village ($37^{\circ} 22' N/ 28^{\circ} 55' E$), 1042 m., 22.04.2003, 6 ♂♂, 1 ♀.

28° 52' E), 1230 m., 25.05.2002, 1 ♂; Koçarboğazı Köyü Çıkışı (37° 22' N/ 28° 52' E), 1230 m. 09.05.2003, 13 ♂♂, 3 ♀♀; Koçarboğazı Köyü Çıkışı 3. km (37° 22' N/ 28° 52' E), 1240 m., 09.05.2003, 7 ♂♂, 2 ♀♀. Toplam: 40 ♂♂, 8 ♀♀.

3. 15. *Tipula (Lunatipula) dracula* Theischinger, 1977

Lokalite: Denizli, Kale (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 05.05.2002, 1 ♂; Koçarboğazı Köyü (37° 22' N/ 28° 52' E), 1230 m., 25.05.2002, 2 ♂♂, 2 ♀♀. Tavas: Yorga Köyü (37° 25' N/ 28° 70' E), 1130 m., 25.05.2002, 2 ♂♂; Tekke Köyü (37° 36' N/ 29° 09' E), 1134 m., 25.05.2002, 1 ♂; Pınarlar Köyü Çıkışı (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 10.05.2003, 5 ♂♂, 1 ♀. Acıpayam: Akalan Köyü Çıkışı 2. km (37° 21' N/ 29° 20' E), 1002 m., 25.05.2002, 1 ♀. Toplam: 12 ♂♂, 4 ♀♀.

3. 16. *Tipula (Lunatipula) franzressli* Theischinger, 1982

Lokalite: Denizli, Kale: Güngören Köyü (37° 35' N/ 28° 82' E), 650 m., 11.05.2002, 2 ♂♂. Toplam: 2 ♂♂.

3. 17. *Tipula (Lunatipula) furcula* Mannheims, 1954

Lokalite: Denizli, Beyağaç: Kale Yolu 25. km. (37° 10' N/ 28° 52' E), 1050 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kartal Gölü Koruma Alanı (37° 04' N/ 28° 50' E), 1460 m., 20.06.2002, 3 ♂♂. Toplam: 4 ♂♂.

3. 18. *Tipula (Lunatipula) helvola* Loew, 1873

Lokalite: Denizli, Kale: Muğla Çıkışı (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 1 ♂, 1 ♀; Alanyurt Köyü (37° 21' N/ 28° 46' E), 1230 m., 18.05.2002, 1 ♂; Muğla Çıkışı (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 20.06.2002, 1 ♂, 1 ♀. Tavas: Karacasu Yolu, Dünberek Dere (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 21 ♂♂, 14 ♀♀. Toplam: 24 ♂♂, 16 ♀♀.

3. 19. *Tipula (Lunatipula) huberti* Theischinger, 1982

Lokalite: Denizli, Tavas: Derekuyu Çıkışı (37° 15' N/ 29° 00' E), 1050 m., 18.05.2002, 1 ♂. Toplam: 1 ♂.

3. 20. *Tipula (Lunatipula) istriana* Erhan et Theowald, 1961

Lokalite: Denizli, Kale: Beyağaç Yolu 2. km. (37° 26' N/ 28° 51' E), 1129 m., 25.05.2002, 1 ♂; Kale Giriş (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 20.06.2002, 4 ♂♂. Tavas: Kızılcabölük Köyü (37° 37' N/ 29° 02' E), 992 m., 08.06.2002, 2 ♂♂; Kızılcabölük Köyü, Eski Denizli Yolu 15. km. (37° 40' N/ 29° 05' E), 1114 m., 08.06.2002, 1 ♂. Toplam: 7 ♂♂.

3. 21. *Tipula (Lunatipula) mendli* Martinovsky, 1976

Lokalite: Denizli, Tavas: Kızılcabölük (37° 37' N/ 29° 02' E), 992 m., 08.06.2002, 1 ♀. Kale: Merkez (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 20.06.2002, 1 ♂. Toplam: 1 ♂, 1 ♀.

3. 22. *Tipula (Lunatipula) neutra* Theischinger, 1982

Lokalite: Denizli, Kale: Muğla Çıkışı (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 2 ♂♂. Toplam: 2 ♂♂.

52' E), 1230 m., 25.05.2002, 1 ♂; Koçarboğazı village (37° 22' N/ 28° 52' E), 1230 m. 09.05.2003, 13 ♂♂, 3 ♀♀; Koçarboğazı village 3. km (37° 22' N/ 28° 52' E), 1240 m., 09.05.2003, 7 ♂♂, 2 ♀♀. Total: 40 ♂♂, 8 ♀♀.

3. 15. *Tipula (Lunatipula) dracula* Theischinger, 1977

Localities: Denizli, Kale (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 05.05.2002, 1 ♂; Koçarboğazı village (37° 22' N/ 28° 52' E), 1230 m., 25.05.2002, 2 ♂♂, 2 ♀♀. Tavas: Yorga village (37° 25' N/ 28° 70' E), 1130 m., 25.05.2002, 2 ♂♂; Tekke village (37° 36' N/ 29° 09' E), 1134 m., 25.05.2002, 1 ♂; Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 10.05.2003, 5 ♂♂, 1 ♀. Acıpayam: Akalan village 2. km (37° 21' N/ 29° 20' E), 1002 m., 25.05.2002, 1 ♀. Total: 12 ♂♂, 4 ♀♀.

3. 16. *Tipula (Lunatipula) franzressli* Theischinger, 1982

Localities: Denizli, Kale: Güngören village (37° 35' N/ 28° 82' E), 650 m., 11.05.2002, 2 ♂♂. Total: 2 ♂♂.

3. 17. *Tipula (Lunatipula) furcula* Mannheims, 1954

Localities: Denizli, Beyağaç: Kale road 25. km. (37° 10' N/ 28° 52' E), 1050 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kartal Lake (37° 04' N/ 28° 50' E), 1460 m., 20.06.2002, 3 ♂♂. Total: 4 ♂♂.

3. 18. *Tipula (Lunatipula) helvola* Loew, 1873

Localities: Denizli, Kale: Muğla (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 1 ♂, 1 ♀; Alanyurt village (37° 21' N/ 28° 46' E), 1230 m., 18.05.2002, 1 ♂; Muğla (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 20.06.2002, 1 ♂, 1 ♀. Tavas: Karacasu road, Dünberek stream (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 21 ♂♂, 14 ♀♀. Total: 24 ♂♂, 16 ♀♀.

3. 19. *Tipula (Lunatipula) huberti* Theischinger, 1982

Localities: Denizli, Tavas: Derekuyu village (37° 15' N/ 29° 00' E), 1050 m., 18.05.2002, 1 ♂. Total: 1 ♂.

3. 20. *Tipula (Lunatipula) istriana* Erhan et Theowald, 1961

Localities: Denizli, Kale: Beyağaç road 2. km. (37° 26' N/ 28° 51' E), 1129 m., 25.05.2002, 1 ♂; Kale (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 20.06.2002, 4 ♂♂. Tavas: Kızılcabölük village (37° 37' N/ 29° 02' E), 992 m., 08.06.2002, 2 ♂♂; Kızılcabölük village, Denizli old road 15. km. (37° 40' N/ 29° 05' E), 1114 m., 08.06.2002, 1 ♂. Total: 7 ♂♂.

3. 21. *Tipula (Lunatipula) mendli* Martinovsky, 1976

Localities: Denizli, Tavas: Kızılcabölük (37° 37' N/ 29° 02' E), 992 m., 08.06.2002, 1 ♀. Kale: Merkez (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 20.06.2002, 1 ♂. Total: 1 ♂, 1 ♀.

3. 22. *Tipula (Lunatipula) neutra* Theischinger, 1982

Localities: Denizli, Kale: Muğla (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 2 ♂♂. Total: 2 ♂♂.

3. 23. *Tipula (Lunatipula) oorschotorum* Theischinger, 1987

Lokalite: Denizli. Beyağaç: Kartal Gölü Zirveye 2 km. (37° 05' N/ 28° 50' E), 1851 m., 20.06.2002, 3 ♂♂; Kartal Gölü (37° 05' N/ 28° 60' E), 1950 m., 26.06.2002, 1 ♂. Toplam: 4 ♂♂.

3. 24. *Tipula (Lunatipula) pelostigma burdurafyonensis* Theischinger, 1987

Lokalite: Denizli. Acıpayam: Burdur İl Sınırı, 05.05.2002, 1 ♂. Kale: Muğla Çıkışı (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 4 ♂♂. Tavas: KızılıcaBölük; Eski Denizli Yolu 15. km., (37° 40' N/ 29° 05' E), 1114 m., 08.06.2002, 1 ♂; Karacasu Yolu Dünberek Deresi (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 1 ♂. Toplam: 7 ♂♂.

3. 25. *Tipula (Lunatipula) pseudowolfi* Theischinger, 1979

Lokalite: Denizli. Acıpayam: Akalan Köyü (37° 22' N/ 29° 17' E), 1112 m., 25.05.2002, 2 ♂♂. Toplam: 2 ♂♂.

3. 26. *Tipula (Lunatipula) quinquespines* Theischinger, 1980

Lokalite: Denizli. Tavas: Pınarlar Köyü Çıkışı (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 18.05.2002, 1 ♂, Yorga Köyü (37° 25' N/ 28° 70' E), 1130 m., 25.05.2002, 1 ♂. Kale: Alanyurt Köyü (37° 21' N/ 28° 46' E), 18.05.2002, 2 ♂♂, 5 ♀♀; Muğla Çıkışı (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 05.05.2002, 1 ♂. Toplam: 5 ♂♂, 5 ♀♀.

3. 27. *Tipula (Lunatipula) sciurus* Theischinger, 1977

Lokalite: Denizli. Kale: Beyağaç Yolu 2. km. (37° 26' N/ 28° 51' E), 1129 m., 25.05.2002, 1 ♂; Koçarboğazı (37° 22' N/ 28° 52' E), 1230 m., 25.05.2002, 1 ♂, 1 ♀. Tavas: Pınarlar Köyü Çıkışı (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 10.05.2003, 1 ♂. Toplam: 3 ♂♂, 1 ♀.

3. 28. *Tipula (Lunatipula) selenis* Loew, 1873

Lokalite: Denizli. Beyağaç: Kartal Gölü Koruma Alanına 2 km. (37° 07' N/ 28° 51' E), 11.05.2002, 1 ♂, 10.05.2003, 1 ♂. Toplam: 2 ♂♂. Türkiye Tipulidae faunası için ilk kez kaydedilmektedir.

3. 29. *Tipula (Lunatipula) soosi izmirensis* Mannheims, 1954

Lokalite: Denizli. Kale: Demirciler Köyü (37° 20' N/ 28° 43' E), 424 m., 11.05.2002, 2 ♂♂; Güngören Köyü (37° 35' N/ 28° 82' E), 650 m., 11.05.2002, 11 ♂♂, 3 ♀♀; Kale Giriş (37° 23' N/ 28° 47' E), 922 m., 11.05.2002, 4 ♂♂; Kale 5 km. (37° 23' N/ 28° 47' E), 922 m., 18.05.2002; Kale 3 km. (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 5 ♂♂; Muğla Çıkışı (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 9 ♂♂, 6 ♀♀; Baharlar Köyü, 18.05.2002, 1 ♂, 2 ♀♀; Kayabaşı Köyü (37° 19' N/ 28° 50' E), 1126 m., 18.05.2002, 1 ♂; Alanyurt Köyü (37° 21' N/ 28° 46' E), 1230 m., 18.05.2002, 1 ♂; Beyağaç Yolu 2. km. (37° 26' N/ 28° 51' E), 1129 m., 25.05.2002, 3 ♂♂. Beyağaç: Kartal Gölü Koruma Alanına 10 km. (37° 07' N/ 28° 50' E), 1433 m., 11.05.2002, 2 ♂♂, 1 ♂; Tavas Yolu 10. km. (37° 15' N/ 28° 90' E), 950 m., 25.05.2002, 1 ♂; Kale Yolu 25. km. (37° 10' N/ 28° 52' E), 1050 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kartal Gölü Dönüşü 8. km. (37° 04' N/ 28° 51' E), 1460 m., 20.06.2002, 1 ♂; Tavas: Ulukent village

3. 23. *Tipula (Lunatipula) oorschotorum* Theischinger, 1987

Localities: Denizli. Beyağaç: Kartal Lake. (37° 05' N/ 28° 50' E), 1851 m., 20.06.2002, 3 ♂♂; Kartal Lake (37° 05' N/ 28° 60' E), 1950 m., 26.06.2002, 1 ♂. Total: 4 ♂♂.

3. 24. *Tipula (Lunatipula) pelostigma burdurafyonensis* Theischinger, 1987

Localities: Denizli. Acıpayam, 05.05.2002, 1 ♂. Kale: Muğla (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 4 ♂♂. Tavas: Kızılıcabölük village; Denizli old road 15. km., (37° 40' N/ 29° 05' E), 1114 m., 08.06.2002, 1 ♂; Karacasu road Dünberek stream (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 1 ♂. Total: 7 ♂♂.

3. 25. *Tipula (Lunatipula) pseudowolfi* Theischinger, 1979

Localities: Denizli. Acıpayam: Akalan village (37° 22' N/ 29° 17' E), 1112 m., 25.05.2002, 2 ♂♂. Total: 2 ♂♂.

3. 26. *Tipula (Lunatipula) quinquespines* Theischinger, 1980

Localities: Denizli. Tavas: Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 18.05.2002, 1 ♂, Yorga village (37° 25' N/ 28° 70' E), 1130 m., 25.05.2002, 1 ♂. Kale: Alanyurtvillage (37° 21' N/ 28° 46' E), 18.05.2002, 2 ♂♂, 5 ♀♀; Muğla (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 05.05.2002, 1 ♂. Total: 5 ♂♂, 5 ♀♀.

3. 27. *Tipula (Lunatipula) sciurus* Theischinger, 1977

Localities: Denizli. Kale: Beyağaç road 2. km. (37° 26' N/ 28° 51' E), 1129 m., 25.05.2002, 1 ♂; Koçarboğazı village (37° 22' N/ 28° 52' E), 1230 m., 25.05.2002, 1 ♂, 1 ♀. Tavas: Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 10.05.2003, 1 ♂. Total: 3 ♂♂, 1 ♀.

3. 28. *Tipula (Lunatipula) selenis* Loew, 1873

Localities: Denizli. Beyağaç: Kartal Lake. (37° 07' N/ 28° 51' E), 11.05.2002, 1 ♂, 10.05.2003, 1 ♂. Total: 2 ♂♂. This species is first records for the Turkish Tipulidae fauna.

3. 29. *Tipula (Lunatipula) soosi izmirensis* Mannheims, 1954

Localities: Denizli. Kale: Demirciler village (37° 20' N/ 28° 43' E), 424 m., 11.05.2002, 2 ♂♂; Güngören village (37° 35' N/ 28° 82' E), 650 m., 11.05.2002, 11 ♂♂, 3 ♀♀; Kale (37° 23' N/ 28° 47' E), 922 m., 11.05.2002, 4 ♂♂; Kale 5 km. (37° 23' N/ 28° 47' E), 922 m., 18.05.2002; Kale 3 km. (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 5 ♂♂; Muğla (37° 25' N/ 28° 50' E), 1008 m., 18.05.2002, 9 ♂♂, 6 ♀♀; Baharlar village, 18.05.2002, 1 ♂, 2 ♀♀; Kayabaşı village (37° 19' N/ 28° 50' E), 1126 m., 18.05.2002, 1 ♂; Alanyurt village (37° 21' N/ 28° 46' E), 1230 m., 18.05.2002, 1 ♂; Beyağaç road 2. km. (37° 26' N/ 28° 51' E), 1129 m., 25.05.2002, 3 ♂♂. Beyağaç: Kartal Lake (37° 07' N/ 28° 50' E), 1433 m., 11.05.2002, 2 ♂♂, 1 ♂; Tavas road 10. km. (37° 15' N/ 28° 90' E), 950 m., 25.05.2002, 1 ♂; Kale road 25. km. (37° 10' N/ 28° 52' E), 1050 m., 20.06.2002, 1 ♂; Kartal Lake (37° 04' N/ 28° 51' E), 1460 m., 20.06.2002, 1 ♂; Tavas: Ulukent village

28° 50' E), 1460 m., 20.06.2002, 1 ♂; Tavas: Ulukent Köyü (37° 26' N/ 28° 59' E), 978 m., 18.05.2002, 3 ♂♂; Kızılağac Köyü (37° 16' N/ 28° 52' E), 906 m., 18.05.2002, 3 ♂♂, 1 ♀; Yorga Köyü (37° 25' N/ 28° 70' E), 1130 m., 05.2002, 1 ♂; Tekke Köyü (37° 36' N/ 29° 09' E), 1134 m., 05.05.2002, 1 ♂, 3 ♀♀; Kızılcabölük (37° 37' N/ 29° 02' E), 992 m., 08.06.2002, 2 ♂♂, 1 ♀; Karacasu Yolu Dünberek Derezi (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 14 ♂♂, 8 ♀♀; Kızılcabölük Eski Denizli Yolu 15. km. (37° 40' N/ 29° 05' E), 1114 m., 08.06.2002, 2 ♂♂; Karacasu Yolu, Dünberek Derezi (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 10.05.2003, 7 ♂♂. Acıpayam: Akalan Köyü Çıkışı 2.km. (37° 21' N/ 29° 20' E), 1002 m., 25.05.2002, 1 ♂, 1 ♀; Akalan Köyü Çıkışı 15. km. (37° 22' N/ 29° 17' E), 1112 m., 25.05.2002, 3 ♂♂, 5 ♀♀; Çakır Köyü (37° 18' N/ 29° 20' E), 831 m., 08.06.2002, 1 ♂, 1 ♀; Kelekçi Köyü (37° 15' N/ 29° 18' E), 833 m., 08.06.2002, 1 ♂, 1 ♀. Çameli: Belevi Köyü (37° 06' N/ 29° 22' E), 1482 m., 10.05.2003, 2 ♂♂, 5 ♀♀. Toplam: 83 ♂♂, 34 ♀♀.

3. 30. *Tipula (Lunatipula) subacuminata* Mannheims, 1963

Lokalite: Denizli. Beyağaç: Kartal Gölü Zirveye 2 km. (37° 05' N/ 28° 50' E), 1851 m., 20.06.2002, 1 ♂. Toplam: 1 ♂.

3. 31. *Tipula (Lunatipula) teunisseni* Theischinger, 1979

Lokalite: Denizli. Beyağaç: Kartal Gölü Dönüşü 5. km. (37° 04' N/ 28° 50' E), 1460 m., 20.06.2002, 3 ♂♂, 3 ♀♀. Acıpayam: Burdur İl sınırı, 05.05.2002, 2 ♀♀. Tavas: Yorga Köyü (37° 25' N/ 28° 70' E), 1130 m., 25.05.2002, 2 ♂♂. Toplam: 5 ♂♂, 5 ♀♀.

3. 32. *Tipula (Lunatipula) vermooleni* Theischinger, 1987

Lokalite: Denizli. Kale: Güngören Köyü (37° 35' N/ 28° 82' E), 650 m., 11.05.2002, 3 ♂♂; Alanyurt Köyü (37° 21' N/ 28° 46' E), 1230 m., 18.05.2002, 2 ♂♂; Koçarboğazı Köyü Çıkışı 3. km., (37° 22' N/ 28° 52' E), 1240 m., 09.05.2003, 1 ♂. Toplam: 6 ♂♂. Türkiye Tipulidae faunası için ilk kez kaydedilmektedir.

3. 33. *Tipula (Lunatipula) verrucosa sinedente* Theischinger, 1980

Lokalite: Denizli. Kale: Güngören Köyü (37° 35' N/ 28° 82' E), 650 m., 11.05.2002, 3 ♂♂. Tavas: Pınarlar Köyü Girişisi (37° 30' N/ 29° 05' E), 979 m., 18.05.2002, 1 ♂; Yukarıboğaz Köyü (37° 21' N/ 29° 00' E), 1067 m., 18.05.2002, 4 ♂♂; Pınarlar Köyü Çıkışı (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m. 10.05.2003, 1 ♂. Toplam: 9 ♂♂.

3. 34. *Tipula (Mediotipula) anatoliensis* Theowald, 1978

Lokalite: Denizli. Tavas: Pınarlar Köyü Çıkışı (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 18.05.2002, 1 ♂. Toplam: 1 ♂.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Nisan 2002 ile Mayıs 2003 tarihleri arasında Denizli'nin Kale, Tavas, Acıpayam, Beyağaç ve Çameli ilçesi sınırlarında yapılan arazi çalışmaları sonucunda

(37° 26' N/ 28° 59' E), 978 m., 18.05.2002, 3 ♂♂; Kızılağac village (37° 16' N/ 28° 52' E), 906 m., 18.05.2002, 3 ♂♂, 1 ♀; Yorga village (37° 25' N/ 28° 70' E), 1130 m., 05.2002, 1 ♂; Tekke village (37° 36' N/ 29° 09' E), 1134 m., 05.05.2002, 1 ♂, 3 ♀♀; Kızılcabölük village (37° 37' N/ 29° 02' E), 992 m., 08.06.2002, 2 ♂♂, 1 ♀; Karacasu road Dünberek stream (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 08.06.2002, 14 ♂♂, 8 ♀♀; Kızılcabölük Denizli old road 15. km. (37° 40' N/ 29° 05' E), 1114 m., 08.06.2002, 2 ♂♂; Karacasu road, Dünberek stream (37° 37' N/ 28° 55' E), 895 m., 10.05.2003, 7 ♂♂. Acıpayam: Akalan village 2.km. (37° 21' N/ 29° 20' E), 1002 m., 25.05.2002, 1 ♂, 1 ♀; Akalan village 15. km. (37° 22' N/ 29° 17' E), 1112 m., 25.05.2002, 3 ♂♂, 5 ♀♀; Çakır village (37° 18' N/ 29° 20' E), 831 m., 08.06.2002, 1 ♂, 1 ♀; Kelekçi village (37° 15' N/ 29° 18' E), 833 m., 08.06.2002, 1 ♂, 1 ♀. Çameli: Belevi village (37° 06' N/ 29° 22' E), 1482 m., 10.05.2003, 2 ♂♂, 5 ♀♀. Total: 83 ♂♂, 34 ♀♀.

3. 30. *Tipula (Lunatipula) subacuminata* Mannheims, 1963

Localities: Denizli. Beyağaç: Kartal Lake (37° 05' N/ 28° 50' E), 1851 m., 20.06.2002, 1 ♂. Total: 1 ♂.

3. 31. *Tipula (Lunatipula) teunisseni* Theischinger, 1979

Localities: Denizli. Beyağaç: Kartal Lake (37° 04' N/ 28° 50' E), 1460 m., 20.06.2002, 3 ♂♂, 3 ♀♀. Acıpayam: Burdur İl sınırı, 05.05.2002, 2 ♀♀. Tavas: Yorga Köyü (37° 25' N/ 28° 70' E), 1130 m., 25.05.2002, 2 ♂♂. Total: 5 ♂♂, 5 ♀♀.

3. 32. *Tipula (Lunatipula) vermooleni* Theischinger, 1987

Localities: Denizli. Kale: Güngören village (37° 35' N/ 28° 82' E), 650 m., 11.05.2002, 3 ♂♂; Alanyurt village (37° 21' N/ 28° 46' E), 1230 m., 18.05.2002, 2 ♂♂; Koçarboğazı village 3. km., (37° 22' N/ 28° 52' E), 1240 m., 09.05.2003, 1 ♂. Total: 6 ♂♂. This species is first records for the Turkish Tipulidae fauna.

3. 33. *Tipula (Lunatipula) verrucosa sinedente* Theischinger, 1980

Localities: Denizli. Kale: Güngören village (37° 35' N/ 28° 82' E), 650 m., 11.05.2002, 3 ♂♂. Tavas: Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 979 m., 18.05.2002, 1 ♂; Yukarıboğaz village (37° 21' N/ 29° 00' E), 1067 m., 18.05.2002, 4 ♂♂; Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m. 10.05.2003, 1 ♂. Total: 9 ♂♂.

3. 34. *Tipula (Mediotipula) anatoliensis* Theowald, 1978

Localities: Denizli. Tavas: Pınarlar village (37° 30' N/ 29° 05' E), 1042 m., 18.05.2002, 1 ♂. Total: 1 ♂.

4. RESULTS AND DISCUSSION

In this study, 506 tipulid specimens belonging to 34 species collected from Denizli (Kale, Tavas, Acıpayam, Beyağaç, Çameli) between April 2002 and May 2003. 5

Nephrotoma cinsine dahil 5, *Tipula* cinsine dahil 29 taksona ait 506 tipulid örneği toplanmıştır.

Araştırma alanından daha önce kaydı verilen *Tipula (Lunatipula) mendli*, *Tipula (Lunatipula) quinquespines*, *Tipula (Lunatipula) verrucosa sinedente*, *Tipula (Yamatotipula) caesia* ve *Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis* taksonları bu çalışmada da tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonlardan *Tipula (Lunatipula) selenis* ve *Tipula (Lunatipula) vermooleni* Türkiye Tipulidae faunası için ilk kez kaydedilmektedir. Ayrıca Denizli ili için tespit edilen 30 yeni kayıtla birlikte Denizli ilinden bilinen ve Tipulidae'ye ait takson sayısı 35'e yükselmiştir.

Araştırma alanı içerisinde yer alan ilçelerden Tavas (21 takson) ve Kale (19 takson) en fazla taksonla temsil edilmektedir. Ayrıca *Nephrotoma theowaldi*, *Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis* ve *Tipula (Lunatipula) soosi izmirensis* tüm ilçelerde yayılış gösterirken *Nephrotoma guestfalica guestfalica*, *Tipula (Lunatipula) borysthenica*, *Tipula (Lunatipula) pseudowolfi*, *Tipula (Lunatipula) huberti*, *Tipula (Lunatipula) vermooleni*, *Tipula (Lunatipula) selenis*, *Tipula (Lunatipula) neutra*, *Tipula (Lunatipula) carens*, *Tipula (Lunatipula) franzressli*, *Tipula (Lunatipula) subacuminata*, *Tipula (Lunatipula) oorschotorum*, *Tipula (Mediotipula) anatoliensis* ise yalnız bir ilçede yayılış göstermektedir (Tablo 1).

Belirlenen taksonlar fenolojik açıdan değerlendirildiğinde Nisan'da 5, Mayıs'da 25 ve Haziran'da 16 taksonun erginlerinin tabiatta uçuşu gözlenmektedir (Tablo 2). *Nephrotoma croceiventris lindneri* Nisan ayı sonundan Haziran ayı sonlarına kadar uçmaktadır. Ayrıca *Nephrotoma theowaldi*, *Tipula (Tipula) orientalis*, *Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis* ve *Tipula (Lunatipula) dedecor* Nisan ayı son haftalarında uçan diğer türlerdir. Araştırmada tespit edilen türlerin fenolojisi bu alanda yapılan diğer çalışmalarla elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir (31-34).

Türkiye'den şimdije kadar toplam 132 tipulid tür ve alt türü kaydedilmiştir (3, 4). Bu çalışmada ilk kez tespit edilen ve Türkiye faunası için yeni kayıt olan *Tipula (Lunatipula) selenis* ve *Tipula (Lunatipula) vermooleni* ile birlikte Türkiye'den bilinen Tipulidae taksonlarının sayısı 134'ye ulaşmaktadır.

Bu sonuçlar oldukça değişik coğrafik ve iklim özelliklerine sahip olan ülkemizde daha fazla sayıda tür bulunabileceği gerektiğini ortaya koymaktadır.

species belong to *Nephrotoma* genus and 29 species belong to *Tipula* genus.

Tipula (Lunatipula) mendli, *Tipula (Lunatipula) quinquespines*, *Tipula (Lunatipula) verrucosa sinedente*, *Tipula (Yamatotipula) caesia* and *Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis* species were known from Turkey. At the same time these specimens are found in this study. *Tipula (Lunatipula) selenis* ve *Tipula (Lunatipula) vermooleni* are recorded for Turkey Tipulidae Fauna at the first time. Species that known from Denizli with 30 number of new species rose up to 35 species.

In research area Tavas (21 taxa) and Kale (19 taxa) are represented by extreme taxa. Also while *Nephrotoma theowaldi*, *Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis* and *Tipula (Lunatipula) soosi izmirensis* are present in all counties, *Nephrotoma guestfalica guestfalica*, *Tipula (Lunatipula) borysthenica*, *Tipula (Lunatipula) pseudowolfi*, *Tipula (Lunatipula) huberti*, *Tipula (Lunatipula) vermooleni*, *Tipula (Lunatipula) selenis*, *Tipula (Lunatipula) neutra*, *Tipula (Lunatipula) carens*, *Tipula (Lunatipula) franzressli*, *Tipula (Lunatipula) subacuminata*, *Tipula (Lunatipula) oorschotorum*, *Tipula (Mediotipula) anatoliensis* are only present in one county (Tablo 1).

When the defined taxa assessed from the point phenology, in April 5, May 25 and June 16 mature taxa were observed flying in the nature. *Nephrotoma croceiventris lindneri* are flying between end of April and end of June. Also *Nephrotoma theowaldi*, *Tipula (Tipula) orientalis*, *Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis* and *Tipula (Lunatipula) dedecor* are flying end of April (Table 2). This study in point of phenology resembles to the other study (31-34).

Up to now total 132 tipulid species and their subspecies were recorded in Turkey (3, 4). In this study *Tipula (Lunatipula) selenis* and *Tipula (Lunatipula) vermooleni* first recorded in Turkey and number of Tipulidae reached to 134.

These results claim that in our country which as different geographical and climate characteristic, there may be much more different species.

Table 4. 1. Horizontal Distributions of Tipulidae Species in Research Area
Cizelge 4. 1. Araştırma alanından tespit edilen Tipulidae türlerinin yatay dağılışları

Species/ Türler	Counties/ İlçeler	Açipayam	Beyağaç	Çameli	Kale	Tavas
<i>Nephrotoma appendiculata appendiculata</i>					+	
<i>Nephrotoma croceiventris lindneri</i>		+	+		+	+
<i>Nephrotoma guestfalica guestfalica</i>		+				
<i>Nephrotoma quadrifaria quadrifaria</i>		+				+
<i>Nephrotoma theowaldi</i>		+	+	+	+	+
<i>Tipula (s.str.) orientalis</i>		+		+		+
<i>Tipula (Yamatotipula) caesia</i>		+				
<i>Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis</i>		+	+	+	+	+
<i>Tipula (Yamatotipula) submontium</i>			+			+
<i>Tipula (Acutipula) isparta</i>			+		+	
<i>Tipula (Acutipula) latifurca</i>		+	+			+
<i>Tipula (Lunatipula) borysthениca</i>		+				
<i>Tipula (Lunatipula) carens</i>						+
<i>Tipula (Lunatipula) dedecor</i>			+		+	+
<i>Tipula (Lunatipula) dracula</i>		+			+	+
<i>Tipula (Lunatipula) franzressli</i>					+	
<i>Tipula (Lunatipula) furcula</i>			+		+	
<i>Tipula (Lunatipula) helvola</i>					+	+
<i>Tipula (Lunatipula) huberti</i>						+
<i>Tipula (Lunatipula) istriana</i>					+	+
<i>Tipula (Lunatipula) mendli</i>					+	+
<i>Tipula (Lunatipula) neutra</i>					+	
<i>Tipula (Lunatipula) oorschotorum</i>			+			
<i>Tipula (Lunatipula) peliostigma burdurafyonensis</i>					+	+
<i>Tipula (Lunatipula) pseudowolfi</i>		+				
<i>Tipula (Lunatipula) quinquespinis</i>			+		+	+
<i>Tipula (Lunatipula) sciurus</i>					+	+
<i>Tipula (Lunatipula) selenis</i>			+			
<i>Tipula (Lunatipula) soosi izmirensis</i>		+	+	+	+	+
<i>Tipula (Lunatipula) subacuminata</i>			+			
<i>Tipula (Lunatipula) teunisseni</i>		+	+			+
<i>Tipula (Lunatipula) vermooleni</i>					+	
<i>Tipula (Lunatipula) verrucosa sinedente</i>					+	+
<i>Tipula (Mediotipula) anatoliensis</i>						+
Toplam		13	14	4	19	21

Table 4. 2. Flying Periods of Tipulidae Species in Research Area
Çizelge 4. 2. Araştırma alanından tespit edilen Tipulidae türlerinin uçuş zamanları

Species/ Türler	Month/ Aylar				
	April/ Nisan	May/ Mayıs	June/ Haziran	July/ Temmuz	August/ Ağustos
<i>Nephrotoma appendiculata appendiculata</i>					
<i>Nephrotoma croceiventris lindneri</i>		■	■	■	
<i>Nephrotoma guestfalica guestfalica</i>				■	
<i>Nephrotoma quadrifaria quadrifaria</i>				■	
<i>Nephrotoma theowaldi</i>	■	■	■	■	
<i>Tipula (s.str.) orientalis</i>	■	■	■		
<i>Tipula (Yamatotipula) caesia</i>					
<i>Tipula (Yamatotipula) lateralis lateralis</i>	■	■	■	■	
<i>Tipula (Yamatotipula) submontium</i>		■			
<i>Tipula (Acutipula) isparta</i>					
<i>Tipula (Acutipula) latifurca</i>			■	■	■
<i>Tipula (Lunatipula) borysthениca</i>		■			
<i>Tipula (Lunatipula) carens</i>		■	■		
<i>Tipula (Lunatipula) dedecor</i>	■	■	■		
<i>Tipula (Lunatipula) dracula</i>		■	■		
<i>Tipula (Lunatipula) franzressli</i>					
<i>Tipula (Lunatipula) furcula</i>				■	
<i>Tipula (Lunatipula) helvola</i>		■	■	■	
<i>Tipula (Lunatipula) huberti</i>		■	■		
<i>Tipula (Lunatipula) istriana</i>			■	■	
<i>Tipula (Lunatipula) mendli</i>				■	■
<i>Tipula (Lunatipula) neutra</i>			■		
<i>Tipula (Lunatipula) oorschotorum</i>				■	
<i>Tipula (Lunatipula) peliostigma burdurafyonensis</i>		■	■	■	
<i>Tipula (Lunatipula) pseudowolfi</i>				■	
<i>Tipula (Lunatipula) quinquespinis</i>		■	■	■	
<i>Tipula (Lunatipula) sciurus</i>			■	■	
<i>Tipula (Lunatipula) selenis</i>		■	■		
<i>Tipula (Lunatipula) soosi izmirensis</i>	■	■	■	■	
<i>Tipula (Lunatipula) subacuminata</i>					
<i>Tipula (Lunatipula) teunisseni</i>		■	■	■	
<i>Tipula (Lunatipula) vermooleni</i>		■	■		
<i>Tipula (Lunatipula) verrucosa sinedente</i>		■	■		
<i>Tipula (Mediotipula) anatoliensis</i>			■		

KAYNAKLAR/ REFERENCES

1. Mannheims, B., Theowald, B., *Tipuliden*. In Lindner, E. (eds.): Die Fliegen Der Palaearktischen Region, *E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung*, **1** (15): 1-538 (1980).
2. Oosterbroek, P., Theowald, B., *Family Tipulidae*. In Soos A., Papp L. Oosterbroek P. (eds.): Catalogue of Palaearctic Diptera, *Hungarian Natural History Museum*, **1**: 56-178 (1992).
3. Koç, H. & Oosterbroek, P., "Checlist of the Turkish Tipulidae (Diptera), with new records", *Studia dipterologica*, **8** (Heft 2): 463-468 (2001).
4. Vogtenhuber, P., "Neue Taxa von *Pterelachisus* aus der Türkei (Diptera, Tipulidae)", *Denisia*, **13**: 347-350 (2004).
5. Savchenko, E., N., Crane flies (Diptera, Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus *Tipula* L. In: Fauna USSR, Diptera, *Akademii Nauk SSSR*, **2** (3), N.S. 79, 1-488 (1961).
6. Savchenko, E., N., Crane flies (Diptera, Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus *Tipula* L., Fauna USSR, Diptera, *Akademii Nauk SSSR*, **2** (4), N.S. 89, 1-503 (1964).
7. Savchenko, E. N., "New and Little-Known Crane Flies of Transcaucasia (Diptera, Tipulidae)", *Ent. Rev.*, **47** (4): 557-571 (1968).
8. Savchenko, E., N., Crane flies (Tipulidae), Subfam. Tipulinae (End) and Flabelliferinae. Fauna USSR, Diptera, *Akademii Nauk SSSR*, **2** (5), N.S. 105, 1-282 (1973).
9. Savchenko, E., N., Crane flies (Fam. Tipulidae), Introduction, Subfam. Dolichopezinae, Subfam. Tipulinae (start), Fauna USSR, Diptera, *Akademii Nauk SSSR*, **2** (1-2), N.S. 127, 1-585 (1983).
10. Oosterbroek, P., "Zwei neue *Nephrotoma*-Arten aus der Cornicina-Gruppe (Diptera, Tipulidae) aus Spanien und der Türkei", *Bull. Zool. Mus. Un. Amsterdam*, **4**: 119-124 (1975).
11. Oosterbroek, P., "The western palaearctic species of *Nephrotoma* Meigen, 1803 (Diptera, Tipulidae)", part 1, *Beaufortia*, **27** (337): 1-137 (1978).
12. Oosterbroek, P., "The western palaearctic species of *Nephrotoma* Meigen, 1803 (Diptera, Tipulidae)", part 2, *Beaufortia*, **28** (346): 57-111 (1979a).
13. Oosterbroek, P., "The western palaearctic species of *Nephrotoma* Meigen, 1803 (Diptera, Tipulidae)", part 3, *Beaufortia*, **28** (350): 157-203 (1979b).
14. Oosterbroek, P., "The western palaearctic species of *Nephrotoma* Meigen, 1803 (Diptera, Tipulidae), part 4, including a key to the species", *Beaufortia*, **29** (354): 129-197 (1979c).
15. Oosterbroek, P., "The western palaearctic species of *Nephrotoma* Meigen, 1803 (Diptera, Tipulidae), part 5, Phylogeny and Biogeography", *Beaufortia*, **29** (346): 311-393 (1980).
16. Tangelder, M.I.R., "The Species of the *Nephrotoma Dorsalis*-Group in The Palaearctic (Diptera, Tipulidae)", *Beaufortia*, **34** (2): 15-92 (1984).
17. Tangelder, M.I.R., "Phylogeny of the *Nephrotoma dorsalis* Species-Group (Diptera, Tipulidae), Mainly Based on Genital Characters", *Beaufortia*, **35** (8): 135-174 (1985).
18. Jong, H. D., "The phylogeny of the *Nephrotoma flavescens* species group (Diptera: Tipulidae)", *Tijdschr. Ent.*, **136**: 235-256 (1993).
19. Theowald, B., "Taxonomie, Phylogenie und Biogeographie der Untergattung *Tipula* (*Tipula*) Linnaeus, 1758 (Insecta, Diptera, Tipulidae)", *Tijdschr. Ent.*, **127** (3): 33-78 (1984).
20. Oosterbroek, P., "Notes on western Palaearctic species of the *Tipula (Yamatotipula) lateralis* group, with the description of a new species from Turkey (Diptera: Tipulidae)", *Eur. J. Entomol.*, **91**: 429-435 (1994).
21. Vermoolen, D., "The *Tipula (Acutipula) maxima* Group (Insecta, Diptera, Tipulidae), 1. Taxonomy and Distribution", *Bijdr. Dierk.*, **53** (1): 49-81 (1983).

22. Jong, H. D., "The phylogeny of the *Tipula (Acutipula) maxima* species group, with notes on its distribution (Diptera: Tipulidae)", *Ent. scand.*, **24**: 433-457 (1994).
23. Oosterbroek, P., "New Species of *Tipula (Lunatipula)* from Israel and Turkey (Diptera: Tipulidae)", *Israel J. Ent.*, **31**: 179-197 (1997).
24. Theischinger, G., "Neue Taxa von *Lunatipula* Edwards aus der Mittleren Subregion der Palaearktis (Diptera, Tipulidae, *Tipula* Linnaeus)", *Beaufortia*, **26**: 1-38 (1977).
25. Theischinger, G., "Neue Taxa von *Lunatipula* Edwards aus der Mittleren Subregion der Palaearktis (Diptera, Tipulidae, *Tipula* Linnaeus)", I. Fortsetzung, *Beaufortia*, **28**: 121-150 (1979a).
26. Theischinger, G., "Neue Taxa von *Lunatipula* Edwards aus der Mittleren Subregion der Palaearktis (Diptera, Tipulidae, *Tipula* Linnaeus)", II. Fortsetzung, *Beaufortia*, **29**: 275-308 (1979b).
27. Theischinger, G., "Neue Taxa von *Lunatipula* Edwards aus der Mittleren Subregion der Palaearktis (Diptera, Tipulidae, *Tipula* Linnaeus)", III. Fortsetzung, *Beaufortia*, **30**: 17-29 (1980).
28. Theischinger, G., "Neue Taxa von *Lunatipula* Edwards aus der Mittleren Subregion der Palaearktis (Diptera, Tipulidae, *Tipula* Linnaeus)", IV. Fortsetzung, *Beaufortia*, **32**: 79-96 (1982).
29. Theischinger, G., "Neue Taxa von *Lunatipula* Edwards aus der Mittleren Subregion der Palaearktis (Diptera, Tipulidae, *Tipula* Linnaeus)", V. Fortsetzung, *Beaufortia*, **37**: 99-120 (1987).
30. Jong, H. D., "The Phylogeny of The Subgenus *Tipula (Mediotipula)* (Diptera: Tipulidae)", *Tijdschr. Ent.*, **138**: 269-282 (1995b).
31. Mannheims, B., "Über Sammeln, Vorkommen und Flugzeiten mitteleuropäischer Tipulidae (Dipt.)", *Bonn. zool. Beitr.*, **1**: 92-95 (1950).
32. Hollander, J., "The phenology and habitat of the species of the subgenus *Tipula* Linnaeus in the Netherlands", *Tijdschr. Ent.*, **118**: 83-97 (1975).
33. Hofsvang, T., Hansen, L.O. & Midgaard, F., "Flight periods of Tipulidae (Diptera) from 22 Norwegian localities", *Fauna norv. Ser. B*, **40**: 81-87 (1993).
34. Brodo, F., "The subgenus *Tipula* (*Tipula*) in Finland and Estonia", *Entomol. Fennica*, **5**: 49-52 (1994).

Received/ Geliş Tarihi: 08.01.2004

Accepted/Kabul Tarihi: 05.08.2004