

SAĞLIKLI İNSANLarda ERİTROSİT MEMBRANI Na^+ - K^+ ATPaz VE Ca^{2+} ATPaz AKTİVİTELERİNE VE SİALİK ASİD DÜZEYLERİNE YAŞLANMANIN ETKİSİ

Hikmet KOÇAK, Pernur ÖNER*

ÖZET

Bu çalışma, eritrosit membranı Na^+ - K^+ ATPaz ve Ca^{2+} ATPaz aktiviteleri ile sialik asid düzeyleri üzerine yaşa bağlı olabilecek değişiklikleri araştırmak için planlanmıştır. Yaş ortalaması 64 olan 14 yaşlı olgunun eritrosit membranı Na^+ - K^+ ATPaz ve Ca^{2+} ATPaz aktivitelerinde, yaş ortalaması 28 olan 14 gençin enzim aktivitelerine göre anlamlı olmayan azalma saptandı. Hücre içi ve dışı Na^+ ve K^+ konsantrasyonları ile plazma ve eritrosit membranı sialik asidin düzeyleri yaşlıarda artmaya eğilimli bulundu, ancak yalnız plazma Na^+ artışı anlamlı imdi. Bu bulgulara göre; her iki enzim aktivitelerinin ilerleyen yaş ile etkilenmediği ve yaşlanma olayının hücre hacmi ve homeostazisi mekanizmalarında ve membran yapısında organizma aleynine olabilecek değişikliklere yol açmadığı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Na^+ - K^+ ATPaz ve Ca^{2+} ATPaz, sialik asid, yaşlanma, eritrosit, insan

SUMMARY

This study was planned to investigate the change on erythrocyte membrane Na^+ - K^+ ATPaz ve Ca^{2+} ATPaz activities and sialic acid levels that may be related to aging. An insignificant decrease was obtained in the erythrocyte membrane Na^+ - K^+ ATPase and Ca^{2+} ATPase activities of 14 old subjects with a mean age of 64 according to the enzyme activities of the 14 young subjects whose mean age was 28. The intracellular and extracellular Na^+ and K^+ concentrations and the plasma and erythrocyte membrane sialic levels were found with a tendency to increase in the elder subjects but only the plasma Na^+ increase was significant.

According to these findings, it is thought these two enzyme activities were not affected with increasing age and the aging process do not make some negative changes on cell volume and homeostasis mechanisms and on membrane structure.

Key Words: Na^+ - K^+ ATPaz ve Ca^{2+} ATPase, sialic acid, aging, erythrocyte, human

GİRİŞ

Yaşlanma olayı sırasında oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklerin belirlenmesinde, çeşitli dokularda spesifik enzim aktivitelerindeki değişikliklerin ölçülmesi önemli bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Yaşlanmadan ileri gelebilecek membran yapısındaki biyokimyasal ve morfolojik değişiklikler, iyonların homeostazisini de bozabilir. Gerçekten insan ve hayvanlarda yapılan tüm vücut elektrolit incelemelerinde hücre içi sodyum konsantrasyonunun ilerleyen yaşla birlikte arttığı (2,4,10) ve bunun sodyumun pasif difizyonunda artış ile birlik-

te aktif transportunda yavaşlamaya bağlı olabileceği bildirilmiştir (4,10). Yaşlanma olayları, kalsiyum homeostazisi ile de ilişkilidir (13).

Na^+ - K^+ ATPaz, membran bütünlüğünün ve hücredeki iyonik asimetrinin, Ca^{2+} ATPaz ise Ca^{2+} homeostazisinin korunmasından sorumlu başlıca membrana-bağılı transpot enzimleridir. Yaşlanmaya bağlı, insan ve hayvanlarda eritrosit ve diğer dokuların Na^+ - K^+ ATPaz aktivitelerinde çoğunlukla azalma (2,3,8,15) veya artma olduğu (7) ya da yaşlanmanın hiçbir etkisinin olmadığı (16,21) bildirilmiştir.

Düger taraftan, eritrositlerin dolaşımdaki canlılıklarının başlıca belirleyicisi olarak kabul edilen sialik asidin, yaşlı eritrositlerin membranında gençlere göre azlığı bildirilmiştir⁽¹⁸⁾. Bütün bu bilgilerin ışığında yapılan bu çalışmada, eritrosit membranının önemli yapısal ve fonksiyonel bileşikleri olan membrana-bağılı transpot ATPaz aktiviteleri (Na⁺-K⁺ATPaz ve Ca²⁺ ATPaz) ve sialik asid (NANA) düzeylerindeki yaşa bağımlı olabilecek değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.

MATERIAL ve METOD

Yaşları 23-24 (ort:28) ve 51-88 (ort:64) arasında değişen tamamen sağlıklı 14'ü genç, 14'ü yaşlı toplam 28, kadın ve erkekten alınan kan örnekleri çalışmanın materyalini oluşturdu. Tüm olguların boy ve ağırlıkları ölçülerek vücut kitle indeksleri (VKI'leri) hesaplandı. Tüm olgulardan sabah ve aç olarak 20-25 ml heparinli venöz kan alındı. Genç kadınlarla, kan alma devresi olarak postmenüstürel devre seçildi. Alınan heparinli kan hemen 950xg'de 15 dak. soğuk santifüj edilerek plazma ve kan hücreleri ayrıldı. Plazma ve lökosit ve trombositten zengin üst tabaka su trompuyla uzaklaştırıldıktan sonra kalan kırmızı hücreler 3 kez 5 hacim buz soğukluğunda 115 mM MgCl₂ ile (+4°C'de 15 dak. 21250xg'de) santrifüj edildi ve süpernatant atıldı. Yıkılmış eritrosit kitlesi bidistile su ile hemolizlendi. Hemolizatta eritrosit içi Na⁺ ve K⁺ konsantrasyonları flame fotometrik olarak ölçüldü⁽¹¹⁾.

Eritrosit membranı eldesi, Wood ve Beutler metoduna göre yapıldı⁽²²⁾. 1,5 ml çökmüş kırmızı hücreler, yaklaşık 30 ml pH 7.4'lük 0.1 mM EDTA ve 7.03 mM Trisbileşimindeki hemoliz eriyiği ile hemoliz edildi ve +20°C'de 15 dak. 23400xg'de santrifüllendi. Bu işlem, membran tamamen renksiz olarak elde edilinceye kadar en az üç kere tekrar edildi. Elde edilen hemoglobinsiz eritrosit membranında Rahman ve arkadaşları-

nın⁽¹²⁾, Davis ve Blas⁽⁵⁾, yöntemleri esas alınarak küçük değişikliklerle Na⁺-K⁺ATPaz ve Ca²⁺ ATPaz aktiviteleri ve total sialik asid düzeyi ölçüldü⁽⁶⁾. ATPaz aktiviteleri, 90 dk.'da mg protein başına serbestleşen nmol Pi olarak hesaplandı. Plazma; sodyum, potasyum⁽¹¹⁾ ve total sialik asid ölçümleri için kullanıldı⁽¹⁹⁾. Enzim süspansiyonlarının içeriği protein düzeyleri Lowry⁽⁹⁾, inorganik fosfor ölçümü ise Taussky ve Shorr⁽²⁰⁾ yöntemine göre yapıldı.

İstatistiksel analiz yöntemi olarak her iki gruba ait bulguların değerlendirilmesinde Student-t ve farklı varyanslar için Mann Whitney-U testleri uygulandı.

BULGULAR

14 genç olgunun (ort.yaş: 27.85±3.08) ortalaması VKI: 21.88±2.31, 14 yaşlı olgunun (ort.yaş: 63.85±9.96) ortalaması VKI: 25.24±2.43 bulunmuştur. Tüm olguların vücut kitle indeksi (kg/m²), normal ağırlığın üst sınırı kabul edilen 27'nin altında bulunmaktadır. Genç grupta ATPaz aktivitelerinin aritmetik ortalamaları (nmol Pi/mg prot./90') Na⁺-K⁺ATPaz ; 132.6±55.1 ve Ca²⁺ ATPaz; 664.3±290.6, yaşlı grupta ATPaz aktivitelerinin aritmetik ortalamaları (nmol Pi/mg prot./90') Na⁺-K⁺ATPaz ; 109.6±39.9 ve Ca²⁺ ATPaz; 538.1±358.8 olarak bulunmuştur. Yaşlı grupta Na⁺-K⁺ATPaz ve Ca²⁺ ATPaz aktivitelerinde gençlere göre anlamlı olmayan azalma saptanmıştır. Yaşlı grupta saptanan ATPaz aktiviteleri azalmasının % oranları Na⁺-K⁺ATPaz ve Ca²⁺ ATPaz için 18.9 olup istatistiksel olarak anlamlılık göstermemiştir.


Tablo 1' de gösterilen, monovalan katyon ve sialik asid düzeylerine göre yaşlı grupta gençlere kıyasla plazma ve eritrositlerde Na⁺ ve K⁺ konsantrasyonlarında ve total sialik asid düzeylerinde anlamlı olmayan artış bulunmuş olup sadece plazma Na⁺ konsantrasyonunda orta derecede anlamlı ($p<0.05$) bir artma bulunmuştur.

Tablo 1. Genç ve yaşlı olgularda ATPaz aktiviteleri, plazma ve eritrosit Na⁺, K⁺ konsantrasyonları ve sialik asit düzeyleri (Ort. ±SD)

	Genç Grup	Yaşlı Grup
Na ⁺ -K ⁺ ATPaz (nmol Pi/mg prot./90 dk.)	132.6±55.1	109.6±39.9
Ca ²⁺ ATPaz (nmol Pi/mg prot./90 dk.)	664.3±290.6	538.1±358.8
Na ⁺ P (mmol/L)	139.0±9.4	145.0±3.0*
K ⁺ P (mmol/L)	3.8±0.4	4.0±0.4
Na ⁺ E (mmol/L)	7.2±1.3	8.1±2.7
K ⁺ E (mmol/L)	113.6±8.1	119.9±8.9
Plazma T. Sialik asit (mmol/L)	1.9±0.3	2.1±0.3
Eritrosit membranı T. Sialik asit μmol/g prot.)	100.8±25.6	111.0±28.2

*p<0.05

Na⁺P: Plazma, K⁺P: Plazma, Na⁺E: Eritrosit, K⁺E: Eritrosit




Şekil 1. Genç ve yaşlı olgularda ATPaz Aktivitelerinin dağılışı

TARTIŞMA

Organizma (konak) yaşlanmasının membranın trasport fonksiyonu ve önemli yapısal bileşeni olan sialik asit üzerine etkilerinin incelendiği bu çalışmada, yaş ortalaması 65 civarında olan yaşlıarda, membrana-bağılı ATPaz aktivitelerinde anlamlılık vermeyen azalma saptanmıştır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada da⁽³⁾ 17.40 yaş ile 41-60 yaş arasındaki kişilerde benzer sonuçlar elde edilmiş ve 60'lı yaşlardan önce Na⁺-

K⁺-ATPaz enzim aktivitesinin değişikliğe uğramadığı bildirilmiştir.

Genç ve yaşlı kişilerde eritrosit membranı enzim aktivitelerinde anlamlı farklılık bulunamamasını şu yargılara bağlayabiliriz; a) Öncelikle yaşlanmaya bağlı olarak eritrosit membranı fonksiyonel ATPaz birimleri sayısında bir kayıp olmadığını düşünebiliriz. Çünkü, Na⁺-K⁺-ATPaz baskılanmasında primer olay, Na⁺-K⁺-ATPaz birimleri sayısındaki azalmadır⁽³⁾. Diğer olasılıklar b) memb-



Şekil 2. Genç ve yaşlı olgularda plazma ve eritrosit membranı sialik asit düzeyleri

ran viskozitesinde değişiklik olmadığı, c) ve/veya yaşılanma sonucu dolaşımında Na⁺-K⁺ATPaz inhibitörü (ya da inhibitörlerinin) artmamış olduğudur.

Genç ve yaşlıların eritrosit membranı Na⁺-K⁺ATPaz'ında anlamlı bir fark bulunmadığından, yaşlılarda anlamlı olmayan hafif eritrosit Na⁺ konsantrasyonu artışının, artmış ekstarsellüler Na⁺ konsantrasyonu sonucu, sodyumun pasif transportunun uyarılmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Bizim çalışmamızda olduğu gibi, başka araştırmacılar da, yaşlılarda gençlere göre eritrosit Na⁺ konsantrasyonunda anlamlı olmayan artış bulmuşlardır (4). Bir başka çalışmada, genç ve yaşlıların intrasellüler Na⁺ ve K⁺ konsantrasyonlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (14). Bazıları ise, yalnızca yaşlı kadın grubunda intrasellüler Na⁺ konsantrasyonunda anlamlı bir artış bildirmiştir (19).

Genç ve yaşlı olgularda, gerek plazma gerekse eritrosit membranı sialik asit düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmasa da, yaşlılarda total sialik asit düzeyinin artmaya eğilimi olduğu anlaşılmaktadır. Yaşılanma ve sia-

lik asit düzeyleri ile ilgili literatürdeki nadir çalışmaların birinde, sağlıklı kadın ve erkeklerde sialik asidin ilerleyen yaşla hafifçe arttığı bildirilmiştir. Yaşılanmanın lenfosit sialik asit düzeylerine etkilerinin inceleendiği bir başka çalışmada (1) sialik asit, 20-80 yaş arası erkeklerde 10'ar yaş aralı inceleendiğinde anlamlı farklılık göstermemiştir. Bizim incelediğimiz yaş grupları olan 20-30 yaşın sialik asit düzeyleri, 51-60 yaş grubuna göre belirgin daha az, 61-70 yaş grubu ile hemen hemen aynı düzeyde, fakat anlamlı bulunmamıştır (1). Bizim olgularımızda yaşlılarda artmaya eğilimli fakat anlamlı bulunmayan plazma ve eritrosit membranı sialik asit düzeyleri ile ilgili bulgularımız, bu literatür bulgularına yine uyum göstermektedir.

Sonuç olarak, yaşılanma olayın membranın yapısal bileşenlerinde (sialik asit) bir kayıba yol açmadığı gibi, membrana bağlı ATPaz aktivitelerinde de anlamlı değişiklikler saptanmadığından membranöz aktivite ve hücresel homeostazın normal işlevinin sürdürülmesine engel bir ortam oluşturmadığı kanısına varılmıştır.

KAYNAKLAR

1. Allalouf D., Komlos L., Notman J., Halbrecht I., Levinsky H.: Sialic acid content and sialyltransferase activity in human lymphocytes with advancing age. *Mech Ageing Dev* 44:45 (1988).
2. Amano M., Imata K., Suzuki K., Nakaoka H., Fuji J.: Ageated reduction in the number of rabbit erythrocyte Na, K-ATPase. *Tohoku J Exy Med* 159:131 (1989)
3. Bozzo C., Goria M., Marena S., Velgia F., Pagano G.: Lymphocyte Na-K-ATPase is reduced in aged people. *Metab.* 8:808 (1990).
4. Cumberbatch M., Morgan D.B.: Relations between sodium transport and sodium concentration in human erythrocytes in health and disease. *Clin Sci.* 60:555 (1981).
5. Davis P.J., Blas S.D.: In vitro stimulation of human red blood cell Ca²⁺ ATPase by thyroid hormone. *Biochem Biophys Res Commun* 99:1073 (1981).
6. Denyy P.C., Denny P.A., Allerton S.E.: Determination of sialic acid using 2-thiobarbituric acid in the absence of hazardous sodium arsenite. *Clin Chim Acta* 131:333 (1983).
7. Est M., Erjavec E., Krzan M.: Age-related changes changes of erythrocyte Na⁺-K⁺ATPase activity. *Jugoslav Physiol Pharmacol Acta* 25:35 , (1989).
8. Hennesy J. F.: Vascular tissue Na⁺-K⁺ ATPase activity and aging in the F344 rat. *Mech Ageing Dev* 43:153, (1988).
9. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J.: Protein measurement with the Folinphenol reagent. *J Biol Chem* 193:265 (1951).
10. Naylor G.J., Dick D.A.T., Worall E.P., Dick E.G., Dick P., Boardman L.: Changes in the erythrocyte sodium pump with age. *Gerontology* 23:256 (1977).
11. Paci A., Coccia F., Cristofani R., Balzan S., Mezzasalma L., Piras F., Giachetti M., Ghione S.: Comparison of intra erythrocyte and intraleucocyte sodium content and erythrocyte fragility in normotensive subjects. *J Nuclear Med Allied Sci* 32:101 (1988).
12. Rahman M., Koh H., Primera M.I., Del Grmecio F., Quintanilla A.P.: Na-K-Adenosine triphosphatase and cation content in the erythrocyte in essential hypertension. *J Lab Clin Med* 107:337 (1986).
13. Samaja M., Rubinacci A., Motterlini R., De Ponti A., Postinari N.: Red cell ageing and active calcium transport. *Exp Gerontol* 25:279, (1990).
14. Schmalzing G., Pfaff E., Breyer-Pfaff U.: Red cell ouabain binding sites, Na⁺-K⁺ ATPase and intracellular Na⁺ as individual characteristics. *Life Sci* 29:371 (1981).
15. Schulte B.A., Schmidt R.A.: Lateral Wall Na⁺-K⁺ATPase and endocochlear potentials decline with age in quietreared gerbils. *Hearing Res* 61:35 (1992).
16. Simat B.M., Morley J.E., From A.H.L., et al.: Variables affecting measurement of human red cell Na⁺-K⁺ATPase activity technical factors feeding, aging. *Am J Clin Nutr* 40:339, (1984).
17. Stefenelli N., Klotz H., Engel A., Bauer P.: Serum sialic acid in malignant tumors, bacterial infections and chronic liver diseases. *J Cancer Res Clin Oncol* 109:55 (1985).
18. Stibler H., Sydow O.: The sialic acid and galactose concentrations in erythrocyte membranes in patients with mytonic dystrophy, limp-girdle and facioscapulo humeral dystrophy. *J Neurological Sci* 59:389 (1983).
19. Sydow G.: A simplified quick method for determination of sialic acid in serum. *Biomed Biochim Acta* 44:1721 (1985).
20. Taussky H.H., Shorr E.: A micro colorimetric method for determination of inorganic phosphorus. *J Biol Chem* 202:675 (1953).
21. Tozzi-Ciancarelli M.G., Fedele F., Tozzi E., et al : Age-dependent changes in human erythrocyte properties. *Clin Hemorheology* 9:999 (1989).
22. Wood L., Beutler E.: Temperature dependence of sodium potassium activated erythrocyte adenosine triphosphatase. *J Lab Clin Med* 70:288, (1967).