
 <p>İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ</p>	<p>XXXII. ZEYNEP KAMİL JİNEKO - PATOLOJİ KONGRESİ</p>	 <p>GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ 4-6 HAZİRAN 2014</p>
Bildiri No: 10		
MİDÜRETRAL MİNİSLİNG UYGULAMASININ Q-TİP DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ		
Reyyan Gökçen İŞCAN*, Nurettin AKA**, Gültekin KÖSE**, E. Can TÜFEKÇİ** *Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi **Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği		


Amaç: Midüretal Minisling yöntemi ile opere edilen stres üriner inkontinans ve mixt tip üriner inkontinans (stres tip baskın) tanılı olguların preoperatif ve postoperatif Q-Tip test sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Nisan 2013-Ekim 2013 tarihleri arasında stresle idrar kaçırma şikayetiyle başvuran SÜİ/MÜİ tanısı almış ve Minisling yöntemi ile opere edilen 30 olgunun preoperatif ve postoperatif Q-Tip test sonuçları incelendi.

Bulgular: Olguların preoperatif Q tip test sonuçları ortalama $54,50 \pm 16,68$ derece iken, postoperatif ölçümleri ortalama $20,33 \pm 12,73$ derece olarak bulunmuştur. Preoperatif değerlere göre postoperatif Q tip test sonuçlarındaki $34,17 \pm 14,74$ birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0,01$).

Tablo 1: Preoperatif ve Postoperatif Q Tip Test Sonuçlarına İlişkin Değerlendirmeler

	Q Tip		
	Min/Mak	Ort±SD	P
Preop	35/90	$54,50 \pm 16,68$	0,001**
Postop	0/45	$20,33 \pm 12,73$	



Grafik 1: Preoperatif ve Postoperatif Q tip Test Sonuçlarındaki Değişim

Sonuç: Tek bir vajinal insizyon ile yapılabilen midüretal Minisling tekniği ile Q-tip test sonuçları anlamlı ölçüde düzelmiş olup operasyonun etkinliğinin objektif olarak değerlendirilmesinde diğer parametrelerle birlikte kullanılabilir.