



Özgün Araştırma / Original Article

Mide Kanseri ve Beslenme

Zeki Kemeç¹, Abdurrahman Işıkdogan²

1 Batman Bölge Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği, Batman, Türkiye

2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Geliş: 04.11.2019; Revizyon: 22.05.2020; Kabul Tarihi: 27.05.2020

Öz

Giris: Ülkemizde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde mide kanseri en sık rastlanan kanserler arasında yer almaktadır. Çalışmalarda beslenmenin mide kanser etyolojisinde önemli bir faktör olduğu tanımlanmıştır. Bu çalışmada, mide kanserinde diyet alışkanlıklarının etkisi araştırıldı.

Yöntemler: Çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2004-2005 tarihleri arasında onkoloji departmanında yürütüldü. Vaka-kontrollü çalışmada sırasıyla 81 mide kanserli hasta (MCH) , 40 sağlıklı gönüllü birey (Kontrol-1), 40 diğer kanserli hasta (Kontrol-2), 3 ana grup olarak değerlendirildi. Katılımcılara 'Mide Kanseri Takip Formu' (MKTF) ve 'Beslenme Anket Formu' (BAF) kullanılarak anket uygulandı. Bu anketlerde katılımcıların demografik ve beslenme özellikleri arasındaki ilişki 'Pearson Chi-Square testi' kullanılarak değerlendirildi.

Bulgu-Sonuç: Üç ana grubun demografik ve beslenme değişkenleri karşılaştırıldı. Farklı sonuçlar bulundu. Bazı değişkenler mide kanseri ile ilişkiliyken, bazıları ilişkisiz bulundu. İleri yaş, erkek cinsiyet, kırsal yaşam, ev hanımı ve çiftçilik meslekleri, sosyokültürel-sosyoekonomik düzey düşüklüğü, kalabalık ailede yaşam, A kan grubu, sebze-meyveden kısıtlı beslenme, kötü ağız hijyeni ve yetersiz diş fırçalama alışkanlığı MCH'lerinde anlamlı bulundu. MCH'leri et, tuzlanıp-saklanmış et ürünleri, tuzlu peynir, tuzlanmış salamura zeytin, kahve, kırmızı pul biberi, meyve, salata, kuruyemiş gibi besin ve içecek gruplarını az tükettikleri tespit edildi. MCH'lerinde tandır fırın (ateşte/közde pişmiş) ekmeği ve katı-sıvı yağ tüketimi oldukça anlamlıydı.

Anahtar kelimeler: Mide kanseri, Beslenme özellikleri, Demografik özellikler.

DOI: 10.5798/dicletip.755775

Correspondence / Yazışma Adresi: Zeki Kemeç, Batman Bölge Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği, Batman, Türkiye. e-mail: zekikemec@gmail.com

Gastric Cancer and Nutrition

Abstract

Objectives: Gastric cancer is one of the most common cancers in Southeast and Eastern Anatolia Regions in our country. Nutrition is an important factor in the etiology of gastric cancer has been identified in different studies. In this study, the effect of dietary habits on gastric cancer was investigated.

Methods: This study was conducted in Dicle University School of Medicine Department of Oncology between 2004 and 2005. In this case-controlled study, patients were divided into three main groups as followed; Group 1. 81 patients with gastric cancer (GCP), group 2. 40 healthy volunteers (Control-1), group 3. 40 patients with other cancer (Control-2). A questionnaire was applied to the participants by using Gastric Cancer Follow-up Form (GCFF) and Nutrition Questionnaire Form (NQF). In these questionnaires, the relationship between the demographic and nutritional characteristics of the participants was evaluated using the Pearson Chi-Square test.

Finding-Results: Demographic and nutritional variables of three groups were compared. Different results were found. Some variables were associated with gastric cancer, while others were unrelated. Advanced age, male gender, living in rural area, to be housewife, to be farmer, low sociocultural and socioeconomic level, living in crowded families, A blood group, restricted nutrition from vegetables and fruits, poor oral hygiene and insufficient tooth brushing habits were found to be significant in gastric cancer patients. GCPs consumed less food and drink groups such as meat, salted-preserved meat products, salted cheese, salted olives, coffee, red paprika, fruit, salad. In GCP group, tandoor oven (cooked on fire/embers) bread and oil consumption were very significant.

Keywords: Gastric cancer, Nutritional characteristics, Demographic characteristics.

GİRİŞ

Mide karsinomu tüm dünyada sık görülen organ kanserlerinden biridir¹. Türkiye’de tüm kanserler içinde mide kanseri erkeklerde ikinci, kadınlarda ise üçüncü sırada yer almaktadır². Beş yıllık yaşam süresi ise %7-15’dir³.

Mide karsinomunun belirli bölgelerde ve belirli toplumlarda anlamlı olarak daha sık olması etyopatogenezinde çevresel faktörlerin araştırılmasına yol açmıştır. Ancak, çeşitli çalışmalarda farklı sonuçların elde edilmesi, araştırmacıları belirli bir besin türünün etkisinden çok besinleri saklama ve pişirme alışkanlıklarındaki farklılıklara ve besinlerdeki koruyucu faktörlerin etkilerine yönlendirmiştir. Özellikle kompleks tahıllardan elde edilen proteinlerin yüksek seviyede, diyetle hayvansal yağ ve proteinlerin düşük düzeyde olması, lifli ve taze yeşil bitkilerin seyrek yenilmesi, tuz ve nitratın fazla tüketilmesi mide karsinom gelişimini kolaylaştıran etmenler olarak öngörülmüştür¹. Japonya da, tuzlu yiyecekler (özellikle balık), sebze turşusu, kurutulmuş balık, balık ızgarası, büyük miktarda pirinç tüketilmesi gibi çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır⁴. Tuz tüketimini azaltan Japondalarda, mide kanseri insidansının azaldığı

gösterilmiştir⁵. Taze, yeşil-sarı sebzeler ve süt koruyucu faktörlerdir⁶. Buzdolabı dışında yiyeceklerin saklanması için yeni metotların geliştirilmesi, sigara ve tuz kullanımının azaltılması, büyük miktarda taze sebze ve meyve tüketilmesi ile mide kanseri insidansında belirgin bir azalma olmuştur. Mide kanseri ve spesifik gıdaların alımı arasındaki ilişki daha önce yayınlanmış büyük merkezli vaka-kontrol çalışma analizlerinde ortaya çıkmıştır⁷.

AMAÇ

Bu çalışma Türkiye’nin mide kanserinde yüksek risk bölgesi olan Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden² birçok hastanın başvurduğu Dicle Üniversitesi Onkoloji Kliniği’nde yapıldı. Türkiye’de tipik olarak insanlar tuzlanıp-saklanmış et ve sebzeyi fazla alarak, taze sebze ve meyveyi de sınırlı olarak total kalori ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Türkiye’de mide kanserinin yüksek oranda görülmesi böyle geleneksel diyetsel uygulamaların negatif yönde katkıda bulunabileceğini varsaydı. Bu varsayımı test etmek için, tek merkezli vaka-kontrollü kesitsel bir çalışma yürüttük.

YÖNTEMLER

Bu anket çalışmasına 2004-2005 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde takip edilen 81'i MCH olan toplam 161 hasta alındı. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındı. Bu çalışma, etik kurul izni (Tarih:21.10.2019, Sayı:215) ile Helsinki Beyanı'na uygun olarak yapılmıştır. Tüm MCH'larına MKTF'u ve BAF'u (Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ve modifiye edilen) kontrol gruplarına da sadece BAF'ı anketleri yapıldı. Katılımcılar bu formları cevaplayabilecek kognitif fonksiyona sahiptiler. Çalışma denekleri üç gruba ayrıldı. Grup 1: Histopatolojik olarak mide kanseri tanısı almış kişilerden (n: 81); Grup 2: Fizik muayene ve laboratuvar bulguları normal olan, malign risk grubu içinde olmayan (anamnezinde kanser öyküsü olmayan ve 1. derece yakınlarında kanser bulunmayan, n: 40, Kontrol 1) sağlıklı gönüllülerden; Grup 3: Mide kanseri dışında (kolon kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, mezotelyoma, osteosarkom gibi) herhangi bir malignitesi olan kişilerden seçildi (n: 40, Kontrol 2).

Sosyodemografik Veri Formu ve Besin Gruplarının Tanımlanması

MKTF'U (1) hastanın kimlik bilgisi, (2) sosyodemografi-sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi, (3) sigara-alkol anemnezi, (4) beslenme ve ilaç alışkanlıkları, (5) ağız hijyeni, (6) endoskopi-histopatoloji sonuçları, (7) anemnez ve fizik muayene, (8) laboratuvar, (9) aldığı tedaviler gibi değişkenleri içeriyordu.

BAF'unda (1) sosyodemografi-sosyokültürel-sosyoekonomik düzey, (2) mide rahatsızlık öyküsü, (3) ağız hijyeni, (4) yaşadığı evin koşulları, (5) alkol ve sigara anemnezi, (6) 23 besin ve içecek madde gibi değişkenler bulunmaktaydı. Besin ve içecekler olağan olarak Türk Toplumunun beslenme tarzını temsil ediyordu.

Besin Gruplarının Tanımlanması

BAF'unun 6.değişkeninde '23 besin ve içecek madde' analizinde aşağıdaki besin grupları bulunmaktadır: (1) ekmek, (2) et ve et ürünleri (kırmızı et, balık eti, tavuk eti, sosis, sucuk, pastırma), (3) ateş/-közde/-mangalda pişmiş et ürünleri, (4) tuzlanarak saklanmış et ürünleri, (5) çiğ etten yapılmış yiyecekler, (6) tuzlu peynir, (7) turşu, (8) zeytin, (9) tuzlanmış salamura zeytin, (10) çay, (11) çaya katılan şeker, (12) kahve, (13) süt, (14) kırmızı pul biberi, (15) meyve suyu, (16) meyve, (17) sebze, (18) salata, (19) tatlı, (20) yağ, (21) yumurta, (22) yoğurt, (23) kuruyemiş.

İstatistiksel Analiz

Verilerin istatistiksel analizinde International Business Machines (IBM), Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS) 22.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmada yer alan kategorik değişkenler ve gruplar arasındaki farklılıklar 'Pearson Chi-Square testi' ile değerlendirildi. P <0.05'ten küçük değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

MCH'ların demografik ve genel özellikleri (yaş, cinsiyet, meslek, ikamet yeri, öğrenim durumu, gelir düzeyi, kan grubu, sigara-alkol ve beslenme alışkanlıkları, geçirilmiş mide ameliyat öyküsü, ağız hijyeni, diş enfeksiyonu, diş fırçalama alışkanlığı, tümör evresi ve lokalizasyonu) belirlendi (Tablo I).

Tablo I: MCH'ların demografik ve genel özellikleri

Değişkenler	Kategori	n	%
Yaş	10-19	0	0
	20-29	1	(2,1)
	30-39	10	(12)
	40-49	13	(16)
	50-59	21	(26)
	60-69	24	(29,4)

	70-79	10	(12,2)
	80-89	2	(2,3)
Cinsiyet	Erkek	56	(69,1)
	Kadın	25	(30,9)
Meslek	Çiftçi	23	(28,4)
	Ev hanımı	26	(32,3)
	Memur	8	(9,9)
	Serbest	9	(11)
	İşçi	9	(11)
	İnşaatçı	6	(7,4)
İkamet yeri	Köy	15	(18,5)
	İlçe	32	(39,5)
	İl	34	(42)
Öğrenim Durumu	Cahil	51	(63,7)
	Okur-yazar	1	(1,3)
	İlkokul	20	(25)
	Ortaokul	2	(2,5)
	Lise	4	(5)
	Üniversite	2	(2,5)
Gelir düzeyi^a	<300 (Düşük)	54	(74)
	300-500 (Orta)	12	(16,4)
	>500 (Yüksek)	7	(9,6)
Kan grubu	A	26	(42,6)
	B	10	(16,4)
	AB	3	(4,9)
	O	22	(36,1)
Alışkanlıklar	Yok	48	(60,8)
	Alkol	0	0
	Sigara	29	(36,7)
	Alkol+Sigara	2	(2,5)
Beslenme Alışkanlıkları	Normal	54	(70,1)
	Sebze-meyve ağırlıklı	6	(7,8)

	Et ağırlıklı	17	(22,1)
Geçirilmiş ameliyatı mide	Hayır	75	(92,6)
	Evet	6	(4,4)
Ağız hijyeni	İyi	37	(54,5)
	Kötü	31	(45,5)
Diş enfeksiyonu	Yok	32	(47,1)
	Var	20	(29,4)
	Protez	16	(23,5)
Diş fırçalama alışkanlığı	Yok	41	(62)
	Bazen	16	(24)
	Düzenli	3	(5)
	Misvak kullanıyor	6	(9)
Mide lokalizasyonu	Distal	31	(40,8)
	Korpus	22	(29)
	Proksimal	23	(30,2)
Evre	Erken	?	?
	İleri	65	(80)

a: Dolar cinsinden hesaplanmış 1 aylık gelir düzeyi, n: Katılımcı Sayısı, %: Yüzde Oranı

MCH'ların %69,1'i erkek, %30,9'u kadındı. MCH'ların %18,5'i köyde, %39,5'i ilçede, %42'si şehirde ikamet ediyordu. MCH grubundaki kadınların tamamı ev hanımıydı. MCH grubundaki erkeklerin %28,4'ü çiftçi, %9,9'u memur, %11'i serbest, %11'i işçi, %7,4'ü inşaat işlerinde çalışıyorlardı. MCH'ların %63,7 okuma yazma bilmeyen, %1,3 okur-yazar, %25 ilkokul, %2,5 ortaokul, %5 lise, %2,5 üniversite statü düzeyindeydi. MCH'ların %74'ünün aylık gelir düzeyi <300 dolar, %16,4'ünün 300-500 dolar arası, %9,6'sının >500 dolar idi.

MCH'ların kan grubu incelendiğinde %42,6 A, %36,1 O, %16,4 B, %4,9 AB idi.

MCH'ların %36,7'i sigara kullanıcısı, %2,5'i sigara-alkol kullanıcısıydı. MCH'ların %60,8'inin alkol ve sigara alışkanlığı yoktu.

MCH'ların %70,1 normal, %7,8 sebze-meyve ağırlıklı, %22,1 et ağırlıklı besleniyordu.

MCH'ların %54,5'inin ağız hijyeni iyiydi, %45,5'inin ise kötüydü. Diş enfeksiyonu %47,1'inde yoktu, %29,4'ünde ise vardı. MCH'ların %23,5'inde diş protezi vardı. MCH'ların %62'sinde diş fırçalama alışkanlığı yoktu, %9'ü misvak kullanıyordu. MCH'ların bir kısmı arada bir (%24), çok az bir kısmının (%5) ise düzenli diş fırçalama alışkanlığı vardı.

Tümör lokalizasyonu olarak mide distali %40,8, mide korpusu %29 ve mide proksimali %30,2 izlendi. MCH'ların 65 tanesinde ilerlemiş mide kanseri tespit edildi. MCH'larımız içinde erken mide kanseri yoktur.

MCH ve kontrol grupları (kontrol-1 ve 2) yaş, cinsiyet, ikamet yeri, meslek, geçirilmiş mide ameliyatı ve mide rahatsızlık öyküsü, diş fırçalama sıklığı, dişlerde çürük, evin oda sayısı, evde oturanların sayısı, içme suyunun kaynağı, evde buzdolabı bulunup bulunmaması, gelir düzeyi, öğrenim durumu, sigara-alkol öyküsü gibi değişkenler açısından karşılaştırıldı (Tablo II).

Tablo II: Grupların genel özelliklerinin karşılaştırılması

Değişkenler	Kategori	MCH (n:81)		Kontrol-1 (n:40)		Kontrol-2 (n:40)		P
		n	%	n	%	n	%	
Yaş	10-19	0	0	0	0	3	(7,5)	
	20-29	1	(2,1)	1	(30)	4	(10)	
	30-39	10	(12)	8	(20)	3	(7,5)	
	40-49	13	(16)	7	(17,5)	8	(20)	
	50-59	21	(26)	7	(17,5)	8	(20)	
	60-69	24	(29,4)	4	(10)	8	(20)	

	70-79	10	(12,2)	2	(5)	5	(12,5)	
	80-89	2	(2,3)	0	0	1	(2,5)	
Cinsiyet	Erkek	55	(67,9)	1	(40)	2	(55)	,008
	Kadın	26	(32,1)	2	(60)	1	(45)	
İkamet yeri	Köy	15	(18,5)	3	(7,7)	1	(35,9)	,000
	İlçe	32	(39,5)	5	(12,8)	5	(12,8)	
	İl	34	(42)	3	(7,9)	2	(5,3)	
Meslek	Çiftçi	23	(28,1)	0	0	9	(22,5)	,000
	Ev hanımı	26	(33,0)	1	(25,6)	1	(37,5)	
	Memur	8	(9,7)	2	(69,2)	1	(25)	
	Serbest	9	(11,1)	0	0	0	0	
	İşçi	9	(11)	2	(5,2)	6	(15)	
	İnşaatçı	6	(7,1)	0	0	0	0	
Geçirilmiş mide ameliyatı	Hayır	2	(52,5)	3	(95)	40	(100)	,000
	Evet	19	(47,5)	2	(5)	0	0	
Mide Rahatsızlık Öyküsü	Hayır	2	(52,5)	3	(42,5)	26	(66,6)	,000
	Evet	19	(47,5)	2	(57,5)	13	(33,4)	
Dişlerin fırçalama alışkanlığı	Her gün	4	(12,5)	2	(85,3)	9	(29)	,000
	3-5 gün/w	8	(25)	2	(5,9)	7	(22,6)	
	1-2 gün/w	3	(9,3)	1	(2,9)	6	(19,4)	
	1-2 gün/m	6	(18,8)	0	0	4	(12,1)	
	1-2 gün/y	1	(3,4)	2	(5,9)	5	(16,1)	
		1	(3,4)	2	(5,9)	5	(16,1)	

Dışerde çürük	Hayır	5	(12,8)	1	(29)	9	(24,3)	,306
	Evet	34	(87,2)	27	(71)	28	(75,7)	
Evin oda sayısı	1 odalı	2	(5)	0	0	0	0	,014
	2 odalı	12	(30)	6	(15)	6	(15)	
	3 odalı	18	(45)	11	(27,5)	15	(37,5)	
	>3 odalı	8	(20)	23	(27,5)	19	(47,5)	
Evde oturanların sayısı	1-3	5	(12,5)	2	(50)	2	(5)	,000
	4-5	12	(30)	8	(20)	7	(17,5)	
	6-10	16	(40)	10	(25)	17	(42,5)	
	>10	7	(17,5)	2	(5)	14	(35)	
İçme suyun kaynağı	Şehir şebekesi	26	(65)	40	(100)	28	(70)	,000
	Kuyu suyu	6	(15)	0	0	5	(12,5)	
	Köy çeşmesi	8	(20)	0	0	7	(17,5)	
Evde buzdolabı	Var	37	(92,5)	40	(100)	36	(90)	,124
	Yok	2	(7,5)	0	0	4	(10)	
Gelir düzeyi^b	<500	31	(79,5)	9	(23)	19	(48,7)	,000
	500-1000	7	(18)	12	(30,8)	13	(33,3)	
	1000-1500	1	(2,5)	11	(28,2)	6	(15,4)	
	>1500				(18)		(2,6)	
	Okur-yazar değil	21	(52,5)	4	(10)	18	(45)	
	Okur-yazar	5	(12,5)	5	(12,5)	3	(7,5)	

Öğrenim durumu	İlkokul	9	(22,5)	3	(7,5)	8	(20)	,000
	Orta okul	1	(2,5)	3	(7,5)	4	(10)	
	Lise	3	(7,5)	5	(12,5)	4	(10)	
	Üniversite	1	(2,5)	20	(50)	3	(7,5)	
Sigara	Hayır	19	(47,5)	23	(57,5)	17	(42,5)	,000
	Evet	11	(27,5)	13	(32,5)	13	(32,5)	
Alkol	İçmiş-bırakmış	10	(25)	4	(10)	10	(25)	,531
	İçmedi m	35	(87,5)	32	(80)	34	(85)	
	Her gün	2	(5)	1	(2,5)	2	(5)	
	3-5 gün/w	0	0	0	0	1	(2,5)	
	1-2 gün/w	3	(7,5)	3	(7,5)	1	(2,5)	
	1-2 gün/m	0	0	2	(5)	1	(2,5)	
1-2 gün/y	0	0	2	(5)	1	(2,5)		

b. Dolar cinsinden hesaplanmış 1 aylık gelir düzeyi P; Pearson Chi-Square testi m: ay, w: hafta y: yıl

Her iki kanser grubunda ileri yaşlılık, sağlıklı gönüllü bireylerde daha çok genç yaşlılık baskındı. Kontrol 1 grubunun %40'ı erkek, %55'i kadındı. Kontrol 2 grubunun ise %60'ı erkek, %45'i kadındı. MCH ve kontrol-2 grubunda erkek cinsiyet (%67,9, %55, sırasıyla) daha fazla iken kontrol-1'de kadınlar (%60) daha fazlaydı. MCH'larda erkek cinsiyet istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazlaydı ($p<0,05$), Kontrol-1 grubunun çoğunluğu (%79,5) kentlerde oturuyordu ($p>0,05$). MCH'larda ise kırsal yaşam baskındı. Kontrol-2 ise daha çok kent merkezinde (%51,3) oturuyordu. MCH'ların çoğunluğu ev hanımı (%33) ve çiftçiydi (%28,1). Kontrol-1'de çoğunluğu memurlar (%69,2; ($p<0,05$), kontrol-

2'ise çoğunluğu ev hanımları (%37,5) oluşturuyordu. MCH'larda baskın olan meslek grubu; ev hanımı ve çiftçilik mesleği idi.

Günlük diş fırçalama alışkanlığı kontrol-1'de (%85,3; $p<0,05$) anlamlı derecede fazlaydı. MCH ve kontrol-2 grubu daha az oranda günlük fırçalama sıklıklarına sahiplerdi (%12,5, %29, sırasıyla). Kontrol-1 grubu ile karşılaştırıldığında MCH ve kontrol-2 gruplarının günlük düzenli diş fırçalama alışkanlıkları bulunmuyordu. Diş çürüğü oranları her üç grupta birbirine benzerdi, istatistiksel anlamlılık taşıyordu ($p> 0,05$).

MCH'ların %40'ında, kontrol-2'lerin %42,5'inde evinde oturan kişi sayısı 6-10 arasındayken, kontrol-1'lerin evinde oturan kişi sayısı %50 ($p<0,05$) oranında 1-3 arasında izleniyordu. Mide kanseri ile kalabalık ortamda yaşayanların arasında istatistiksel anlamlılık içerisinde bir ilişki vardı ($p<0,05$).

Aylık gelir düzeyi MCH'ların %79,5'inde <500 dolar, kontrol-1'in %30,8'inde 500-1500 dolar arasında, kontrol-2'in %48,7'sinde <500 dolar ($p<0,05$) idi.

MCH'larımızın %52,5'i okur-yazar olmayan, kontrol-1'in %50'si üniversite mezunu, kontrol-2'nin %45'i cahil ($p<0,05$) idi. MCH ve kontrol-2 gruplarının sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi istatistiksel anlamlılık içerisinde daha düşüktü ($p<0,05$).

MCH'ların %47,5'i, kontrol-1'in %57,5'i, kontrol-2'in %42,5'i sigara içmiyordu ($p<0,05$). Sigara içimi her iki kanser grubunda istatistiksel olarak anlamlı değildi. Gruplar arasında alkol tüketimi açısından istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi ($p>0,05$).

MCH ve kontrol grupları (kontrol-1 ve 2) yediği ekmek sayısı/gün, ekmeğin pişirildiği yer, et-et ürünleri, tütülenmiş et ürünleri, sucuk-pastırma-sosis yeme, tuzlanarak saklanmış et ürünleri yeme, çiğ etten yapılmış yiyecekler yeme, tuzlu peynir yeme, turşu yeme, tuzlanmış salamuralı zeytin yeme, çay içme, çaya katılan

şeker miktarı, kahve içme, süt içme, kırmızı pul biberi kullanımı, meyve suyu içme, meyve yeme, sebze tüketme, salata yeme, tatlı, kullanılan yağ türü, ailenin aylık yağ tüketimi, yumurta yeme, yoğurt yeme ve kuruyemiş yeme gibi beslenme değişkenleriyle karşılaştırıldı (Tablo III).

Tablo III: Beslenme özelliklerinin karşılaştırması

Değişkenler	Kategori	MCH (n:81)		Kontrol-1 (n:40)		Kontrol-2 (n:40)		P
		n	%	n	%	n	%	
Yediği ekmek sayısı/gün	<1 ekmek	20	(50)	23	(57,5)	16	(40)	,331
	1 ekmek (350 gr)	6	(15)	10	(25)	8	(20)	
	2 ekmek (700 gr)	11	(27,5)	6	(15)	14	(35)	
	>3 ekmek (>1050 gr)	3	(7,5)	1	(2,5)	2	(5)	
Ekmeğin pişirildiği yer	Tandır fırını	22	(55)	4	(10)	17	(43,6)	,000
	Fırın	13	(32,5)	29	(72,5)	14	(35,9)	
	Fırın+tandır fırın	5	(12,5)	7	(17,5)	8	(20,5)	
Et ve et ürünleri yeme	Her gün	2	(5,6)	12	(30,8)	1	(2,6)	,001
	3-5 gün/w	8	(22,2)	11	(28,2)	7	(18)	
	1-2 gün/w	14	(38,9)	12	(30,8)	24	(61,5)	
	1-2 gün/m	9	(25)	4	(10,2)	5	(12,8)	
	1-2 gün/y	3	(8,3)	0	0	2	(5,1)	
Tütülenmiş et ürünleri yeme	Her gün	1	(2,9)	0	0	1	(2,5)	,289
	3-5 gün/w	1	(2,9)	3	(7,9)	5	(12,5)	
	1-2 gün/w	10	(29,5)	10	(26,3)	9	(22,5)	
	1-2 gün /m	8	(23,5)	18	(47,4)	13	(32,5)	
	1-2 gün/y	14	(41,2)	7	(18,4)	12	(30)	
Sucuk, pastırma,	Her gün	0	0	0	0	3	(11,1)	
	3-5 gün/w	1	(4,6)	4	(12,1)	2	(7,4)	
	1-2 gün/w	2	(9)	9	(27,3)	4	(14,8)	

sosıs yeme	1-2 gn/m	6	(27,3)	9	(27,3)	6	(22,2)	,156
	1-2 gn/y	13	(59,1)	11	(33,3)	12	(44,5)	
Tuzlanıp-saklanmış et rnleri yeme	Her gn	1	(5,6)	3	(25)	1	(4,7)	,021
	3-5 gn/w	0	0	1	(8,3)	3	(14,3)	
	1-2 gn/w	4	(22,2)	2	(16,6)	9	(42,9)	
	1-2 gn/m	2	(11,1)	4	(33,5)	5	(23,8)	
	1-2 gn/y	11	(61,1)	2	(16,6)	3	(14,3)	
iğ etten yapılmış yiyecekler yeme	Her gn	0	0	0	0	1	(4)	,369
	3-5 gn/w	1	(4,6)	2	(6,3)	1	(4)	
	1-2 gn/w	2	(9)	1	(3,1)	3	(12)	
	1-2 gn/m	8	(36,4)	21	(65,6)	11	(44)	
	1-2 gn/y	11	(50)	8	(25)	9	(36)	
Tuzlu peynir yeme	Her gn	12	(35,3)	26	(74,3)	24	(72,7)	,005
	3-5 gn/w	12	(35,3)	3	(8,6)	8	(24,2)	
	1-2 gn/w	7	(20,6)	5	(14,2)	1	(3,1)	
	1-2 gn/m	3	(8,8)	1	(2,9)	0	0	
	1-2 gn/y	0	0	0	0	0	0	
Turşu yeme	Her gn	2	(6)	7	(21,9)	4	(11,4)	,241
	3-5 gn/w	5	(15,2)	5	(15,6)	10	(28,6)	
	1-2 gn/w	13	(39,4)	15	(46,9)	14	(40)	
	1-2 gn/m	11	(33,3)	5	(15,6)	6	(17,1)	
	1-2 gn/y	2	(6,1)	0	0	1	(2,9)	
Tuzlanmış salamura zeytin yeme	Her gn	3	(10,7)	19	(57,6)	12	(33,3)	,001
	3-5 gn/w	12	(42,9)	6	(18,2)	10	(27,8)	
	1-2 gn/w	7	(25)	8	(24,2)	13	(36,1)	
	1-2 gn/m	5	(17,8)	0	0	0	0	
	1-2 gn/y	1	(0,6)	0	0	1	(2,8)	
ay ime	Her gn	33	(89,2)	36	(94,7)	37	(94,9)	
	3-5 gn/w	1	(2,7)	2	(5,3)	2	(5,1)	
	1-2 gn/w	1	(2,7)	0	0	0	0	
	1-2 gn/m	2	(5,4)	0	0	0	0	,351
	1-2 gn/y	0	0	0	0	0	0	
aya katılan şeker miktarı	0-1 kesme şeker (<1 tatlı kaşığı)	6	(16,2)	11	(29,7)	9	(24,3)	,592
	1 kesme şeker (1 tatlı kaşığı)	7	(18,9)	6	(16,2)	6	(16,2)	
	2 kesme şeker (2 tatlı kaşığı)	18	(48,7)	13	(35,6)	1	8 (48,7)	
	3 kesme şeker (3 tatlı kaşığı)	5	(13,5)	5	(13,1)	1	(2,7)	
Kahve ime	>3 kesme şeker	1	(2,7)	2	(5,4)	3	(8,1)	,001
	Her gn	1	(5)	4	(13,3)	1	(3,3)	
	3-5 gn/w	1	(5)	10	(33,4)	4	(13,3)	
	1-2 gn/w	3	(15)	9	(30)	11	(36,7)	
	1-2 gn/m	8	(40)	6	(20)	13	(43,4)	
St ime	1-2 gn/y	7	(35)	1	(3,3)	1	(3,3)	,113
	Her gn	7	(23,3)	2	(9)	4	(12,3)	
	3-5 gn/w	12	(40)	6	(27,3)	6	(20)	
	1-2 gn/w	6	(20)	10	(45,5)	11	(36,7)	
	1-2 gn/m	2	(6,7)	4	(18,2)	8	(27,7)	
Kırmızı pul biberi kullanımı	1-2 gn/y	3	(10)	0	0	1	(3,3)	,018 1
	Her gn	6	(24)	15	(46,9)	14	(46,7)	
	3-5 gn/w	4	(16)	13	(40,6)	6	(20)	
	1-2 gn/w	6	(24)	2	(6,3)	5	(16,7)	
	1 gn/w	3	(12)	1	(3,1)	1	(3,3)	
Meyve suyu ime	1-2 gn/m	5	(20)	1	(3,1)	3	(10)	,083
	Her gn	3	(10,3)	3	(10,3)	6	(17,7)	
	3-5 gn/w	4	(13,8)	6	(20,7)	7	(20,5)	
	1-2 gn/w	7	(24,2)	6	(20,7)	12	(35,3)	
1 gn/w	4	(13,8)	8	(27,6)	3	(8,8)		

	1-2 gün/m	4	(13,8)	6	(20,7)	4	(13,8)		
	1-2 gün/y	7	(24,1)	0	0	2	(5,9)		
Meyve yeme	Her gün	4	(11,4)	20	(51,3)	13	(33,3)	,004	
	3-5 gün/w	8	(22,8)	12	(30,8)	14	(35,9)		
	1-2 gün/w	13	(37,2)	6	(15,4)	8	(20,5)		
	1 gün/w	6	(17,1)	0	0	3	(7,7)		
	1-2 gün/in	3	(8,6)	1	(2,5)	0	0		
	1-2 gün/y	1	(2,9)	0	0	1	(2,6)		
		Her gün	10	(28,6)	24	(61,5)	18		(47,4)
Sebzeye tüketme	3-5 gün/w	10	(28,6)	9	(23,4)	8	(21)		
	1-2 gün/w	11	(31,4)	6	(15,1)	9	(23,7)		
	1 gün/w	3	(8,6)	0	0	3	(7,9)		
	1-2 gün/m	0	0	0	0	0	0		
	1-2 gün/y	1	(2,8)	0	0	0	0		
		Her gün	3	(8,6)	18	(50)	9	(24,3)	,001
	Salata yeme	3-5 gün/w	11	(31,4)	11	(30,6)	19	(51,4)	
1-2 gün/w		8	(22,9)	6	(16,6)	6	(16,2)		
1 gün/w		6	(17,1)	1	(2,8)	2	(5,4)		
1-2 gün/m		5	(14,3)	0	0	1	(2,7)		
1-2 gün/y		2	(5,7)	0	0	0	0		
		Her gün	2	(6,1)	2	(5,7)	2	(5,4)	
Tatlı yeme		3-5 gün/w	3	(9)	4	(11,4)	5	(13,5)	
	1-2 gün/w	7	(21,2)	9	(25,7)	13	(35,2)		
	1 gün/w	7	(21,2)	10	(28,6)	9	(24,3)		
	1-2 gün/m	12	(36,4)	10	(28,6)	7	(18,9)		
	1-2 gün/y	2	(6,1)	0	0	1	(2,7)		
		Katı margarin	14	(35)	1	(2,6)	12	(30,8)	,000
	Kullanılan yağ türü	Zeytin yağı	5	(12,5)	12	(31,6)	5	(12,8)	
Diğer sıvı yağlar		14	(35)	15	(39,5)	14	(35,9)		
Katı+sıvı yağ		6	(15)	10	(26,3)	8	(20,5)		
Tereyağı		1	(2,5)	0	0	0	0		
<5 kg-litre		13	(33,3)	26	(68,4)	6	(15,4)		

Ailenin aylık yağ tüketimi	5-10 kg-litre	12	(30,8)	5	(13,2)	8	(20,5)	,000	
	10-15 kg-litre	5	(12,8)	3	(7,9)	10	(25,6)		
	15-25 kg-litre	7	(18)	0	0	9	(23,1)		
	Bilinmiyor	2	(5,1)	4	(10,5)	6	(15,4)		
Yumurta yeme	Her gün	1	(2,7)	4	(12,5)	8	(21,6)	,183	
	3-5 gün/w	12	(32,4)	5	(15,6)	8	(21,6)		
	1-2 gün/w	15	(40,6)	18	(56,3)	13	(35,2)		
	1 gün/w	5	(13,5)	3	(9,4)	6	(16,2)		
	1-2 gün/m	2	(5,4)	2	(6,2)	2	(5,4)		
	1-2 gün/y	2	(5,4)	0	0	0	0		
		Her gün	17	(44,7)	16	(40)	11		(29,7)
Yoğurt yeme	3-5 gün/w	15	(39,5)	15	(37,5)	16	(43,3)		
	1-2 gün/w	4	(10,5)	5	(12,5)	5	(13,5)		
	1 gün/w	2	(5,3)	1	(2,5)	3	(8,1)		
	1-2 gün/m	0	0	3	(7,5)	2	(5,4)		
	1-2 gün/y	0	0	0	0	0	0		
		Her gün	3	(12)	6	(18,2)	4	(11,8)	,000
	Kuruyemiş yeme	3-5 gün/w	2	(8)	10	(30,3)	4	(11,8)	
1-2 gün/w		5	(20)	6	(18,2)	16	(47,1)		
1 gün/w		6	(24)	6	(18,2)	2	(5,8)		
1-2 gün/m		7	(28)	5	(15,1)	8	(23,5)		
1-2 gün/y		2	(8)	0	0	0	0		

P; Pearson Chi-Square testi m: ay, w: Hafta y: Yıl, kg: Kilogram, gr: gram

MCH ve kontrol grupları yediği ekmek sayısı /gün yönünden karşılaştırıldığında istatistiki bir fark bulunmadı ($p>0,05$). Her üç grupta çoğunlukla günde birden az ekmek tüketiyordu. Yediği ekmeğin pişirildiği yer MCH'larda %55, kontrol-1'de %10, kontrol-2'de %43,6 oranında tandır fırınıydı. Tandır ekmeği yiyenlerle mide kanseri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur ($p<0,05$).

Et ve et ürünlerinin günlük olarak tüketimi MCH'de %5,6, kontrol-1'de %30,8, kontrol-2'de

%2,6 (p<0,05) görüldü. Tütsülenmiş et ürünleri yeme, sucuk, pastırma ve sosis yeme yönünden her üç grup karşılaştırıldığında istatistiki bir fark bulunmadı (p> 0,05). Tuzlanıp-saklanmış et ürünleri tüketme günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hesaplandı; MCH grubunda günlük %5,6, kontrol-1 grubunda %25, kontrol-2 grubunda %4,7 bulundu (p<0,05). Tuzlu peynir yeme günlük olarak hesaplandığında MCH grubunda %35,3, kontrol-1 grubunda %74,3, kontrol-2 grubunda %72,7 (p<0,05) bulundu.

Çay içme yönünden her üç grup arasında istatistik bir fark bulunmadı (p> 0,05). Kırmızı pul biberi tüketimi günlük olarak hesaplandığında MCH'larda günlük %24, kontrol-1'de günlük %46,9, kontrol-2'de günlük %46,7 (p <0,05) saptandı.

Meyve yeme günlük ve haftalık olarak hesaplandığında MCH'larda haftalık %37,2, kontrol-1'de %51,3 (p<0,05), kontrol-2'de haftalık %35,9 saptandı. Sebze tüketme açısından her üç grup karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistik bir fark bulunmadı (p> 0,05).

Ailenin aylık yağ tüketimi MCH'ların %33,3'ünde 5 kg veya litreden az, kontrol-1'in %68,4'ünde (p<0,05) 5 kg veya litreden az, kontrol-2'in % 15,4'ında 5 kg veya litreden az olduğu tespit edildi.

TARTIŞMA

Mide karsinomunun belirli bölgelerde ve belirli toplumlarda anlamlı olarak daha sık olması etyopatogenezinde çevresel faktörlerin araştırılmasına yol açmıştır. Ancak, çeşitli çalışmalarda farklı sonuçların elde edilmesi, araştırmacıları belirli bir besin türünün etkisinden çok besinleri saklama ve pişirme alışkanlıklarındaki farklılıklara ve besinlerdeki koruyucu faktörlerin etkilerine yönlendirmiştir¹.

Çalışmaya katılan MCH'ların genel özellikleri;

- İleri yaş, erkek cinsiyet, A kan grubu
- Sebze-meyveden kısıtlı beslenme
- Kırsal kesimde yaşama, ekmeğini tandır fırınında pişirme, et ve et ürünleri az tüketme
- Kalabalık aile ortamında yaşama
- Eğitim düzeyleri düşük, aylık gelir düzeyleri normal şartların altında
- Ağız bakımı ve diş fırçalama alışkanlıkları yetersizliği
- Tanı aldıklarında mide kanseri ileri evrede
- Çiftçilik ve ev hanımı mesleği baskınlığı
- İlk başvurusunda çoğunda anemi saptanması

Erkeklerde demir eksikliği anemisi, kadınlarda ve erkeklerde gaitada gizli kan varlığı gizli bir gastrointestinal lezyon açısından araştırmayı zorunlu kılar⁸. Yukarıdaki özellikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, hepsinin altında sosyoekonomik ve sosyokültürel düzey düşüklüğü yattığı düşünülebilir. Kalabalık yaşam, kırsal yaşam, toprakla temas halindeki çiftçilik mesleği, içme (kuyu, çeşme) suları mide kanserinde etiyolojik olarak suçlanan^{9,11} *helicobacter pylori* prevalansını artırmaktadır. İçme suyu ile MCH ilişkisini saptamadık. Gastrik kanser riski sosyoekonomik düzeyi düşük sınıfın içinde en fazladır⁸. Toprak ve içme sularındaki yüksek nitrat konsantrasyonu gastrik kanserden ölüm hızı fazla olan alanlarda gözlenmiştir¹². Türkdoğan ve arkadaşları 2003 yılında Van yöresinde yapmış oldukları çalışmada odun-tezek ateşinde (tandır fırını) pişen ekmekte ve içme suyu örneklerinde nitrat ve nitrit düzeyleri ileri derecede anlamlı olarak yüksek bulmuşlardır¹³.

Demirer ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada diş fırçalama alışkanlığının MCH'larda pek olmadığı vurgulanmıştır¹⁴. Yüksek kanser riski olanlar; ailede mide kanseri varlığı, A kan grubu, erkek cinsiyet,

ileri yaş, tütülenmiş tuzlu yiyecek ve düşük miktarda C vitamini tüketme, yüksek lahana diyeti, aklorhidri, düşük sosyoekonomik düzey, düşük miktarda A vitamini alımı, sigara ve alkolü alışkanlık edinme sayılabilir^{9,10}.

Gastrik karsinogenesiste sigara dumanında bulunan nitrozaminler ve diğer nitroz bileşikler suçlanmış¹⁵. Gastrik kanser riski üzerinde alkol etkileri için bir kaç epidemiyolojik kanıt vardır¹⁶. Bir Japon kohort çalışması gastrik kanserle pozitif bir ilişki göstermesine rağmen, çoğu böyle çalışmalar hiçbir ilişki gösterememişlerdir¹⁷⁻¹⁹. Bizim çalışmamızda MCH ve alkol-sigara ilişkisi saptamadık.

Çalışmamızda her üç grupta evde buzdolabı bulunma eşitti. Muhtemelen çalışmayı yürüttüğümüz bölgede yaz mevsiminin çok sıcak geçmesinden dolayı herkes buzdolabı alma zorunluluğu hissetmektedir. Buzdolabı kullanımı dolaylı olarak (saklanmış gıdanın alımını azaltır ve taze meyve-sebze tüketimini artırır) mide kanserin riskini düşürmeye yol açabildiği varsayılmaktadır^{20,21}, ancak buzdolabının ne miktarda bu amaç için kullanıldığı bilinmemektedir. Belki de suyu daha çok soğutmak için kullanılmaktadır. MCH'larımız sebze ve meyveden kısıtlı besleniyordu. Demirer ve arkadaşları 1990'da iç Anadolu bölgesinde yaptıkları bir vaka-kontrollü çalışmada MCH'larda buzdolabı kullanımının daha az olduğunu bulmuşlardır¹⁴.

Tütülenmiş etler, sucuk, pastırma, sosis, tuzlu peynir, turşu, tuzlanmış salamuralı zeytin, et-et ürünleri, tandır fırınında pişmiş beyaz ekmek, kırmızı pul biberi, kuruyemiş gibi değişkenlerin başlığı altında nitrozasyonu ve tuzu değerlendirmek gerekir. Nitrozasyona ve tuza başlamadan şunu vurgulamakta fayda var, çalışmamızda demin söz ettiğim değişkenlerin çoğu anlamlı bulunmadı. Bunu çalışmamızdaki MCH sayımızın yetersizliğine

bağlanabiliriz. Kanserli hastalarımızın çoğunun sosyokültürel düzeyi düşük ve genel durumu düşkün olduğu için belki de anketi yeterince anlayamadılar. Anlamlı çıkan değişken; yedikleri ekmeğin tandır fırınında pişiyor olmasıdır. Bu, gıdalardaki nitratın yüksek konsantrasyonun uzun süreli sindirimi yüksek mide kanser riskiyle ilişkili olduğu görülmektedir. Bakteriler nitratı karsinojenik nitrite dönüştürdüğü düşünülüyor. Böyle bakteriler kısmen bekletilmiş gıdaların sindirimi yoluyla alınabilir. Dünyada sosyoekonomik düzeyi düşük sınıflarda bu bakteriler gıdalarla bolca alınır. Helikobakter pilori gibi bakterilerin midede bakteriyel artışı, gastrik asiditenin azalması, kronik gastrite neden olarak nitratı nitrite dönüştürür⁸. Mevcut çalışmada, sıklıkla soya sosuyla tuzlu baharat kullanılan turşu ve balık (çiğ, kaynatılmış, kızartılmış balık) gibi tuzlanmış gıdalar gastrik kanserle hiçbir ilişkinin güçlü kanıtı bulunmadı. Yüksek ısıda pişirilmiş ve uzun bir süre için heterosiklik aminler içeren hayvansal besinler hayvansal karsinojenler ve mutajenlerdir¹⁶.

Tatlı, beyaz ekmek, çaya katılan şeker miktarı, çiğ etten yapılmış yiyecekler gibi değişkenler nişasta başlığı altında incelenebilir. Nişasta literatürde mide tahribatını en az tuz kadar yapmaktadır. Çalışmamızda bu değişkenlerle anlamlı bir sonuç çıkmadı. Muhtemel sebep, çalışmayı yürüttüğümüz bölgede insanların büyük bir kısmı sofralarında beyaz ekmek, unlu tatlılar, aperatif olarak çiğ köfte bulundurmalarıdır. Ek olarak aynı bölgede yaşayan insanların tümü şekeri tüketmekten hoşlanırlar. Buiatti ve arkadaşlarına⁷ göre nişasta ürünleri tekrar ısındıktan (bakteriyel içerikte yeterli düşüş yokluğunda) sonra sıklıkla tüketilmektedir. Nişastalı gıdalar düşük protein diyetiyle ilişkili olabiliyor²². Sonuçta, yüksek nişastalı diyetler gastrik mukozada fiziksel iritasyon, gastrik musinde düşme, gastrik pH'nın düşmesi sonucunda

mekanik olarak hasarla sonuçlanabilir^{22,23}. Özellikle kompleks tahıllardan elde edilen proteinlerin yüksek seviyede, diyetle hayvansal yağ ve proteinlerin düşük düzeyde olması, lifli ve taze yeşil bitkilerin seyrek yenilmesi, tuz ve nitratın fazla tüketilmesi mide karsinom gelişimini kolaylaştıran etmenler olarak öngörülmüştür¹. Literatürle uyumlu olarak çalışmamıza katılan MCH'ları az et (protein) tüketiyorlardı.

Taze, yeşil-sarı sebzeler ve süt mide kanseri gelişimine karşı koruyucu faktörlerdir⁶. Çalışmamızda meyve suyu, sebze, yoğurt, yumurta ve süt MCH ilişkisizken, salata ve meyve ise MCH ile ilişkili bulundu. Çalışma yürüttüğümüz bölgede hayvansal yağ, süt ürünleri, yumurta, içkembe, hayvan iç organların kavurması ve tütsülenmesi insanların ana besin kaynağıdır. Bunun üzerine katkı olarak tuzu düşünebilirsiniz. Sosyoekonomik düzey ve kültür nedeniyle sebze ve meyve ya bulamıyor ya da alışkanlık haline getirmemiştir. Ayrıca bu gıda grupları, diğer besleyici ve biyoaktif maddeler arasında, askorbik asit, B-karoten ve diğer karotenoidlerden zengindir. Gerçekten vitamin C intragastrik nitrözasyonu bloke eder, böylece gastrik karsinogenezisde, atrofik gastrit, displazi, karsinoma gelişim basamaklarına doğru aşamayı engeller²⁴. Total sebze ve meyve alımı üzerindeki kohort çalışmalarında tespit edilen kanıt, bir meta-analiz yaklaşımda anlamlı protektif etki gösterilmemiş²⁵.

Çalışmamıza katılan bireylerde her üç grupta eşit bir şekilde çay içilmekteydi. Kahve MCH grubunda az tüketilmektedir. Çalışmayı yürüttüğümüz alanda yaşayan halkın ana içecek kaynağı sudan sonra çaydır. Kahve tüketimi daha azdır. İsveç'te vaka-kontrollü bir çalışmada siyah çay alımının gastrik kanser riskinde önemli düşüşle ilişkili olduğu gösterilmiştir²⁶. Kahve tüketimi erkeklerde mide kanserinin riskiyle ilişkisinde önemli

zıtlık gösterilmiştir. Batı tarzı kahvaltısı olan erkekler mide kanserin önemli düşük riskine sahiptir. Kahve tüketimi batı diyet alışkanlığı şeklinde düşünülmesi gerekir. İnsanlarda normal miktarlarda tüketildiği zaman¹⁹ kahve karsinojenik olacağı düşünülmemesine rağmen, mutajenik maddeler kahvede²⁷⁻²⁹ bulunmuştur. Gastrik karsinogenezisde kahve ve çayın rolü üzerinde daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kullanılan yağ türü miktarına gelince; Katı margarin kullanımı ve aylık yağ tüketimi MCH'larımızda fazla bulundu. Katı margarin en ucuz yağdır, çalışmayı yürüttüğümüz sahada genelde bu yağ kullanılmaktadır. Kavurma ve tava had safhada tüketilmektedir. Bu nedenle aylık yağ tüketimi oldukça fazladır. Az yağ alımı daha dengeli bir diyetle seyrettiği için koruyucu etkili olabilir⁸. Protein, sature yağ, kolesterol ve sodyumun fazla tüketimi gastrik kanser riskini artırır. Oysa poliansature yağ, vitamin A-C tüketimi gastrik kansere protektif etkiye sahip olabilir³⁰. Et ve et ürünlerinin tüketimi MCH ile ilişkisi saptanmadı. Rafine edilmiş şeker ve yağdan zengin beslenme gastrik kanserle sürekli ilişkisizdir³¹.

SONUÇ

Mevcut çalışmada mide kanseri ile besin grupları arasındaki ilişkileri analiz edildi. Bazı besin maddeleri MCH ile ilişkiliyken, bazıları ilişkisizdi. İleri yaş, erkek cinsiyet, kırsal yaşam, ev hanımı ve çiftçilik mesleklerini icra etme, sosyokültürel-sosyoekonomik düzey düşüklüğü, kalabalık ailede yaşam, A kan grubu, sebze-meyveden kısıtlı beslenme, kötü ağız hijyeni ve diş fırçalama alışkanlığının yetersizliği MCH'larında anlamlı bulunan değişkenlerdi. MCH'ları et, tuzlanıp-saklanmış et ürünleri, tuzlu peynir, tuzlanmış salamura zeytin, kahve, kırmızı pul biberi, meyve, salata, kuruyemiş gibi besin ve içecek gruplarını az tükettikleri tespit edildi. MCH'ları tandır fırın

(ateşte/közde pişmiş) ekmeği ve katı-sıvı yağ tüketimi oldukça anlamlıydı. Mide kanseri ile beslenme arasındaki ilişkiyi aydınlatmak için daha kapsamlı ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Etik Kurul Kararı: Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındı. Bu çalışma, etik kurul izni (Tarih:21.10.2019, Sayı:215) ile Helsinki Beyanı'na uygun olarak yapılmıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal Destek: Bu çalışma her hangi bir fon tarafından desteklenmemiştir.

Declaration of Conflicting Interests: The authors declare that they have no conflict of interest.

Financial Disclosure: No financial support was received.

KAYNAKLAR

1. Correa, P. The epidemiology of gastric cancer. *World J. Surg.* 15, 1991: 228-34. <https://doi.org/10.1007/BF01659057>
2. Karaoğuz H, İçli F. Cancer problem in Türkiye. *J Ankara Med School* 1993; 15: 547-58.
3. Reiter W, Stieber P, Reuter C et al. Prognostic value of preoperative serum levels of CEA, CA 19-9, CA 72-4 in gastric carcinoma. *Anticancer Res* 1997; 17: 2903-6.
4. Sugimura T, Wakabayashi K. Gastric carcinogenesis: diet as a causative factor. *Med Oncol Tumor Pharmacother.* 1990; 7: 87-92.
5. Howard W, Bruckner MD, John C, et al. Neoplasm of the stomach Cancer. *Medicine*, 2002; 7: 1355-90.
6. Tominaga S. Cancer incidence in Japanese in Japan, Hawaii, and Western United States. *NCI Monogr* 1985; 69: 83-92.

7. Buiatti E, Palli D, Decarli A, et al. A case-control study of gastric cancer and diet in Italy. *Int J Cancer* 1989; 44: 611-6.
8. J. Larry Jameson, Dan L. Longo, Stephen L. Hauser, Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper. *Harrison's principles of internal (Boşluk giderildi)medicine* 15 th edition. Volum 1 sayfa 580
9. Akdoğan RA ve ark. Mide Tümörleri, Gastroenteroloji, Türk Gastroenteroloji Vakfı, 2002: 107-12.
10. Graziano F, Humar B, Guilford P. The role of the E-cadherin gene (CDH1) in diffuse gastric cancer susceptibility: from the laboratory to clinical practice. *Ann Oncol* 2003; 14: 1705-13.
11. Antonioli DA. Precursors of gastric carcinoma: a critical review with a brief description of early (curable) gastric cancer. *Hum Pathol.* 1994; 25: 994-1005.
12. Goldman ausiello. *cecil textbook of medicine* 22th edition sayfa: 1208.
13. Türkdogan MK, Testereci H, Akman N, et al. Dietary nitrate and nitrite levels in an endemic upper gastrointestinal (esophageal and gastric) cancer region of Turkey. *Turk J Gastroenterol.* 2003; 14: 50-3.
14. Demirer T, Icli F, Uzunalimoglu O, et al. Diet and stomach cancer incidence. A case-control study in Turkey. *Cancer.* 1990; 65: 2344-8.
15. Jedrychowski W, Wahrendorf J, Popiela T, et al. A case-control study of dietary factors and stomach cancer risk in Poland. *Int J Cancer* 1986; 37: 837-42.
16. Corella D, Guillén M. Dietary habits and epidemiology of gastric carcinoma. *Hepatogastroenterology* 2001; 48: 1537-43.
17. Glade MJ. Food, nutrition, and the prevention of cancer: a global perspective. *American Institute for Cancer Research/World Cancer Research Fund, American Institute for*

- Cancer Research, 1997. Nutrition. 1999; 15: 523-6.
18. Kato I, Tominaga S, Ito Y, et al. A prospective study of atrophic gastritis and stomach cancer risk. *Jpn J Cancer Res* 1992; 83: 1137-42.
19. Inoue M, Tajima K, Hirose K, et al. Life-style and subsite of gastric cancer-joint effect of smoking and drinking habits. *Int J Cancer* 1994; 56: 494-9.
20. Coggon D, Baker DJ, Cole RB, et al. Stomach cancer and food storage. *JNCI* 1989; 81: 1178-1182.
21. La Vecchia C, Negri E, D'Avanzo B, et al. Electric refrigerator use and gastric cancer risk. *Br J Cancer* 1990; 62: 136-7.
22. Kono S, Hirohata T. Nutrition and stomach cancer. *Cancer Causes Control* 1996; 7: 41-55.
23. Munoz N, Plummer M, Vivas J, et al. A case-control study of gastric cancer in Venezuela. *Int J Cancer* 2001; 93: 417-23.
24. Correa P. Human gastric carcinogenesis: a multistep and multifactorial process. First American Cancer Society Award Lecture on Cancer Epidemiology and Prevention. *Cancer Res* 1992; 52: 6735-40.
25. Fukunaga M, Monden T, Nakanishi H, et al. Immunohistochemical study of p53 in gastric carcinoma. *Am J ClinPathol* 1994; 101: 177-180.
26. Hansson LE, Nyrén O, Bergström R, et al. Diet and risk of gastric cancer. A population-based case-control study in Sweden. *Int J Cancer* 1993; 55: 81-9.
27. Nagao M, Takahashi Y, Yamanaka H, et al. Mutagens in coffee and tea. *Mutat Res* 1979; 68: 101-6.
28. Sugimura T, Sato S. Mutagens-carcinogens in foods. *Cancer Res* 1983; 43: 2415-21.
29. Timson J. Caffeine. *Mutat Res* 1977; 47: 1-52.
30. Jiong-Liang Qiu, Kun Chen, Jian-Ning Zheng, et al. Nutritional factors and gastric cancer in Zhoushan Islands, China PO Box 2345, Beijing 100023. *China World J Gastroenterol* 2005; 11: 4311-6.
31. Palli D, Russo A, Decarli A. Dietary patterns, nutrient intake and gastric cancer in a high-risk area of Italy. *Cancer Causes Control*. 2001; 12: 163-72.