

CONTENTS

İÇİNDEKİLER

Original Research Özgün Araştırma

Supine percutaneous nephrolithotomy in impacted proximal ureteral stones larger than 15 millimeters; Comparison of flexible ureterorenoscopy and retroperitoneal laparoscopic ureterolithotomy	1-8
15 milimetreden büyük impakte proksimal üreter taşlarında supin perkütan nefrolitotomi; Fleksible üreterorenoskopi ve retroperitoneal laparoskopik üreterolitotominin karşılaştırılması	
Taner Kargı, Mithat Ekşi, Ali Ayten, Yunus Çolakoğlu, Serdar Karadağ, İsmail Evren, Ahmet Hacıislamoğlu, Hakan Polat, Feyzi Arda Atar, Alper Bitkin, Selçuk Şahin, Ali İhsan Taşçı	
Comparison of retrograde intrarenal surgery and percutaneous nephrolithotomy results for 20-30 mm kidney stones: A matched-pair analysis	9-15
20-30 mm böbrek taşları için uygulanan retrograd intarenal cerrahi ve perkütan nefrolitotomi sonuçlarının karşılaştırılması: Eşleşmiş çift analizi	
Samet Şenel, Muhammed Emin Polat, Kazım Ceviz, Emre Uzun, Yusuf Kasap, Cüneyt Özden, Antonios Koudonas, Hüseyin Cihan Demirel	
Comparison of preoperative nomograms predicting lymph node invasion in patients underwent radical prostatectomy	16-22
Radikal prostatektomi yapılan hastalarda lenf nodu invazyonunu öngören preoperatif nomogramların karşılaştırılması	
Osman Can, Cemal Topal, Eyyüp Danış, Muammer Bozkurt, Emin Taha Keskin, Lutfi Canat, Abdulmuttalip Şimşek	
The Rezum procedure in benign prostate hyperplasia: Initial experience at a single center in Turkey	23-29
Benign prostat büyümelerinde Rezum prosedürü: Türkiye'den tek merkezli ilk deneyimlerimiz	
Mert Kılıç, Mevlana Derya Balbay	
The effect of intravesical stent length and Propiverine on ureteral stent related symptoms - Prospective controlled trial	30-37
Üreteral stent ilişkili semptomlara intravezikal stent uzunluğunun ve Propiverin'in etkisi-Prospektif kontrollü çalışma	
Osman Can, Mustafa Erkoç, Eyyüp Danış, Muammer Bozkurt, Alper Ötüncemur, Halil Lütfi Canat	