Holmium lazer ile üreterosel içi taşa yaklaşım: Olgu sunumu

Management of stone in ureterocele with holmium laser: A case report

Mustafa Karalar¹, İbrahim Keleş¹, Ahmed Ömer Halat¹, Haşmet Sarıcı¹

¹ Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Afyonkarahisar

Geliş tarihi (Submitted): 21.10.2014
Kabul tarihi (Accepted): 23.03.2015

Yazışma / Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karalar
Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Üroloji AD Afyonkarahisar
Tel: 0505 296 96 40
E-mail: drkaralar@yahoo.com

Özet

Üreterosel, intravezikal submukozal segmentteki malformasyonun sonucu olarak distal üreterde gelişen kistik dilatasyondur. Üreteral atoni, dar üreter orifisi ve idrar göllenmesi nedeniyle bu olgularda taş oluşumu izlenebilir. Hastaların üçte biri üreteroselle ilişkili taş hastalığı ile başvururlar. Endoskopik girişimler üreterosel için ilk basamak yaklaşımdır. Bizde bu olguda komplike üreteroseli olan 24 yaşındaki kadın hastaya holmium lazer ile yaklaşımımızı literatür eşliğinde sunmayı planladık.

Anahtar Kelimeler: Holmium lazer, Taş, Üreterosel

Abstract

Ureterocele is a cystic dilatation of distal part of the ureter as a result of the intravesical submucosal malformation. Ureteral atony, stenotic ureteral orifice and stagnation of urine in ureterocele precipitate stone formation. A third of all patients present with associated stone disease. Endoscopy has been suggested as first-line management of ureterocele. In this case report, we aimed to present the management of a 24-year-old patient with complicated ureterocele using holmium laser.

Key Words: Holmium laser, Stone, Ureterocele

Giriş

Üreterosel, intravezikal submukozal segmentteki malformasyonun sonucu olarak distal üreterde gelişen kistik dilatasyondur (1). Çocuklarda görülme sıklığı 1/500 iken, erişkinde bu oran 1/4000'dir. Olguların %80'inde komplet üreter duplikasyonunda üst polü drene eden üreterde bu patoloji mevcuttur (1). Kadınlarda 4-7 kat daha sıklıkla izlenir (2). Üreteral atoni, dar üreter orifisi ve idrar göllenmesi nedeniyle bu olgularda taş oluşumu izlenebilir. Hastaların üçte birinde taş mevcuttur (3). Üreteroselli hastalar genellikle flank ağrı, dizüri, pollaküri, urgency ve yüksek ateş şikayetleri ile hekime başvururlar. Radyolojik inceleme için yapılan intravenöz pyelografide (IVP)

izlenen distal üreterdeki kobra başı görüntüsü tipiktir (4). Endoskopik girişimler üreterosel için ilk basamak yaklaşımdır. Yapılan çalışmalarda endoskopik girişimlerin ikincil cerrahiye olan ihtiyacı azalttığı gösterilmiştir (5). Taşlı üreterosellere yaklaşım ise taş yüküne bağlı olarak soğuk bıçak veya elektrokoter ile endoskopik insizyon ve taş çıkarılması, holmium lazer litotripsi veya üreterolitotomi gibi cerrahın tecrübelerine yönelik tercih ettiği operasyonları içerir (1). Literatürde taşlı komplike üreterosellere yaklaşım konusunda az sayıda yayın bulunmaktadır (1,3,4). Biz de bu olguda komplike üreteroselle holmium lazer ile yaklaşımımızı literatür eşliğinde sunmayı planladık.

Resim 1: MR incelemede distal üreterde dilatasyon ve içerisinde taş

Resim 2: Kontrastsız BT incelemede üreteresel içi taş

Olgu

İnferilitite nedeniyle kadın hastaları ve doğum polikliniğinde takip edilen 24 yaşındaki bayan hastanın yapılan magnetik rezonans incelemesinde insidental olarak distal üreterde kistik genişleme (Resim 1) ve içerisinde üreter taşı ile uyumlu görüntü tespit edilmiştir. Bu bulguyla polikliniğimize yönlendirilen hastanın zaman zaman künt sol yan ağrısı, pollaküri, urgency ve dizüri gibi idrar şikayetlerinin olduğu öğrenildi. Hemogram ve rutin biyokimyasal kan değerleri doğal olan hastanın idrar tahlilinde mikroskopik hematüri mevcuttu. Kontrastsız bilgisayarlı tomografide sol distal üreterde kistik dilatasyon

ve içerisinde 7 mm taş izlendi (Resim 2). Takiben yapılan IVP görüntülemesinde sol böbrek minör kalikslerde hafif küntleşme tespit edilmiş olup, major kaliksler, renal pelvis ve proximal 2/3 üreter doğal izlendi. Sol üreterin 1/3 distal kesiminde yaklaşık 3 cm'e ulaşan fusiform dilatasyon izlenmiş olup, DÜSG'de izlenen 7mm'lik radyoopasitenin bu fokal genişleme ile aynı lokalizasyonda olduğu görüldü (Resim 3). Akabinde hastanın yapılan MAG-3 sintigrafisinde obstrüktif staza ait bulgular izlenmiş olup, renal kortikal hasar saptanmadı.

Mevcut bulgular eşliğinde yapılan sistoskopiye sol üreteral orifis dar olarak izlendi. Sol üretere kılavuz tel gönderilmesini takiben orifis her iki lateral kenardan Holmium lazerle insize edilerek genişletildi. Ardından üreterorenoskop ile sol üretere girildi, üreteresel içerisinde görülen 7 mm'lik taşa lazer kullanılarak litotripsi uygulandı. DJS yerleştirilerek işleme son verildi. Postoperatif 1. ayda yapılan kontrollerinde hasta aktif şikayetin olmadığı belirtilmekle birlikte yapılan USG doğal bulundu. DJS'i çekilen hastanın 3. ayda yapılan voiding sistoüretrografisinde reflü izlenmedi.

Tartışma

Üretereselde tipik radyolojik bulgu IVP'de distal üreterde izlenen kobra başı görüntüsüdür (4). Tanı ve tedavi için bu bulgu yeterli olsa da biz vakamızda üreteresel içindeki taşı doğrulamak için kontrastsız BT ve olası obstruksiyonu ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek adına sintigrafi ile bulgularımızı korele ettik.

Üretereselin endoskopik tedavisinde, orifisin soğuk bıçak insizyonu, elektrokoter ile üreteresel tavanının kesilmesi veya lazer insizyonu seçenekleri mevcuttur (3). Üreteresel orifisi çok büyük olmayan bir insizyonla kesilmesidir. Büyük boyutlu kesiler, postoepratif geç dönemde vezikoüreteral reflüye yol açabilmektedir. Holmium lazer bu amaçla kullanılabilecek güvenli ve etkin bir yöntemdir (6). Literatürde üreteral orifise yapılacak bu insizyonun reflüyü minimize etmek için gülün ağız şeklinde olması önerilmektedir (7,8). Bizde vakamızda üretere kılavuz tel gönderilmesini takiben her iki lateral kenardan holmium lazerle insizyon yaptık. Bu işlem esnasında gönderilmiş olan kılavuz telin askı etkisi, yapılacak olan lateral insizyonları oldukça kolaylaştırmaktadır.

Üreteresel taşında en sık olarak uygulanan tedavi yöntemi ise taşın mesaneye düşürülerek litotriptör yar-

Resim 3: Üreterosel ve taşın IVP görüntülemesi

dımıyla ya da bütün olarak dışarı alınması ile gerçekleştirilmektedir (9). Küçük boyutlu taşlarda olgumuzdaki gibi mesaneye düşürülmeden lazer litotripsi ile güvenle tedavi edilebilmektedir. Üreterosele ve varsa üreterosel içi taş minimal morbidite ile kolay uygulanabilir bir teknik olan holmium lazerle endoskopik girişim hastaya yaklaşımda ilk seçilecek tedavi alternatiflerindendir.

Kaynaklar

1. Shah HN, Sodha H, Khandkar AA, Kharodawala S, Hegde SS, Bansal M. Endoscopic management of adult orthotopic ureterocele and associated calculi with holmium laser: Experience with 16 patients over 4 years and review of the literature. *J Endourol* 2008; 22: 489-96.
2. Gücük A, Öztürk U, Tuygun C, Nalbant İ, İmamoğlu A. Duplike sistemde dev üreterosel ve aynı üretere reflü: olgu sunumu. *Abant Medical Journal* 2012; 1: 28-29.
3. Söylemez H, Altınoluk B, Uğraş MY. Dev üreterosel taşının holmium lazer litotripsi ile tedavisi. *Dicle Tıp Derg* 2009; 36: 209-12.
4. Seibold J, Alloussi SH, Schilling D, ve ark. Minimally-invasive treatment of complicated ureteroceles in adults avoiding vesico-ureteric reflux. *Central European Journal of Urology* 2010; 63: 74-76.
5. Jankowski JT, Palmer JS. Holmium: yttrium-aluminum-garnet laser puncture of ureteroceles in neonatal period. *Urology* 2006; 68: 179-81.
6. Pagano MJ, Batavia JP, Casale P. Laser Ablation in the management of obstructive uropathy in neonates. *J Endourol* 2014. DOI: 10.1089/end.2014.0260 Epub ahead of print.
7. Jones JS. A case study: Holmium laser for management of ureterocele calculi. *Laser Surg Med* 2002; 31:297-98.
8. Hoşcan MB, Ekinci M, Tunçkiran A, Menekşe M. Üriner Taş İçeren Tıkayıcı Olmayan Üreteroselin Alışılmadık Şekilde Ortaya Çıkışı. *J Clin Anal Med* 2010;1.1:57-59.
9. Shamsa A, Asadpour AA, Abolbashari M, Hariri MK. Bilateral simple orthotopic ureteroceles with bilateral Stones in an adult. *Urol J* 2010; 7:209-11.