

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon yanıtı sonrasında erken dönem geri dönüşümlü respiratuvar asidoz gelişen hastaların analizi

Analysis of patients with reversible respiratory acidosis after noninvasive mechanical ventilation response in acute hypercapnic respiratory failure

İ Hüseyin Arpağ¹, İ Zühal Karakurt², İ Tülin Kuyucu², İ Abdullah Kansu³, İ Nurhan Atilla⁴

¹Özel Batman Medical Park Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Batman, Türkiye

²İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul, Türkiye

³Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

⁴Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Cite this article as/Bu makaleye atıf için: Arpağ H, Karakurt Z, Kuyucu T, Kansu A, Atilla N. Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon yanıtı sonrasında erken dönem geri dönüşümlü respiratuvar asidoz gelişen hastaların analizi. J Med Palliat Care 2020; 1(4): 103-108.

ÖZ

Amaç: Bu çalışmada akut hiperkapnik solunum yetmezliği (AHSY) tanısı ile yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) uygulamasına ilk saatlerde iyi yanıt alınan, ancak nazal oksijene geçildikten kısa süre sonra tekrar ciddi solunumsal asidoz gelişen hastaların analizini yapmayı planladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2009-Nisan 2010 tarihleri arasında, AHSY (pH<7,35 ve PaCO₂>45 mmHg) nedeniyle YBÜ'de takip edilen ve uygulanan ilk 1-4 saatlik NIMV tedavisine yanıt veren 139 hastanın verisi retrospektif olarak incelendi. Hastalar, NIMV tedavisi sonlandırıldıktan sonraki takiplerinde rebound hiperkapni gelişen (grup 1) ve gelişmeyen (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, AHSY nedenleri, NIMV uygulama süreleri, arteriyel kan gazı (AKG) değerleri, APACHE-II ve SOFA skorları, hastanede yatış süresi (gün), invaziv mekanik ventilatör (İMV) ihtiyacı ve yaşam durumları kaydedildi. Grupların özelliklerini karşılaştırmada numerik veriler için nonparametrik Mann-Withney-U testi ve kategorik veriler için Ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya 139 hasta dâhil edildi. Grupların demografik özellikleri ve NIMV süreleri, YBÜ ve hastane kalış süreleri arasında fark bulunmadı. Grup 1'de toraks deformitesi-kas hastalıkları (grup 1'de %8,6; grup 2'de %1,2) ve obezite hipoventilasyon sendromu (OHS) (grup 1'de %17,2; grup 2'de %9,9) daha fazla iken; grup 2'de parankimal akciğer hastalıkları fazla (grup 1'de %6,9; grup 2'de %18,5) idi. Her iki grup için evde oksijen ve NIMV cihazı kullanıyor olma durumları benzerdi. Grupların pH ve PaCO₂ değerleri YBÜ'ye kabul esnasında benzerken, ilk kontrolde grup 1'de grup 2'ye göre belirgin düzelme varken (sırasıyla p<0,005 ve p<0,039) nazal oksijene geçilmesiyle grup 1'de belirgin kötüleşme görüldü (sırasıyla p<0,0001 ve p<0,0001); ancak YBÜ çıkış AKG değerleri iki grup arasında benzerdi. Her iki grubun YBÜ kalış günleri grup 1'de 8 (5-12) gün; grup 2'de 6 (4-10) gün olarak benzer bulundu. Grup 1 ve 2'de YBÜ'de İMV'ye geçiş (sırasıyla %10,3; %7,4, p>0,53) ve mortalite oranları (sırasıyla %6,9; %9,9, p>0,38) benzer saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda toraks deformitesi-kas hastalıkları ve OHS'nin eşlik ettiği AHSY olan hastalarda NIMV uygulanmasına hızlı klinik yanıt alındığını ancak nazal oksijene geçildikten kısa süre sonra AKG değerlerinin kötüleştiğini saptadık. Bu hasta grubunda NIMV uygulaması sonrası hızlı düzelme yanıtı olmalıdır. Özellikle acil servisten yatışı planlanan bu hastalar nazal oksijen tedavisine geçiş bile mutlaka monitörize edilerek yakın takibe alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Noninvaziv mekanik ventilasyon, respiratuvar asidoz, hiperkapni, yoğun bakım

ABSTRACT

Aim: In this study, we aimed to analyze patients with a diagnosis of acute hypercapnic respiratory failure (AHRF) who responded to noninvasive mechanical ventilation (NIMV) in the intensive care unit (ICU) in the first hours but developed severe respiratory acidosis again soon after switching to nasal oxygen.

Material and Method: Between January 2009 and April 2010, data of 139 patients who were followed up in the ICU due to AHRF (pH <7.35 and PaCO₂ > 45 mmHg) and responded NIMV treatment in the first 1-4 hours, were analyzed retrospectively. Patients were divided into two groups as those with rebound hypercapnia (group 1) and those without rebound hypercapnia (group 2) in their follow-up after the termination of NIMV treatment. Demographic characteristics of the patients, causes of AHRF, duration of NIMV administration, arterial blood gas (ABG) values, APACHE II and SOFA scores, duration of hospitalization (days), need for invasive mechanical ventilation (IMV) and life situations were recorded. Nonparametric Mann-Withney-U test was used for numerical data and Chi-square test for categorical data was used to compare the properties of the groups.

Results: 139 patients were included in the study. There was no difference between the demographic characteristics of the groups and the duration of NIMV use, and the length of stay in the ICU and hospital. Thoracic deformity-muscular diseases (8.6% in group 1, 1.2% in group 2), and obesity hypoventilation syndrome (OHS) (17.2% in group 1, 9.9% in group 2) were more in group 1, parenchymal lung diseases was higher in group 2 (6.9% in group 1, 18.5% in group 2). The situation of using oxygen and NIMV devices at home was similar for both groups. While the pH and PaCO₂ values of the groups were similar during ICU admission, there was a significant improvement in group 1 compared to group 2 at the first control (p<0.005, p<0.039 respectively), while a significant deterioration was observed in group 1 after switching to nasal oxygen (p<0.0001, p<0.0001 respectively). However, ABG values at ICU discharge were similar between the two groups. ICU stay days of both groups were found to be similar as 8 (5-12) days in group 1 and 6 (4-10) days in group 2. Necessity of IMV (10.3%; 7.4%, p>0.53 respectively) and mortality rates (6.9%; 9.9% p>0.38 respectively) in group 1 and 2 were found similar.

Conclusion: In our study, we determined that patients with AHRF accompanied by thoracic deformity-muscle diseases and OHS had a rapid clinical response to NIMV administration, but ABG values rapidly deteriorated after switching to nasal oxygen. In this patient group, rapid improvement after NIMV application should not be misleading. Especially, patients who are planned to be hospitalized from the emergency department should be monitored and followed closely after switching to nasal oxygen therapy.

Keywords: Respiratory acidosis, noninvasive mechanical ventilation, hypercapnia, intensive care

Corresponding Author / Sorumlu Yazar: Hüseyin Arpağ, Özel Batman Medical Park Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Batman, Türkiye

E-mail / E-posta: drarpag@hotmail.com

Received / Geliş: 20.10.2020 **Accepted / Kabul:** 14.12.2020



GİRİŞ

Solunum yetmezliği (SY) tedavisinde uygun endikasyonda noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) uygulanması 2006 yılında %16 civarında iken; günümüzde yaklaşık %42 civarındadır (1-4). NIMV başarı belirteçleri dikkate alındığında, NIMV uygulama endikasyonları her geçen gün genişlemektedir (1,4). Hiperkapni tedavisinde başarılı bir yöntem olan NIMV'in, İMV ihtiyacını azalttığı, yoğun bakım yatış süresini kısalttığı ve mortaliteyi azalttığı bildirilmektedir (3,5,6). NIMV yanıtı ilk 1-4 saat içinde hastanın kliniği ile birlikte arter kan gazı (AKG)'na bakılarak kontrol edilir (7,8-10). NIMV başarı belirteçleri varlığında ve klinik duruma göre hastanın bundan sonraki takibinin nerede yapılacağına karar verilir. Yapılan çalışmalarda dakikalar ile bir saat içinde ortaya çıkan başarısızlıklar hızlı başarısızlık, 1-48 saat içerisinde ortaya çıkan başarısızlıklar erken başarısızlık, 48 saatten sonra ortaya çıkan başarısızlıklar ise geç başarısızlık olarak tanımlanmıştır (11,12). NIMV başarısının en önemli göstergeleri solunum sayısı ve PaCO₂ değerinde düşme, pH ve oksijenasyonda düzelmedir (13). NIMV günümüzde yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve ara YBÜ dışında, acil servislerde ve kliniklerde de başarı ile uygulanmaktadır. Ancak AKG'de pH<7,25, PaCO₂>90mmHg olan ve ileri monitörizasyon gereken hastaların yüksek entübasyon riski nedeni ile YBÜ'de izlenmesi önerilir (9,10). NIMV başarı ve başarısızlığı ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcut olup bu çalışmalarda NIMV endikasyonları, komplikasyonları, başarı ve başarısızlığını etkileyen faktörler incelenmiştir (12). Alta yatan nedene göre değişmekle beraber NIMV başarısızlığı %5-60 olarak bildirilmiştir (12,14,15). Merkezimiz YBÜ'de akut hiperkapnik solunum yetmezliği (AHSY) nedeniyle uygulanan NIMV tedavisine erken dönem iyi yanıt alınan, ancak nazal oksijene geçildikten kısa süre sonra karbondioksit değerlerinde yükselme gelişen hastaların demografik özelliklerini belirlemek ve NIMV yanıtındaki geçiciliği öngörmek amacıyla bu çalışmayı planladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmamız retrospektif gözleme dayalı kohort çalışma olarak planlanmıştır.

Etik Durum

Çalışmamız Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (2011/2). Çalışmamızda güncel Helsinki Bildirgesi'ne bağlı kalmıştır.

Dahil Edilme Kriterleri

Ocak 2009-Nisan 2010 tarihleri arasında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBÜ'ye interne edilen, NIMV endikasyonu olan, klinik ve AKG bulguları AHSY ile uyumlu olup ilk 24 saat NIMV uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi.

Dahil Edilmeme Kriterleri

Terminal dönem hastalıkları (akciğer kanseri, klinik radyolojik harap olmuş akciğer hastalıkları, interstisyel fibrozis olan hastalar, ilk AKG'de yanıt olmayıp entübe edilen hastalar, AKG'de PaCO₂<45 ve metabolik asidozu olan hastalar çalışmaya alınmadı.

NIMV Başarı Kriterleri

Arter kan gazında PaCO₂'de azalma, PaO₂/FiO₂'de düzelme gözlenmesi, arteriyel kan gazından bağımsız olarak ise solunum sayısının azalması, oksijen ihtiyacının azalması (9,10).

NIMV Başarısızlık Kriterleri

NIMV uyumsuzluk, bilinç durumunun düzelmemesi (Glaskow Koma Skalasının<11 olması), entübasyon endikasyonu olan klinik tablonun gelişmesi (kardiak arrest, AKG'de ciddi respiratuvar asidoz pH<7,10, ağız dolusu kusma ve mide bulantısı, aşırı sekresyon nedeni ile NIMV'nin etkili olmadığı hastalar, NIMV'ye 20 saattten fazla ihtiyaç duyan ileri solunum yetmezliği hastaları (7-10).

Arter Kan Gazı

Arter kan gazı analizi, 45 derece yarı oturur pozisyonda, sterilize ve en az 0,1 ml heparin ile yıkanmış olan enjektör ile Allen testi sonrasında radial arter ponksiyonuyla alınan kandan çalışıldı. AKG ölçümü için hastanemiz YBÜ'de Bayer Rapidlab 348 marka AKG ölçüm cihazı kullanıldı. Veri çıktısı olarak PaO₂, PaCO₂, pH, HCO₃, baz fazlalığı ve oksijen saturasyon yüzdesi (%SaO₂) parametreleri kullanıldı.

Hasta Kayıtları

Hastaların demografik özellikleri, evde uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) ve NIMV kullanım durumları, SY'nin alta yatan nedenleri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), obezite hipoventilasyon sendromu (OHS), kas ve toraks deformite hastalıkları, hastane kökenli enfeksiyon, YBÜ öncesi lokasyonları (acil, servis, dış YBÜ), YBÜ'ye girişte ciddiyet skorları (APACHE II, SOFA skoru), NIMV'in uygulama süreleri (ilk gün, son gün ve toplam gün) ile YBÜ'de ve hastanede kalış süreleri kaydedildi.

Laboratuvar Kayıtları

Hastaların YBÜ'de ilk gün hemogram, biyokimya değerleri ve C-reaktif protein (CRP) değerleri kayıt edildi. Her gün hemogram ve elektrolit kontrolü, 3 gün ara ile CRP biyokimya değerleri kontrol edildi. Giriş AKG değerleri kayıt edildi.

Hastaların Gruplandırılması

NIMV'de karbondioksit yanıtına göre nazal oksijene geçildikten sonra PaCO₂'de 8 mmHg artış olanlar grup 1 (değişken PaCO₂), olmayanlar grup 2 (stabil azalan PaCO₂) olarak sınıflandırıldı.

BULGULAR

Çalışma döneminde NIMV endikasyonu olup ilk AKG kontrolünde entübe edilmeyen 204 hastanın AKG da $pH \leq 7,34$ ve $PaCO_2 > 45$ mmHg olan 139'u çalışmaya dahil edildi.

Hastaların demografik özellikleri, YBÜ'ye girişte ciddiyet skorları, NIMV'nin uygulama süreleri (ilk gün, son gün ve toplam gün) ile YBÜ'de ve hastanede kalış süreleri **Tablo 1**'de özetlendi. Mekanik ventilasyondan ayırma (weaning) denemelerinde spontan solunumda $PaCO_2$ 'de 8 mmHg artış başarısızlık kriteri olarak kabul edilir. Çalışmamızda nazal oksijende AKG'de $PaCO_2$ yanıtları değerlendirildi. Hastaların 81'inde nazal oksijende karbondioksit değerlerindeki artış < 8 mmHg altında iken (grup 2) 58 hastada (grup 1) $PaCO_2$ değerinde 8 mmHg ve üzeri artış gözlemlendi. Toraks deformitesi-kas hastalıkları olanların %83,3'ünde NIMV uygulamasına iyi yanıt alınmasına karşın, nazal oksijen tedavisine geçildikten kısa süre sonra $PaCO_2$ değerlerinde hızla yükselme gösterdikleri saptandı. Bununla birlikte parankimal hastalığı olanların %78,9'unda nazal oksijen ile karbondioksit değerlerinde yükselme gözlemlenmedi. Nazal oksijen ile KOAH hastalarının %40,6'sında $PaCO_2$ artarken, OHS hastalarının %55,6'sında nazal oksijen ile $PaCO_2$ 'de artış oldu ($p < 0,028$) (**Şekil 1**). Grup 1 ve 2'nin evde USOT ve NIMV kullanım oranları benzerdi (**Şekil 2**). Her iki grup, demografik özellikleri ile YBÜ giriş ciddiyet skorları karşılaştırıldığında benzer oldukları görüldü (**Tablo 2**). İlk alınan AKG değerleri grup 1 ve grup 2'de benzerdi. NIMV başladıktan sonra alınan kontrol AKG'de ise grup 1'de pH değeri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek (grup 1'de ortalama pH 7,36 buna karşın grup 2'de pH 7,32, $p < 0,005$) ve $PaCO_2$ anlamlı derecede düşük olarak bulundu (grup 1'de ortalama $PaCO_2$ 63,3 mmHg iken grup 2 de $PaCO_2$ 71,8 mmHg, $p < 0,039$). NIMV uygulanmasını takiben hızlı düzelen olguların %41,7'sinin nazal oksijene geçildikten kısa süre sonra tekrar solunumsal asidoza girdikleri gözlemlendi. NIMV sonrası nazal oksijende takip edilen hastaların AKG'de pH grup 1'de ortalama değeri 7,30'a gerilerken grup 2'de pH 7,35'e yükseldi ($p < 0,000$), $PaCO_2$ grup 1'de 77,6 mmHg'ya

yükselirken grup 2'de $PaCO_2$ 66,7 mmHg'ya geriledi ($p < 0,000$). Her iki grubun YBÜ'den çıkış AKG değerleri benzerdi. Grupların nazal oksijen ve NIMV'deki $PaCO_2$ değerlerinde değişkenlik görülmesine rağmen, çıkış AKG değerleri farklılık göstermiyordu (**Tablo 2**).

Tablo 2. Demografik özellikler, gruplar ve ciddiyet skorları


	Grup 1	Grup 2	p
Yaş (yıl)	59 ± 71	60 ± 76	0,09
VKI	26 (23-30)	25 (21-30)	0,48
YBÜ'ye giriş APACHE II skoru	18 (14-21)	19 (17-22)	0,11
YBÜ'ye giriş SOFA skoru	3 (2-4)	3 (3-4)	0,94
YBÜ'ye giriş kreatinin (mg/dl)	1,07 (0,79-1,39)	1,05 (0,88-1,34)	0,81
YBÜ'ye giriş CRP (mg/dl)	20 (10-50)	27 (9-71)	0,41
YBÜ'ye giriş pH	7,27 (7,24-7,30)	7,28 (7,22-7,31)	0,78
YBÜ'ye giriş $PaCO_2$ mmHg	80,0 (73,0-94,0)	80,0 (70,5-90,0)	0,34
YBÜ'ye giriş HCO_3 mmol	34,4 (30,7-39,0)	33,0 (28,0-39,9)	0,35
YBÜ'ye giriş PaO_2/FiO_2	186 (128-236)	188 (121-252)	0,91
Kontrol pH	7,36 (7,30-7,40)	7,32 (7,27-7,36)	0,005
Kontrol $PaCO_2$ mmHg	63,3 (56,3-73,0)	71,8 (61,0-82,0)	0,039
Kontrol HCO_3	34,7 (31,0-39,8)	35,9 (30,0-39,2)	0,90
Kontrol PaO_2/FiO_2	223 (160-265)	200 (142-250)	0,12
Nazal O ₂ ile pH	7,30 (7,27-7,34)	7,35 (7,31-7,41)	0,000
Nazal O ₂ ile $PaCO_2$ mmHg	77,6 (66,8-90,0)	66,7 (53,5-74,3)	0,000
Nazal O ₂ ile HCO_3	35,7 (33,6-39,6)	34,5 (29,7-39,3)	0,09
Nazal O ₂ ile PaO_2/FiO_2	204 (143-311)	195 (138-268)	0,39
YBÜ'den çıkış pH	7,41 (7,38-7,45)	7,41 (7,37-7,46)	0,96
YBÜ'den çıkış $PaCO_2$ mmHg	56,1 (48,0-61,0)	55,0 (48,0-60,8)	0,82
YBÜ'den çıkış HCO_3	34,1 (32,0-37,7)	34,8 (30,3-37,5)	0,70
YBÜ'den çıkış PaO_2/FiO_2	204 (167-266)	228 (180-303)	0,13

VKI: Vücut kitle indeksi; YBÜ: Yoğun bakım ünitesi; CRP: C reaktif protein

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri, YBÜ'ye girişte ciddiyet skorları, NIMV'nin uygulama süreleri ile YBÜ'de ve hastanede kalış süreleri


Değerler	Ortanca
Yaş	(60±74)
Cinsiyet, Kadın/Erkek	43/96
Beden kitle indeksi	25 (21-30)
YBÜ'ye giriş APACHE II skoru	18 (15-22)
YBÜ'ye giriş SOFA skoru	3 (3-4)
YBÜ'ye giriş serum kreatinin (mg/dl)	1,06 (0,88-1,34)
YBÜ'ye giriş CRP mg/dl	25 (9-61)
NIMV süre ilk gün (saat)	12 (9-15)
NIMV süre son gün (saat)	8 (5-12)
NIMV süre toplam (gün)	6 (4-11)
YBÜ'de kalış süre (gün)	6 (4-11)
Hastanede kalış süre (gün)	12 (8-17)

YBÜ: Yoğun bakım ünitesi; NIMV: Noninvaziv mekanik ventilasyon; CRP: C-reaktif protein



Şekil 1. Grup 1 ve 2'nin nazal oksijen ve NIMV'de $PaCO_2$ değişkenliği

NIMV: Noninvaziv mekanik ventilasyon



Şekil 2. Grupların YBÜ'ye kabulünde USOT ve evde NIMV kullanma oranları


USOT: Uzun süreli oksijen tedavisi; NIMV: Noninvaziv mekanik ventilasyon

Grupların NIMV uygulama basınçları ve süreleri ile YBÜ ve hastane kalış günleri karşılaştırıldığında benzer bulundu (Tablo 3). Grup 1 hastalarında YBÜ'de ortalama kalma süresi 8 gün olmasına karşın grup 2'de 6 gündü, ancak aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (Tablo 3). NIMV başarısızlığı nedeni ile IMV uygulanması ve mortalite açısından gruplar arası istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (Şekil 3).

Tablo 3. NIMV uygulama basınçları, süreleri, YBÜ ve hastanede kalış günleri

	Grup 1	Grup 2	p
IPAP	24 (20-26)	23 (20-25)	0,57
EPAP	5 (5-6)	5 (5-6)	0,16
NIMV ilk gün saat	12(9-15)	12 (9-16)	0,82
NIMV toplam gün	8 (4-11)	6(3-10)	0,27
YBÜ kalış gün	8 (5-12)	6 (4-10)	0,12
Hastane kalış gün	12 (8-18)	12 (7-17)	0,34

IPAP: İnspiratuvar pozitif hava yolu basıncı; EPAP: Ekspiratuvar pozitif hava yolu basıncı; YBÜ: Yoğun bakım ünitesi; NIMV: Noninvaziv mekanik ventilasyon



Şekil 3. Grup 1 ve 2'nin IMV ve mortalite oranları

IMV: İnvaziv mekanik ventilasyon

TARTIŞMA

Bu çalışmada, kas hastalığı ve toraks deformitesi olan hastaların %83,3'ünde NIMV uygulamasına iyi yanıt alınmasını takiben nazal oksijen tedavisine geçildikten sonra erken dönemde PaCO₂ değerlerinde hızlı gelişen yükselme saptandı. Bu oran OHS hastalarında %55,6 iken; parankimal hastalığı olanlarda %21,1'idi.

Akut solunum yetmezliğinde NIMV kullanımı uygulama yeri önceleri ileri monitörizasyon yöntemleri gerektirdiğinden önceleri yoğun bakım ünitelerinde uygulanması önerilmekteyken, dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarda NIMV konusunda deneyimli ekip varlığında yoğun bakım ünitesi dışında da uygulanabileceği gösterilmiştir (6,16). NIMV uygulaması, deneyimli bir ekip ile her mekânda yapılabileceği gibi kısa ve uzun dönem NIMV başarısını öngörmek acil servisteki hastanın sonraki aşamada nerede takip edileceğine karar verme açısından önemlidir (17,18). Plant K ve arkadaşları 13 merkezli yaptıkları çalışmada; göğüs hastalıkları servislerinde NIMV uyguladıkları KOAH hastalarında, geçmişteki KOAH hastalarına göre, mortalitenin %20'den %10'a ve tedavi başarısızlığının (entübasyon ihtiyacı) %27'den %15'e gerilediğini bildirmiştir (19). Aynı çalışmanın alt grup analizinde pH<7,30 olan hastalarda serviste NIMV başarısızlığının daha yüksek olduğu gösterilmiştir (20). Respiratuvar asidozu olan hastalara acil serviste medikal bronkodilatör tedavi ile birlikte NIMV uygulanarak kısa sürede AKG'de düzleme (PaCO₂ de düşme ve pH değerinde yükselme) sağlanmaktadır. Acil servise başvuran hiperkapnik solunum yetmezliğine bağlı respiratuvar asidozu olan hastalarda endikasyon dahilinde NIMV'nin erken kullanımının hastanede kalış süresini kısaltıp komplikasyonları azalttığı, pH ve PaCO₂'yi düzelttiği çalışmalarda gösterilmiştir (21-23). Yapılan çalışmalarda AHSY'de pH<7,30 ise, servis yerine YBÜ takibi önerilmekle birlikte deneyimli ekibi olan merkezlerin servislerinde de NIMV uygulayabilecekleri uzman görüşü olarak bildirilmektedir (24). Ancak hızlı değişen PaCO₂ değeri nedeni ile NIMV ile elde edilen iyi bir pH değeri hasta takip yerinin seçiminde çalışma sonuçlarımıza göre yeterli değildir. Çalışmamızda hızla düzelen olguların %41,7'sinin nazal oksijene geçildikten kısa süre sonra tekrar solunumsal asidoza girdikleri gözlemlendi. Bu hastaların yakından izlenmesi gerekliliği nedeni ile YBÜ'de takip edilmeleri gerektiği kanaatindeyiz. Asidoz durumu, hiperkapninin akut veya kronik olmasına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hiperkapnik solunum yetmezliği olan KOAH hastalarında yapılan bir çalışmada ortalama pH 7,18 olan 64 KOAH hastasının 24'ü başarısız olup entübe edilmiş ancak geciktirilmiş entübasyon ve uzun asidoz maruziyeti nedeniyle hastalarda olumsuz bir durum bildirilmemiştir (24). Hiperkapnik solunum yetmezliği olan KOAH hastalarını kapsayan başka bir

çalışmada; pH 7,25 altındakilerle pH 7,25 üzerindeki hastalar karşılaştırıldığında, NIMV uygulamasındaki başarı oranının benzer olduğu gösterilmiştir (25). Hiperkapnik solunum yetmezliğinde hiperkapniye bağlı gelişen şuur bulanıklığının NIMV uygulanması için bir kontrendikasyon olmadığı bilinmektedir (1,26). Çalışmamızda hastalarda görülen şuur bulanıklığı hızlı değişen AKG değerleri ile paralel olup, hiperkapnide derinleşme olduğunda ciddi uykuya meyil hali gözlemlendi.

APACHE II, hastalık şiddeti göstergesi olarak kullanılan skorlama yöntemlerinden biri olup, yapılan çalışmalarda APACHE II değerinin yüksek olması NIMV başarısızlığı ile ilişkili bulunmuştur (12,15,27,28). Confalonieri ve ark. (28) çok merkezli, 1033 KOAH atağı olgusunu içeren çalışmalarında APACHE II skorunun 29'dan fazla olmasının NIMV başarısızlığını ön görmede önemli bir belirteç olduğu tespit etmişlerdir. Merkezimizde hastalık ağırlık göstergesi olarak APACHE II skoru kullanılmakta olup, gruplar arasında APACHE II skorları arasında anlamlı fark bulunmadı. Çalışmamızda NIMV uygulanması sonrası PaCO₂ yanıtlarındaki değişkenliklerinin nedenleri araştırıldığında, YBÜ'ye girişteki demografik özellikleri ve AKG değerleri arasında bir fark bulunmadı. Ancak PaCO₂ değişkenliği gösteren grupta, kronik hipoventilasyona neden olan (göğüs duvarı deformitesi ile OHS) hastalıklar fazlaydı. Kronik fiziksel patolojilerde (göğüs duvarı hastalıkları ve obezite) AKG değişkenliğinin tahmin edilebilir bir bulgu olduğunu bu çalışmadaki verilere dayanarak düşünmekteyiz. Bu grup hastalarda AKG değerlerinde düzelmenin geri dönüşümlü olduğu dikkate alınarak hastaneye yatmasını gerektirecek solunum yetmezliği tedavisinin YBÜ'de yapılmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanmasının başarı değerlendirilmesinde ilk 1-2 saat önemli olup AKG değerleri bakılmasına yönelik bir grup çalışma bildirilmiş, rehberlere de dayanak olmuştur (9,27,29). Ancak çalışmamızda, NIMV uygulanması yanıtı sonrasında nazal oksijen ile takiplerinde bir grup hastanın başa dönüp tekrar ciddi hiperkapniye ve asidoza girdiğini saptadık.

Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanmasının hastane kalış süresini kısalttığı, İMV ihtiyacını azalttığı, solunum işini azalttığı KOAH ve hiperkapninin eşlik ettiği kardiyojenik ödemli hastalarda bildirilmiştir (30-33). Çalışmada PaCO₂ değeri yavaş ve emin adımlarla azalan grubun YBÜ ve hastane kalış günü yaklaşık diğer gruptan 2 gün kısa olup her ne kadar istatistiksel anlamlı olmasa da maliyeti düşürmektedir. YBÜ kalış günü uzun olduğundan mortalite riski de artmaktadır. Akut solunum yetmezliği nedeniyle NIMV uygulanan obez hastaların AKG değerlerinin normal aralığa dönmesi obez olmayanlara göre daha uzun sürmektedir (34).

Çalışmadaki sınırlayıcı durumlar; geriye dönük gözlemsel araştırma olup veriler dosyalardan kayıt edilmiştir. Gruplarımızın solunum ve sistemik kas fonksiyonlarını değerlendiren ölçüm ve araştırma yapılmamıştır. Hastalarımızın solunum fonksiyon testleri, bronkodilatör yanıtları hakkında veri bulunmadığından değerlendirmeye alınmamıştır.

SONUÇ

Bu çalışmada AHSY gelişmiş toraks deformitesi-kas hastalığı ve OHS hastalarında NIMV'ye iyi yanıt alınmış olmasına rağmen nazal oksijenle takip sırasında erken dönemde yeniden respiratuvar asidoz gelişme sıklığının oldukça yüksek olduğunu gördük. Acil serviste AHSY nedeniyle NIMV uygulanan hastalarda tedaviye erken dönemde iyi cevap alınması bu hastaların YBÜ yerine servise yatış kararının verilmesinde yanıtıcı olabilir. Bu hastaların takip ve tedavisinin nerede yapılacağına nazal oksijen tedavisi sonrası karar verilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

ETİK BEYANLAR

Etik Kurul Onayı: Çalışmamız Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (2011/2).

Aydınlatılmış Onam: Çalışma retrospektif olarak dizayn edildiği için hastalardan aydınlatılmış onam alınmamıştır.

Hakem Değerlendirme Süreci: Harici çift kör hakem değerlendirmesi.

Çıkar Çatışması Durumu: Yazarlar bu çalışmada herhangi bir çıkara dayalı ilişki olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışmada finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Yazar Katkıları: Yazarların tümü; makalenin tasarımına, yürütülmesine, analizine katıldığını ve son sürümünü onayladıklarını beyan etmişlerdir.

KAYNAKLAR

1. Bello G, De Pascale G, Antonelli M. Noninvasive ventilation. Clin Chest Med 2016; 37: 711-21.
2. Schnell D, Timsit JE, Darmon M, et al. Noninvasive mechanical ventilation in acute respiratory failure: trends in use and outcomes. Intensive Care Med 2014; 40: 582-91.
3. Demoule A, Chevret S, Carlucci A, et al. Changing use of noninvasive ventilation in critically ill patients: trends over 15 years in francophone countries. Intensive Care Med 2016; 42: 82-92.
4. Demoule, A, Girou, E, Richard, JC, et al. Increased use of noninvasive ventilation in French intensive care units. Intensive Care Med 2006; 32: 1747.
5. Maheshwari V, Paioli D, Rothaar R, et al. Utilization of noninvasive ventilation in acute care hospitals: a regional survey. Chest 2006; 129: 1226-33.

6. Dikensoy O, İkidağ B, Filiz A, Bayram N. Comparison of non-invasive ventilation and standard medical therapy in acute hypercapnic respiratory failure: A randomised controlled study at a tertiary health centre in SE Turkey. *Int J Clin Pract* 2002; 56: 85-8.
7. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in Acute Respiratory Failure. *Am J Respir Crit Care Med* 2001; 163: 283-91.
8. Diaz GG, Alcaraz AC, Talavera JC, et al. Noninvasive positive-pressure ventilation to treat hypercapnic coma secondary to respiratory failure. *Chest* 2005; 127: 952-60.
9. Evans TW. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: Noninvasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure. organised jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the societe de Reanimation de Langue Francisc, and approved by the ATS Boart of Direction. *Intensive Care Med* 2001; 27: 166-78.
10. Schönhofer B, Kuhlen R, Neumann P, Westhoff M, Berndt C, Sitter H. Clinical practice guideline: non-invasive mechanical ventilation as treatment of acute respiratory failure. *Deutch Arztebl Int* 2008; 105: 424-33.
11. Celikel T, Sungur M, Ceyhan B, Karakurt S. Comparison of noninvasive positive pressure ventilation with standard medical therapy in hypercapnic acute respiratory failure. *Chest* 1998; 114: 1636-42.
12. Ozyilmaz E, Ozsancak Ugurlu A, Nava S. Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. *BMC Pulm Med*. 2014; 14: 19.
13. Garpestad E, Brennan J, Hill NS. Noninvasive ventilation for critical care. *Chest* 2007; 132: 711-20.
14. Nicolini A, Ferrera L, Santo M, Ferrari-Bravo M, Del Forno M, Scifo F. Noninvasive ventilation for hypercapnic exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: factors related to noninvasive ventilation failure. *Pol Arch Med Wewn* 2014; 124: 525-31.
15. Kaya A, Çiledağ A, Çaylı İ, Önen ZP, Şen E, Gülbay B. Associated factors with non-invasive mechanical ventilation failure in acute hypercapnic respiratory failure. *Tuberk Toraks*. 2010; 58: 128-34.
16. Ciledag A, Kaya A, Akdogan BB, et al. Early use of noninvasive mechanical ventilation in patients with acute hypercapnic respiratory failure in a respiratory ward: a prospective study. *Arch Bronconeumol* 2010; 46: 538-42.
17. Vitacca M. Where and how must we perform noninvasive mechanical ventilation? *Monaldi Arch Chest Dis* 1997; 52: 80-2.
18. Elliott MW, Confalonieri M, Nava S. Where to perform noninvasive ventilation? *Eur Respir J* 2002; 19: 1159-66.
19. Plant PK, Owen JL, Elliot MW, et al. Early use of non-invasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease on general respiratory wards: A multicentre randomized controlled trial. *Lancet* 2000; 355: 1931-5.
20. Allison MG, Winters ME. Noninvasive ventilation for the emergency physician. *Emerg Med Clin North Am*. 2016; 34: 51-62.
21. Ram FS, Picot J, Lightowler J, Wedzicha JA. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2004; 3: CD004104.
22. Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019; 4: CD005351.
23. Acartürk Tunçay E, Güngör S, Ocaklı B. Noninvasive mechanical ventilation failure and long-term follow-up results of failure in hypercarbic respiratory failure. *Duzce Medical Journal* 2019; 21: 54-60.
24. Crummy F, Buchan C, Miller B, et al. The use of noninvasive mechanical ventilation in COPD with severe hypercapnic acidosis. *Respiratory Medicine* 2007; 101: 53-61.
25. Bacakoğlu F, Taşbakan MS, Kaçmaz Başoğlu Ö, et al. The factors affecting noninvasive mechanical ventilation failure in COPD exacerbations. *Turk J Med Sci*. 2012; 42: 103-12.
26. Honrubia T, Garcia Lopez FJ, Franco N, et al. Noninvasive vs conventional mechanical ventilation in acute respiratory failure: A multicenter, randomized controlled trial. *Chest* 2005; 128: 3916-24.
27. Confalonieri M, Garuti G, Cattaruzza MS, et al. A chart of failure risk for noninvasive ventilation in patients with COPD exacerbation. *Eur Respir J*. 2005; 25: 348-55.
28. Çiledağ A, Kaya A, Erçen Diken Ö, Önen ZP, Şen E, Demir N. The risk factors for late failure of noninvasive mechanical ventilation in acute hypercapnic respiratory failure. *Tuberk Toraks* 2014; 62: 177-82.
29. Antonelli M, Conti G, Moro ML, et al. Predictors of failure of noninvasive positive pressure ventilation in patients with acute hypoxemic respiratory failure: a multicenter study. *Intensive Care Med* 2001; 27: 1718-28.
30. Liesching T, Kwok H, Hill NS. Acute applications of noninvasive positive pressure ventilation. *Chest* 2003; 124: 699-713.
31. Nava S, Carbone G, DiBattista N, et al. Noninvasive ventilation in cardiogenic pulmonary edema: a multicenter randomized trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2003; 168: 1432-7.
32. Crane SD, Elliott MW, Gilligan P, et al. Randomised controlled comparison of continuous positive airways pressure, bilevel non-invasive ventilation, and standard treatment in emergency department in patients with acute cardiogenic pulmonary oedema. *Emerg Med J* 2004; 21: 155-61.
33. Gray A, Goodacre S, Newby DE, et al. Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema. *N Engl J Med* 2008; 359: 142-51.
34. Güsel G, Aydoğdu M, Gülbaş G, Özkaya S, Taşyürek S, Yıldırım F. The influence of severe obesity on non-invasive ventilation (NIMV) strategies and responses in patients with acute hypercapnic respiratory failure attacks in the ICU. *Minerva Anestesiol* 2011; 77: 17-25.