

ELİT GENÇ BAYAN CİMNASTİKÇİLERİN ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ

K. Özer* L. Tavacioğlu ** S. Pınar***

* Marmara Üniversitesi Bed. Eğt. ve Spor Böl. ** İ.T.Ü. Beden Eğt. ve Spor Bölümü *** Marmara Üniversitesi Bed. Eğt. ve Spor Böl.

ÖZET:

Kasım 1991'de İstanbul'da organize edilen Balkan Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası vesilesi ile 35 genç bayan cimnastikçinin antropometrik ölçümleri yapılmıştır. Cimnastikçilerin verileri referanslar ve daha önce uluslararası yarışmalarda toplanarak yayınlanmış verilerle karşılaştırılmıştır.

ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF YOUNG ELITE

FEMALE GYMNASTS

ABSTRACT

Anthropometric data of young female gymnasts were gathered on the occasion of the Balkan Championship Artistic Gymnastics at Istanbul, Turkey, in November 1991. In total 35 males were investigated, constituting 100 % of the total number of participants. The data of these gymnasts were compared with both reference data and data reported in previous studies on gymnasts competing at international events

GİRİŞ

Bayan sporcuların yapısal ve biyolojik oluşumları açısından toplumun ortalaması referans değerlerinden anlamlı bir farklılık gösterdikleri bilinmektedir. ayrıca değişik spor dalları arasında ve aynı dalda farklı kategoriler arasında bile yapısal farklılıklar vardır (4), (6), (7), (11), (121), (20). Cimnastikçilerin yapısal özelliklerini incelemek üzere uluslararası yarışmalarda derlenmiş bir çok veri bulunmaktadır. (4), (6), (7), (9), (10), (11) (12), (23). Bununla birlikte spora özgü referans değerlerinin toplanmasına hala gereksinim duyulmaktadır.

Referansların bir çoğu yalnızca boy ve ağırlık değişkenlerini içermektedir. Cimnastik dalına özgü antropometrik referans değerlerini oluşturulması için daha kompleks bilgilere gerek vardır.

Bu araştırmada, 9. Balkan Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yarışan, Dünya cimnastiği üzerinde söz sahibi olan 6 Balkan Ülkesi'nin (35) genç bayan cimnastikçilerini Antropometrik, beden kompozisyonu ve somatotip özellikleri yönünden inceleyerek ülkeler ve dünya genelindeki referanslarla karşılaştırmayı ve cimnastikçilerin performansları ile yapısal özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçladık.

YÖNTEM VE GEREÇ

9. Balkan Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası sırasında (1991,

İSTANBUL) 11-15 yaşlar arasında (Ort: 13.21 ± 1.44) elit düzeyde 35 genç bayan cımnastikçi incelenmiştir.

ANTROPOMETRİK PARAMETRELER:

Tüm antropometrik ölçümler Anthropometric Standardization Reference Manuel'e uygun olarak yapılmıştır (13).

1. Ağırlık: Cımnastikçiler bedenlerinde mayodan başka giysileri olmaksızın 0.01 kg duyarlılıkta digital elektronik baskül kullanılarak ölçüldü.

2. Boy: Ayakta dik duruşa, baş frankfort planına uygun antropometre kullanılarak ölçüldü.

3. Oturma yüksekliği: Sporcu masa üzerinde bacakları aşağıya serbestçe sarkılmış kollardan destek alınmaksızın dik oturuşta masa ve verteks arasındaki uzaklık antropometre ile ölçüldü.

4. Kulaç uzunluğu: denek ayakta kolları yere paralel yanlara açılmış durumda el sırtı duvara yapıştırılmış grafik kağıdına temas ettirilerek ölçüldü.

5. Beden kültlesi indeksi (BMI): Ağırlık (kg)/boy (M2) ile hesaplandı.

6. Üst taraf uzunluğu ve boy ilişkisi için: Oturma yüksekliği * 100/boy formülü kullanıldı.

BEDEN KOMPOZİSYONU

1. Deri kıvrım kalınlıkları, biceps, triceps subscapular ve suprailiac bölgelerden ölçüldü. Ölçümler yalnız deneyimli bir kişi tarafından 0.2 mm. duyarlılıkta kalibre edilmiş ($10/\text{mm}^2$) Holtain skinfold kaliperle yapıldı. bütün ölçüler somatotip çalışmalarında da kullanılması ayrıca cımnastikçilerin genelde simetrik ölçülere sahip olması nedeniyle sporcuları sağ bölgelerinden alınmıştır.

2. Beden Yoğunluğu: ($D: \text{gr}/\text{ml}$): $1.1369 - 0.0598^* \log X$. Formülleri ile hesaplanmıştır.

$X = \text{Triceps} + \text{Biceps} + S. \text{ Scapular} + S. \text{ Illiac}$ Deri kıvrımları (8).

3. % Yağ: Siri'nin % Yağ: $(4.95/D) - 4.5$ * 100 formülü ile hesaplanmıştır.

4. Kol çevresi ve triceps deri kıvrım kalınlığı dikkate alınarak: KKÇ (Kol kas çevresi): Biceps Çevresi-O * Triceps Skinfold (cm) KKA (Kol kas alanı): (KKÇ) 2:40 formülleri ile hesaplanmıştır.

Somatotip

Heat-Carter protokolüne göre ölçüm yapılarak bilgisayar programıyla hesaplanmıştır (3).

Menarş Yaşı Hazırladığımız ankette sporculara merstruasyon yaşı sorularak kaydedilmiştir.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bütün parametrelerdeki verilerin toplam grup ve yaşlara göre aritmatik ortalamaları ve standart sapmaları, yaşlar arasındaki farklar analiz edilmiştir. Yaşlara göre antropometrik parametrelerin ilişkileri bilgisayarda (microsta) is

tatistik paketiyle araştırılmıştır.

BÜLGULAR VE TARTIŞMA

İncelediğimiz bayan sporcuların yaş ortalaması 13.21'dir. Sporcuların yaşlara göre dağılımları tablo 1'de gösterilmiştir.

Cimnastikçilerin antropometrik, beden kompozisyonu ve somatotip değerleri tablo 1,2 ve 3'de gösterilmiştir.

Boy (38.98 ± 2.75) ve ağırlık (148.14 ± 4.64) bakımından en yüksek değerler Arnavutluk, en düşük değerler de Romen takımında bulunmuştur. (Boy; 28.53 ± 2.22 , ağırlık; 134.62 ± 3.52). Genç bayan cimnastikçilerde ağırlık ve boy ortalamaları Rimini (2) ve Karlsruhe (1) Avrupa Gençler Şampiyonaları verileri ile karşılaştırıldığında (tablo 3-4) Balkan Gençlerinin ağırlık ve boy bakımından 15 yaşta daha ağır ve kısa, 12 yaşta daha hafif ve kısa, diğer yaşlarda yakın değerlerde bulunmuştur ($p=0.05$). Yaş ile boy arasında ($r=0.579$), yaş ile ağırlık arasında ($r=0.641$) anlamlı ilişki gözlenmiştir ($p<0.01$).

Cimnastikçilerin bu hafif ağırlık ve kısa boy değerleri genellikle bu branş için

Tablo 1: Balkan Gençler Şampiyonası, Bayanlar Antropometrik ve Beden Kompozisyonu Parametreleri

| PARAM | YAŞ GRUPLARINA GÖRE ORTALAMALAR | | | | | | GENEL ORTALAMA | |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 35 | SD | SD |
| N | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | | | |
| | \bar{X} | SD | \bar{X} | SD | \bar{X} | SD | \bar{X} | SD |
| KG | 30.2 ± 3.9 | 30.6 ± 2.6 | 38.1 ± 6.3 | 37.6 ± 2.67 | 37.4 ± 0.61 | 35.6 ± 3.44 | | |
| BOY | 136.2 ± 7.1 | 138.4 ± 5.8 | 147.2 ± 8.4 | 147.1 ± 5.91 | 144.0 ± 3.12 | 142.3 ± 8.00 | | |
| B.M.I | 16.2 ± 1.1 | 16.0 ± 0.6 | 17.4 ± 1.3 | 17.4 ± 0.76 | 18.0 ± 0.78 | 16.9 ± 1.18 | | |
| COR.I | 52.5 ± 1.3 | 52.1 ± 1.0 | 51.6 ± 0.8 | 51.3 ± 1.50 | 53.1 ± 0.60 | 52.0 ± 1.22 | | |
| %YAG | 16.0 ± 1.8 | 13.3 ± 2.8 | 16.8 ± 3.0 | 15.5 ± 1.41 | 17.9 ± 0.62 | 15.7 ± 2.51 | | |
| K.K.A | 29.6 ± 3.4 | 30.6 ± 2.5 | 33.7 ± 4.9 | 36.1 ± 3.87 | 35.6 ± 2.05 | 32.8 ± 4.38 | | |
| END | 2.9 ± 0.4 | 2.3 ± 0.5 | 2.9 ± 0.6 | 2.6 ± 0.33 | 3.2 ± 0.18 | 2.8 ± 0.49 | | |
| MEZ | 3.5 ± 0.7 | 3.4 ± 0.5 | 3.1 ± 0.4 | 3.4 ± 0.83 | 4.1 ± 0.59 | 3.4 ± 0.64 | | |
| EKT | 3.5 ± 0.8 | 3.9 ± 0.7 | 3.6 ± 0.6 | 3.6 ± 0.80 | 3.0 ± 0.25 | 3.6 ± 0.71 | | |

hafif ve kısa boylu çocuklar olarak seçilmelerinden kaynaklanabilir. Türk takımında yer alan cimnastikçilerin kendi yaş grubu Türkiye boy ve ağırlık persentili normlarına göre 25. persentili altında yer aldığı görülmüştür (15). Elit cimnastikçilerin kendi toplumlarının boy ve ağırlık ortalamalarının altında değerlere sahip oldukları bir çok araştırmacı tarafından da rapor edilmektedir. (16), (2), (17). 1964 Tokyo Olimpiyatlarından beri bayan cimnastikçilerin boyları 151.9 ile 163.2 arasında, ağırlıkları da 42.4 ile 53.6 kg. arasında değişmektedir.

Tablo 2: Balkan Gençler Şampiyonası, Bayanlar Antropometrik ve beden Compozisyonu Parametreleri

| PARAM | ÜLKELERE | | GÖRE | ORTALAMALAR | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | ARNAVUTL | BULGARIŞT | | YUNANİSTAN | ROMANYA | TURKİYE | YUGOSLAV |
| SPORC | \bar{X} | \bar{X} | \bar{X} | \bar{X} | \bar{X} | \bar{X} | \bar{X} |
| \bar{X} | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD |
| YAS | 14.1±0.5 | 14.6±0.6 | 12.4±1.40 | 12.79±0.7 | 13.5±1.5 | 11.3±0.5 | |
| KG | 39.0±2.8 | 36.6±3.1 | 36.0±6.43 | 28.53±2.2 | 35.9±3.8 | 28.6±4.5 | |
| BOY | 148.1±4.6 | 144.3±3.7 | 144.3±10.21 | 134.62±3.5 | 145.1±7.3 | 135.1±8.5 | |
| B.M.I | 17.8±1.1 | 17.5±0.7 | 17.2±1.07 | 15.73±0.8 | 17.0±0.9 | 15.6±1.1 | |
| CORMI | 51.4±1.7 | 51.6±1.4 | 52.2±1.08 | 51.75±1.2 | 52.3±1.0 | 53.0±0.2 | |
| %YAG | 16.7±1.3 | 15.7±1.6 | 15.7±1.31 | 11.34±1.1 | 17.6±2.6 | 16.7±1.6 | |
| K.K.A | 36.2±2.3 | 35.9±4.8 | 33.3±4.14 | 29.83±3.1 | 32.5±3.6 | 27.8±2.7 | |
| ENDOM | 2.9±0.4 | 2.7±0.3 | 2.7±0.21 | 2.01±0.2 | 3.1±0.4 | 3.1±0.5 | |
| MEZOM | 3.1±0.5 | 3.8±0.4 | 3.5±0.79 | 3.58±0.5 | 3.4±0.9 | 3.4±0.5 | |
| EKTOM | 3.5±0.9 | 3.3±0.4 | 3.5±0.81 | 3.73±0.6 | 3.7±0.9 | 3.8±0.7 | |

Tablo 3: Bayan cimnastikçilerin boy değerleri (cm)

| YAŞ | Rimini 1984 | Karlsruhe 1986 | İstanbul 1991 |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| 15 | 154.9 | 3.28 | 144.00 |
| 14 | 149.7 | 6.59 | 147.13 |
| 13 | 148.05 | 3.76 | 147.15 |
| 12 | 144.0 | 5.07 | 138.39 |
| 11 | 134.5 | 6.36 | 136.22 |
| ort | 148.98 | 6.68 | 142.31 |

Tablo 4: Bayan cimnastikçilerin ağırlık değerleri (kg)

| YAŞ (N) | Rimini 1984 | (N) | Karlsruhe 1986 | (N) | İstanbul 1991 |
|-----------|-------------|------|----------------|------|---------------|
| 15 (5) | 46.26 | 6.4 | (18) | 44.8 | 5.1 |
| 14 (31) | 38.72 | 6.04 | (27) | 38.7 | 5.8 |
| 13 (11) | 36.25 | 3.14 | (19) | 34.7 | 3.2 |
| 12 (3) | 35.70 | 5.89 | (11) | 31.4 | 3.3 |
| 11 (2) | 28.85 | 4.87 | (1) | 28.8 | - |
| ort. (52) | 38.4 | 6.23 | (76) | 38.3 | 6.5 |

Cınnastıkçılara göre aletlerde aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (Tablo 6) aletlerde ve toplamda genellikle orta ve kısa boylu olanların başarılı olduğu görülmektedir.

Tablo 5: Balkan Gençler Şampiyonası'nda ilk 6'ya giren Bayan cınnastıkçılara Antropometrik ve Beden Kompozisyonu Parametreleri.

| | AGR | BOY | BMI | CORM | % YAĞ | KKA | END | MES | EKT |
|-----|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----|-----|
| AVG | 31.76 | 139.1 | 16.26 | 51.1 | 13.20 | 31.9 | 2.3 | 3.5 | 3.7 |
| STD | 5.21 | 6.04 | 1.25 | 0.7 | 2.50 | 5.06 | 0.43 | 0.4 | 0.4 |

Bayan cınnastıkçılara 14 yaş dışında 16.85 ± 1.18 olan BMI ortalamaları Rimini 17.2 ± 1.7 ile Karlsruhe 17.7 ± 1.7 değerlerinden düşük bulunmuştur (2,1). Arnavutluk takımı 17.77 ± 1.10 BMI değeri ile en kitlevi, 15.73 ± 0.83 BMI değeri ile Romanya takımı en hafif yapılı takım olarak bulunmuştur ($p < 0.05$)

Genç Balkan cınnastıkçılının Kormik indeks ortalaması (52.00 ± 1.22) , Rimini gençlerinin 50.84 ± 1.26 , Karlsruhe gençlerinin 51.6 ± 1.3 olarak hesaplanmıştır. Balkan gençlerinin kormik indeks değerinin her iki referanstan da büyük oluşu onların bacak uzunluklarının gövdelerine göre daha kısa olduğunu göstermektedir (2,1). Balkan ülkelerini karşılaştırdığımızda en yüksek kormik indeks 53.02 ± 0.21 ile Yugoslav takımına, en düşük ise 51.37 ± 1.37 ile Arnavutluk takımına aittir.

Genç Balkan cınnastıkçılının % yağ ortalaması (15.66 ± 2.51) olarak hesaplanmıştır. Bu % yağ değeri ile Rimini gençlerinden (16.3 ± 2.4) daha düşük yağ oranına sahip oldukları görülmektedir. Karlsruhe genç cınnastıkçılının % yağ belirleme protokolü farklı olduğundan karşılaştırma

Tablo 6: Balkan Gençler Şampiyonası'nda aletlerde ve toplamda ilk 3 sırayı alan bayan cınnastıkçılara boy uzunlukları.

| Boy | Atlama | Paralel | Denge | Yer | Toplam |
|------------|--------|---------|-------|-----|--------|
| 145 ve üst | | | | 2. | |
| 140-144 | 1. | 1.2.3 | 1. | 3 | 1.3. |
| 139.8-135 | 3. | | 3. | | |
| 134 ve alt | 2. | | 2. | 1. | 2 |

yapılamamıştır. Bir çok literatürde bayan cimnastikçilerin yağ oranları 9.6 ile 17 arasında gösterilmektedir (22). Balkan ülkelerini karşılaştırdığımızda Romanya takımı (11.34 ± 1.05) en düşük, Türk takımı (17.63 ± 1.65) en yüksek yağ oranlarında bulunmuşlardır.

Balkan cimnastikçilerinin kol kas alanı (KKA) ortalaması (32.75 ± 4.38) Rimini (36.41 ± 5.32) ve karlsruhe (44.5 ± 3.8) ortalamalarından düşük bulunmuştur ($p<0.1$). En büyük KKA değeri Arnavutluk (36.18 ± 2.26), en düşük değeri de Yugoslavya (27.83 ± 42.67) takımına ait bulunmuştur. Bu farklılıklar cimnastikçilerin yaş ortalamalarının farklı olmasına bağlanabilir. Genelde 15 yaş dışında yaşla birlikte KKA değerinde artış görülmektedir. Yaşı ile kol kas alanı arasındaki ($r=0.584$) ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($p<0.01$).

Genç cimnastikçilerin ortalama somatotip puanları 2.75-3.43-3.59 olarak hesaplanmıştır. 13 yaş mid tip, 15 yaş dengeli mezomorf, diğer yaşlar ve tüm takım ortalamaları ektomorf-mezomorf olarak hesaplanmıştır. Bruggemann et al, (86)'nın çalışmasında da elit bayan cimnastikçilerin somatotip ortalaması 14 yaş dışında ektomorf-mezomorf ($1.5-3.8-3.4$), 14 yaş ektomorfik mezomorf olarak hesaplanmıştır (1). Genç Balkan cimnastikçilerinin mezomorfi puanları ortalaması Karlsruhe çalışmasından düşük, ektomorfi ve endomorfi ortalaması da yüksek bulunmuştur. Bu duruma göre Genç Balkan cimnastikçilerin Karlsruhe Avrupa gençler şampiyonasına ve 1987 Rotterdam Dünya şampiyonasına katılan sporculara göre ($1.8-3.7-3.1$) daha linear yapıda oldukları söylenebilir (55). Thorland ve arkadaşlarının çalışmasında da genç bayan cimnastikçilerin somatotipleri ($2.7-3.8-3.3$) mezomorf-ektomorf olarak hesaplanmıştır (21).

Balkan cimnastikçilerin mezomorfi puanlarının elit cimnastikçilerin puanlarından düşük olması yaş ortalamasının daha düşük olmasına bağlanabilir.

Bayan cimnastikçiler üzerindeki araştırmalar beden tipi ve kompozisyonun genel toplumdan ayırdedici önemli faktörler olduğunu ortaya koymuştur. Dünya şampiyonları, olimpiyat oyunları gibi büyük organizasyonlarda yapılan kinantropometrik çalışmalar, bayan cimnastikçilerin çoğunlukla somatokartın kuzey doğu bölgesinde, ektomorfi-mezomorfi çizgisinin hemen üzerinde yer aldığı göstermektedir. Sporcuların genelde daha mezomorf, daha az endomorf oldukları ve genelde ektomorfi ekseniinin üzerinde yer aldıkları görülmektedir. Genelde bayan populasyonunun somatokart üçgeninin batisına doğru yayıldığı bilinmektedir.

Sporcu ve antrenörlerinin anketimize verdiği cevaplardan bayan cimnastikçilerin hiç birinin menarşa ermediği anlaşılmıştır. Genç bayan cimnastikçilerin genel görünümleri preperal devrede oldukları ortaya koymaktadır. Rimini çalışmasında bayanların % 94'nin menarşa ermediği, göğüs ge-lişimlerinin de prebural tip devresinde olduğu bildirilmektedir (2). Bayan cimnastikçilerde biyolojik olgunlaşmanın geciği ve biyolojik yaşla kronolojik yaş arasında genellikle 1-4 yıllık farkın var olduğu bildirilmektedir (14,17).

İlk 6 sırada yer alan cimnastikçilerin antropometrik özelliklerini incele-

diğimizde, bu cimnastikçilerin kısa ve hafif yapılı, alt ve üst taraf uzunlukları birbirine yakın, yağ oranları düşük ve linear yapıda oldukları görülmektedir.

Günümüzde bayan cimnastikçilerin ortalama yaşı 5.2 (Santiago, 1977) ile 22.7 (tokyo, 1964) arasında değişmektedir. 1987 Rotterdam Dünya Şampiyonası ortalaması (16.5) katılma yaşıının giderek düşüğünü göstermektedir. Aynı düşüş boy ortalamasında da gözlenmektedir (5). boy ortalamasındaki bu azalma özellikle 1976 Münih Olimpiyatları ile 1983 Dünya Şampiyonası arasında gözlenmiş, daha sonra görre durağan kalmıştır. Boy ortalamasındaki düşüşle bağlantılı olarak ağırlık ortalamasında da düşüş gözlenmiştir. Rimini, 1984, Karlsruhe, 1986 ve Rotterdam, 1987 çalışmalarında olduğu gibi çalışmamızda da tüm beden ölçülerinde oldukça küçük değerlerle karşılaşılmıştır. bu küçük değerlerin günümüz cimnastikçilerinin yaş ve boylarındaki düşüşle ilgili olduğunu göstermektedir.

Son 20 yıldır elit bayan cimnastikçilerin biçimleri erkeklerle göre oldukça değişmiştir. Bayan cimnastikçilerde gözlenen bu küçük ölçü onların iskelet gelişimlerinin gecikmesine bağlanmaktadır 55).

Birçok çalışmada cimnastikçilerin ortalama menarş yaşı 14.5 ile 15.5 yaşıları arasında gösterilmekte beraber değişik sporlarda yarısan bayan sporcuların bıyolok olgunlaşmalarındaki gecikmenin nedeni tam olarak anlaşılmış değildir. Bununla birlikte puberte öncesi intensif antrenmanın menstruasyon yaşı üzerinde olumsuz etkileri olduğu savunulmaktadır (19).

SONUÇ:

Bu çalışmada, Balkan Gençler Şampiyonası'nda yarısan bayan cimnastikçilerin antropometrik ölçüleriyle morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ve referanslarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Cimnastikçilerin boy ve ağırlık ortalamaları aynı yaşı nüfusunun ortalamalarının altındadır. Cimnastikçilerin genelde kısa ve hafif yapılı olmaları avantaj sağlamaktadır.

Genç cimnastikçilerin BMI indeksleri referans cimnastikçilerin değerlerinden düşük bulunmuştur.

Genç Balkan bayan cimnastikçilerin alt taraf ve üst taraf uzunlukları birbirine yakın olmakla birlikte üst taraf uzunluğu alt tarafa göre bir miktar uzun bulunmuştur. Cimnastikte daha çok kısa büst ve uzun bacak tercih edilmektedir.

Cimnastikçilerde kulaç uzunluğu ortalaması boy uzunluğu ortalamasından uzun bulunmuştur. Elit cimnastikçilerde kulaç genelde boydan uzun bulunmuştur. Cimnastikçilerin % yağ değerleri cimnastikçiler için belirlenen sınırlar içinde bulunmuştur. Somatotip ortalamaları ektomorf-mezomorf bulunmuştur. Mezomorf ortalamaları referans değerlerden düşük buna karşılık ektomorfi ve endomorfi puanları yüksek bulunmuştur. Genç Balkan cimnastikçilerin diğer Avrupalı akranlarına ve elit cimnastikçilere göre daha linear yapıda oldukları görülmektedir. Balkan Şampiyonası'na katılan genç bayan cimnastikçilerin hiç birinin menstruasyon yaşında olmadıkları görülmüştür.

KAYNAKLAR

1. Bruggemann, P., Stefanicki, E (1986) Anthropometrische Characteristika jugenlicher Kunstrunnerinnen und Kunstrunner. "Eine Untersuchung Des Zusammenhangs Besti mmte Körperbaudimensionen und Sportpraktischer Leistungsfähigkeit Auf Der Grundlage Matematisch-Statistischer Methoden Institut Fur Leichtathletik und Turnen Der Deutschen Sporthochschule Köln.
2. Caldaroni, G., Leglise, M., Giampetro, M., Berluti, G., Guestella, Mularoni M. (1984): Enquête Anthropometrique Auxologique. IV. Championnats d'Europe Juniors de Gymnastique artistique (Rimini)
3. Carter, J. E. L. (1975): The Heath-Carter Somatotype Method. "Somatoplot". A Sandiego State Un. Syllabus,
4. Carter, J.E.L. (1982): Physical structure of olympic athletes. Pat I: The Montreal Olympic Games Anthropological Project. Basel: Karger
5. Claessens, A.L.M., Veer, F.M., Stijnen, V., Lefevre, J., Maes, H., Steens, G and Beunen, B. (1991): Anthropometric Charecteristics of outstanding male and female gymnasts. *Journal of sport sciences*, 53-74.
6. Cureton, T.K., Jr.(1951): Physical fitness of champion athletes. Urbana: University of Illinois Press
- 7-de Garay, A.L., Levine, L. and Carter, J.E.L. (1974): *Genetic and anthropological Studies of Olympic Athletes*. New York: Academic Press
8. Durning, J.V.G.A., Womersley, J. (1974): Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness measurements on 481 men and women aged 16 to 72 years. *Brit. J. Nutr.*, 32/1 (77-97)
9. Gajdos, a (1980): Developpment humain particularites morphologico-fonctionnelles et particularites en relation avec l'age du processus d'entraînement en gymnastique. *Revue de l'Education physique*, 4, 35-42
10. Gajdos, A (1984): Alter, Körpergrösse und Gewicht bei Kunstratern und kunstturnrinnen der W. M. 1983 in Budapest. *Leistungssport*, 14, 17-18
11. Hirata, K (1966): Physique and age of Tokyo Olympic champions. *Journal of Sport Medicine and Physical Fitness*, 6, 207-22.
12. Hirata, K Selection of Olympic Champions. Vol. II. Tokyo: Chukyo University 1979.
13. Lohman, T.G., Roche, A.F., Martorelli, R. (1988): *Anthropometric Standardization Reference Manual*. Human Kinetics Books, A Division of Human kinetics Publishers, Inc. Illinois
14. Malina, R.M. (1986): Maturational considera tions in elite young athletes. *Perspectives in Kinanthropometry*, pp. 25-43. Campaign, III., Human Kinetics
15. Neyzi, O., Binyildiz, P., Alp, H.: Türk çocuklarında Büyüme-Gelişme normları I. Tartı ve Boy Değereri. *İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 41 Supplementum 74*.
16. Ostyn, M., Simons, J., Beunnen, G., Renson, R. and Van Gerven, D. (ed) (1980): *Somatic and Motor Development of Belgian Secondary Schoolboys. Norms and Standarts*. Leuven: Leuven University Press
17. Peltemburg, A.L., Erich, W. B.M., Bernink, M. J.E., Z Onderland, M.I. Huisveld, I.A. (1984): Biological maturation, body composition, and growth of female gymnasts and control groups of schoolgirls and girl swimmers, aged 8 to 14 years: A cross-sectional survey of 1064 grils. *International Journal of Sports Medicine*, 5, 36-42,
18. Sheldon, W.H., Dupertius, C.W & Dermott, E. (1954): *Atlas of Men*. New York Harper and Row
19. Stager, J.M., Wiglessworth, J.K., and Hatler, L.K. (1990): Interpreting the relationship between age of menarche and prepubertal training. *Medicine and Science in Sports and exercise*, 22:1, 54-58
20. Tanner, J.M. (1964) : *The Physique of the Olympic Athlete*. London: Allen and Unwin
21. Thorland, W.G., Johnson, G.O., Tharp, G.D., and others. (1981): Body composition and somatotype characteristics of Junior Olympic athletes, *Med. Sci. Sports Exerc.* 13: 332
22. Wilmore, J.H. (1983): Body composition in sport and exercise: directions for future research. *Med Sci Sports Exer.* 15 (1) : 21-31
23. Zaharieva, E., Georgiev, N. and Tchetchmedgiev, R. (1979) Recherches anthropométriques sur les gymnastes masculins et féminins des XII^e championnats du monde de Varna 5Bulgarie) de 1974. *Cinesiologie*, 18, 19-24.