

ERCP'de pratik ipuçları - 2

Distale migre olmuş plastik stentin çıkartılması: Önce içeri it, sonra çıkart

Extraction of distally migrated plastic stent: First insert then extract

Erkan PARLAK, Bahattin ÇIÇEK, Bülent ÖDEMİŞ, Fatih AYDIN, Burhan ŞAHİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Plastik stentler ERCP'nin önemli tedavi edici araçlarıdır. Malign ve benign biliyer darlıkların ve safra kaçaklarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Plastik stentler 3-6 ay içinde tıkanıklıkları için uzun süreli stent takma ihtiyacı olan hastalarda belirli aralıklarla değiştirilmeleri gerekir.


Takılı plastik stentlerin çıkartılması başlıca 2 yöntemle yapılır. Stentlerin tek tek tutulup endoskopun çalışma kanalından çıkartılması ve stentlerin tutularak endoskopta birlikte çıkartılması. Birinci yöntemde özellikle 10 F stentlerde stentin snare ile ucundan tutulması ön koşuldur. Terapötik endoskop ile 7 F stent gövdesinden tutularak kanaldan çıkartılabilmektedir. Stentler endoskopta birlikte çıkartılacaksa ya tek tek çıkartılır ya da hepsi birden tutularak çıkartılır.

Stent distale migre olduğunda snare ile tutulamaz (Resim 1). Bu durumda sıklıkla uygulanan yöntem stentin bir stent çıkartıcı forsepsle gövdesinden tutularak endoskopta birlikte çıkartılmasıdır. Fazla miktarda stent olduğunda bunu birçok kez tekrarlamak gerektiği için özellikle mideden zor geçilen hastalarda bu bir dezavantajdır. Burada distale migre stentli bazı hastalarda uygulanabilecek bir alternatif yöntem önerilmektedir.

Plastik stent, stent çıkartıcı bir forsepsle papillaya 3-4 cm mesafeden tutulur. Endoskopu papillaya yaklaştıracak bir manevrayla içeriye doğru itilir

(Resim 2 ve 3). Sarkan miktarın uzunluğuna bağlı olarak bu işlem tekrarlanır. Daha sonra stent snare ile tutularak çıkartılır (Resim 4).

Bu yöntem özellikle distal darlığı olan hastalarda başarılı olmaktadır. Özellikle darlığın altına kaymışsa, proksimal darlıklarda stenti içeriye itmek mümkün olmayacağı için başarılı olamamaktadır. Bu hastalarda başka yöntemler tarif etmek gereklidir:)



Özgün Görüntüler

