

Metforminin Melanom Cilt Kanseri Hücreleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması**Investigating of Effects of Metformin on Melanoma Skin Cancer**

 Harun Alp¹,  Hidayet Tutun²,  Levent Altıntaş³,  Halil Mahir Kaplan⁴,  Ergin Şingirik⁵,  İbrahim Kahraman⁶

¹ Karamanoğlu Mehmetbey University, Medicine Faculty, Medical Pharmacology Department, Karaman.

² Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Veterinary Faculty, Pharmacology and Toxicology Department, Burdur.

³ Ankara University, Veterinary Faculty, Pharmacology and Toxicology Department, Ankara

⁴ Cukurova University, Medicine Faculty, Pharmacology Department, Adana.

⁵ Cukurova University, Medicine Faculty, Medical Pharmacology Department, Adana.

⁶ Hatay Mustafa Kemal University, Tayfur Ata Sokmen Faculty, Biophysics Department, Hatay.

Öz

Amaç: Kanselerde kemoterapötiklere gösterilen dirençte ve kanser gelişiminde apoptozisin önemli rolü vardır. Metformin tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan güvenli, ucuz ve etkili bir ilaçtır. Ayrıca, antikanser etkilerinin olduğuna dair kanıtlar olmasına rağmen metforminin bu etkiyi hangi mekanizmalar ile gerçekleştirdiği açık değildir. Bu nedenle, bu çalışmada metformin cilt kanseri hücrelerinde Bcl-2, kaspaz-3, bax, wee-1, AIF, grp78 ve gadd153 düzeyleri üzerine etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Deri kanseri hücrelerine (B16F10) metformin uygulandı ve kaspaz-3, bcl-2, hafta 1, gadd153, grp78 ve AIF seviyeleri ELISA kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: Çalışmamızda metforminin cilt kanseri hücrelerinde apoptozis proteinlerini (kaspaz-3, wee 1, gadd153, grp78 ve AIF) arttırdığı ve antiapoptotik markırı (bcl-2) azalttığı belirlendi.

Sonuç: Çalışma sonuçları metforminin melanom cilt kanseri üzerine apoptotik etkisinin olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Metformin, melanom cilt kanseri, kaspaz-3, bcl-2, wee 1, gadd153, grp78, AIF.

Abstract

Aim: Apoptotic pathways are important for resistance to chemotherapeutics drugs and cancer development. Metformin is a safe, inexpensive and effective drug used to treat type 2 diabetes. Furthermore, although there is evidence of anticancer effects, the mechanisms by which metformin exerts the effects are unclear. Therefore, it was aimed to investigate Bcl-2, kaspaz-3, bax, wee-1, AIF, grp78 and gadd153 levels in metformin treated skin cancer cells.

Materials and Methods: The skin cancer cells (B16F10) were treated with metformin and kaspase-3, bcl-2, wee 1, gadd153, grp78 and AIF levels were analyzed by using ELISA.

Result: Treatment of metformin increased of proapoptotic proteins (kaspase-3, bcl-2, wee 1, gadd153, grp78 and AIF) and decreased antiapoptotic protein (bcl-2).

Conclusion: In conclusion, this study showed that metformin has apoptotic effect on melanoma skin cancer.

Keywords: Metformin, melanoma skin cancer, kaspase-3, bcl-2, wee 1, gadd153, grp78, AIF.

Yazışma Adresi: Levent Altıntaş, Ankara University, Veterinary Faculty, Pharmacology and Toxicology Department, 06110, Diskapı, Ankara.

E-Posta: leventaltintas@hotmail.com

Alınma Tarihi : 20.09.2019 / **Kabul Tarihi :** 06.07.2020 / **Yayınlanma Tarihi :** 15/06/2021

Giriş

Metformin, *Galega officinalis* isimli bitkiden elde edilen ve tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan etkili ve güvenli bir ilaçtır (1). Metformin karaciğerdeki glukoneogenezi azaltır ve periferik dokular tarafından glikoz alımını teşvik eder, böylece kan glukozu ve insülin seviyelerini düşürür (2). Metforminin bu etkisini genellikle sitoplazma içinde bulunan hücresel enerji sensörü olarak görev yapan adenosin monofosfat kinaz (AMPK) yolağını tetikleyerek gösterdiği belirtilmektedir (3). Ayrıca, metforminin antikanser etkileri olduğuna dair kanıtlar da vardır (4). Yapılan araştırmalar metformin ile tedavi edilen diyabetik hastalarda kanser insidansı ve mortalite riskinin daha az olduğunu göstermiştir. Metforminin antikanser etkilerinin hangi mekanizmalar aracılığıyla oluştuğu halen kesin olarak belirlenemese de bu etkilerini doğrudan veya dolaylı birçok mekanizma ile gösterdiği düşünülmektedir (5-7). Bu mekanizmalardan biri AMPK aktivasyonu ile fosfatidilinositol 3-kinaz (PI3K)/AKT/rapamisin protein kompleksinin memeli hedefi (mTOR) yolağının baskılanmasıdır. Bu yolak hücre büyümesini ve metabolizmayı düzenleyen korunmuş bir sinyal yolağıdır. mTOR, S6 kinaz (S6K) ve translasyon başlatma faktörünün 4E bağlanma protein 1 (4EBP1) gibi protein sentezinde yer alan iki önemli hedefi doğrudan aktive eder (8). mTORC1 (rapamisin kompleksi 1'in memeli hedefi) mTOR'un iki fonksiyonel kompleksinden biridir ve AMPK ile negatif yönde regüle edilir. AMPK, mTORC1 yolağını doğrudan inhibe; mTOR yolağını inhibe eden tuberoz skleroz kompleks protein 2'yi (TSC2) ise dolaylı yoldan fosforile ederek; protein sentezinin ve hücre büyümesinin yavaşlamasına yol açar (9). Metforminin AMPK modülasyonu yoluyla mTOR aktivitesini inhibe ederek, çeşitli kanser türlerinin progresyonunda olumlu etkiler sağladığını bildiren çalışmalar vardır (10-12). Bunun yanında metforminin mTORC1'i AMPK ve TSC2 yolağından bağımsız RAG GTPaz aracılığıyla inhibe ettiği de bildirilmiştir (13).

Metforminin antikanser etkisini insülin benzeri büyüme faktörü (IGF), insülin ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER-2) aracılı sinyalleri azaltarak ve mTOR sinyal inhibisyonu yolağıyla anjiyogenez inhibisyonu ve apoptoz indüksiyonu ile gösterdiği ileri sürülmektedir (2,14). Karaciğer kinaz B1 (LKB1) olarak adlandırılan bir protein, tümör baskılayıcı genin ürünüdür. AMPK katalitik alt ünitesinin fosforilasyonu, LKB1 varlığında gerçekleşir ve adenosin monofosfat (AMP) tarafından kolaylaştırılır (15,16). AMPK aktivasyonu, mTOR sinyalinin inhibisyonuna yol açar, bu nedenle karaciğer tarafından glukoneogenez azaltılır. Metformin, hücre düzeyde hem dolaylı (insüline bağımlı) hem de doğrudan (insülin bağımsız) etkiler oluşturur. Doğrudan etkisine AMPK aktivasyonu ve karaciğerde glukoneogenezin inhibe edilmesine, kanser sentezinde protein sentezi ve hücre proliferasyonuna yol açan mTOR sinyal yolunun azaltılması aracılık eder (10,17,18). Metformin ayrıca insan meme kanseri hücrelerinde, mTOR yolağını inhibe ederek, HER-2 protein ekspresyonunu azaltır. Bu etkinin mTOR efektörü p70S6K1'in inhibisyonu ile meydana geldiği düşünülmektedir (19). Kanser baskılama özelliği olan p53'ün AMPK ile ekspresyonu ve fosforilasyonunun, metforminin antikanser etki mekanizmasındaki rolü halen tartışma konusudur (20).

Metforminin antikanser etkilerinin hangi mekanizmalar aracılığıyla oluştuğu halen kesin olarak belirlenemese de bu etkilerini doğrudan veya dolaylı birçok mekanizma ile gösterdiği aşikardır (21,22). Bu çalışmada, metforminin melanom cilt kanseri hücrelerinde kaspaz-3, bcl-2, bax, wee 1, gadd153, grp78 ve AIF protein düzeyleri ve aktiviteleri üzerine etkileri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Hücre Kültürü

Fare deri melanoma hücreleri (ATCC, B16F10), L-glutamin (%1) (Hyclone), penisilin (100 µg/ml), streptomisin (100 U/ml) ve %10 Fetal Bovine Serum (FBS) (Hyclone) eklenmiş Dulbecco's modification of Eagle's medium (DMEM) (Gibco) içerisinde üretildi. Hücreler, 75 m² hücre kültürü flasklarında her flaska 2x10⁶ hücre olacak şekilde tek tabaka halinde yetiştirildi. 37°C sıcaklıkta ve %5'lik CO₂'li etüvde inkübe edildi. Metformin (Sigma) 10 mM/L miktarında hücre mediumu içerisinde çözündürüldü (23). Çalışmada metformin uygulanan 6 flask ve metformin uygulanmayan (kontrol grubu) 6 flask toplamda 12 flask hücre kullanıldı. Bu hücreler 48 saat metformin ile muamele edilip ELISA yöntemiyle protein analizleri yapılması için homojenize edildi.

MTT Testi

MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) testi mitokondriyal aktiviteyi ölçmek için kullanıldı (24). Hücreler 96 kuyucuklu plakalara (3x10³ hücre/ml) ekildi. 48 saatlik farklı konsantrasyonlardaki metformin maruziyetinin (5 mM, 10 mM ve 20 mM miktarlarında) ardından hücre kültür mediumu atıldı ve hücreler 100 µl MTT çözeltisi ile (0,5 mg/ml miktarında DMEM içinde çözündürüldü) 2 saat 37°C'de ve %5 CO₂'de inkübe edildi. MTT çözeltisi daha sonra atıldı ve her bir kuyucuğa 100 µl Dimetil sülfoksit eklendi. Optik yoğunluk (OD), 550 nm'de bir mikropilaka okuyucuda (EL800, Bio-Tek Instruments, Inc.) okundu. Canlılık, her bir durum için elde edilen OD ortalamasının, kontrol (metformin içermeyen) koşuluna oranı olarak hesaplandı.

Hücre Homojenizasyonu

Her flasktan mediumlar uzaklaştırıldıktan sonra 5 ml PBS ile yıkandı. Ardından 3 ml Tripsin-EDTA eklendikten sonra 3 dakika beklendi ve üzerine 4 ml medium eklendikten sonra hücreler kaldırılarak 15 ml tüplere (Falkon) alındı. Tüpler +4°C sıcaklıkta 2000 RPM'de 10 dakika santrifüj yapıldıktan sonra sıvı kısımları atıldı. Yıkamak için üzerine tüplere 5 ml PBS eklendi ve +4°C sıcaklıkta 2000 RPM'de 10 dakika santrifüj yapıldıktan sonra PBS uzaklaştırıldı. Tüplerdeki hücreler üzerine 250 µl RIPA buffer (Radio-Immunoprecipitation Assay), 2,5 µl PMSF (Phenylmethylsulfonyl fluoride, 200mM), 2,5 µl sodyum vanadat (100 mM), 2,5 µl proteaz inhibitörü eklendi ve sonra hücreler buz üzerinde ultrasonik homojenizatör cihazı yardımıyla parçalanarak homojenatlar elde edildi. Homojenatlar 10000 RPM'de 10 dakika santrifüj edilip üstte ayrılan kısımlar (süpernatantlar) alınıp, alttaki çökeltiler (pelletler) atıldı.

Protein Miktar Tayini

Homojenize edilmiş hücrelerin protein miktar tayini Bradford yöntemi ile yapıldı. Sığır serum albümini (1 µg/ml) kullanılarak 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 (µg/ml) konsantrasyonlarda standart hazırlanıp her bir örnekten 10 µl alınarak distile su ile 100 µl'ye tamamlandı. Standart ve örneklerin üzerine 1 ml Bradford solüsyonu eklenip vorteksle karıştırıldıktan sonra spektrofotometrede (Rayto Life Reader, China) 595 nanometre dalga boyunda absorbans miktarları ölçüldü. Prism programında (GraphPad Software, USA) çizilen standart eğriye göre protein miktar tayini µg/µl cinsinden yapıldı. Protein miktar tayini ELISA deneylerinin standardizasyonu için yapılmıştır.

ELISA Testi

Bcl-2, kaspaz-3, bax, wee-1, AIF, grp78 ve gadd153 düzeyleri Shenzhen Genesis Technology (Guangdong, China) firmasından satın alınan ELISA kitleri ile üreticinin protokollerine göre tespit edildi.

İstatistik

Protein miktarlarının gruplar arasında istatistiksel önemini belirlemek için Student's t-testi kullanıldı. İstatistiksel analizler SPSS yazılım paketi ile yapıldı. Tüm değerler ortalama \pm SE olarak ifade edildi. Gruplar arasındaki farkların $p < 0,05$ seviyesinde istatistiksel yönden anlamlı olduğu kabul edildi.


Bulgular

Bu çalışmada, metformin cilt kanseri hücrelerinde antiapoptotik protein olan bcl-2'nin düzeyini (Şekil 1) anlamlı olarak azaltırken, kaspaz-3 (Şekil 1), bax (Şekil 1), wee-1 (Tablo 1), AIF (Tablo 1), gadd153 (Tablo 1) ve grp78 (Tablo 1) proteinlerini anlamlı olarak arttırdı. Ayrıca, metformin cilt kanseri hücrelerinin proliferasyonunu doza bağlı bir şekilde önemli ölçüde inhibe ettiği gözlemlendi (Şekil 1).

Tablo 1. Metforminin wee 1, AIF, gadd153 ve grp78 proteinlerinin ekspresyonları üzerine etkileri.

Proteinler	Kontrol	Metformin
wee 1	0,52 \pm 0,02 pg/ml	0,95 \pm 0,012 pg/ml*
AIF	0,45 \pm 0,01 pg/ml	1,82 \pm 0,011 pg/ml*
gadd153	0,29 \pm 0,019 pg/ml	1,53 \pm 0,08 pg/ml*
grp78	0,75 \pm 0,02 pg/ml	2,23 \pm 0,06 pg/ml*

Sonuçlar ortalama \pm SE olarak sunulmuştur. * İstatistiksel analiz: Student t test. (* : Kontrole göre $P < 0,05$).



Şekil 1. Metforminin melanom cilt kanserindeki bcl-2 (n=6), Kaspaz-3 (n=6) ve Bax (n=6) proteinlerinin ekspresyonlarına etkisi ve MTT sonuçları. Sonuçlar ortalama \pm SE olarak sunulmuştur.

İstatistiksel analiz: Student t test. (* : Kontrole göre $P < 0,05$).

Tartışma

Metformin, çoklu etki bölgeleri ve çoklu moleküler mekanizmaları olan karmaşık bir ilaçtır. Fizyolojik olarak, metformin, glukoz üretimini düşürmek için doğrudan veya dolaylı olarak karaciğere etki eder ve glukoz kullanımını artırmak, glukagon benzeri peptid-1 (GLP-

1)'i arttırmak ve mikrobiyomu değiştirmek için bağırsakta etki eder (25,26). Moleküler seviyede, metformin karaciğerdeki mitokondriyal solunum zincirini inhibe eder, AMPK'nin aktivasyonuna yol açar, insülin duyarlılığını artırır (yağ metabolizması üzerindeki etkiler yoluyla) ve siklik adenosin monofosfat (sAMP)'yi düşürür, böylece glukoneojenik enzimlerin ekspresyonunu azaltır. Metformin ayrıca, fruktoz-1,6-bisfosfatın AMP tarafından inhibisyonunu içeren karaciğer üzerinde AMPK'dan bağımsız etkilere de sahiptir (27,28).

Birçok çalışma, metformin ile tedavi edilmiş diyabetik hastalarda kanser riskinin azaldığını göstermiştir (2,29,30). Yapılan kapsamlı bir meta-analiz çalışmasında, metforminin pankreas kanseri, hepatoselüler karsinoma ve kolon kanserinde kanser insidansını %30-50 azalttığı tespit edilmiştir (31). Bu çalışmalar metformin kullanımının kansere karşı koruyucu etkisinin olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle meme kanserinde apoptotik etkilerini gösteren ve tedavide kullanılmasını destekleyen yayınlar bulunmaktadır (32,33). Metforminin prostat kanseri, akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, endometriyal kanser ve pankreas kanseri üzerindeki etkileri ile ilgili de yapılmış birçok çalışma mevcuttur (34-40).

Kanserlerde kemoterapötiklere gösterilen dirençte ve kanser gelişiminde apoptozisin önemli rolü vardır. Metformin güvenli, ucuz, şeker hastalarında sıkça kullanılan ve etkili ilaçlar arasında olduğu düşünülürse cilt kanseri üzerine yararlı etkileri büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, metformin cilt kanseri hücrelerinin proliferasyonunu doza bağlı bir şekilde önemli ölçüde inhibe ettiği gözlemlendi. Metformin A498 hücrelerinde (41), ovaryum kanser hücrelerinde (23,42) ve meme kanseri hücrelerinde (MCF-7) (43) doza bağımlı olarak proliferasyonu inhibe ettiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları yapılan bu çalışmaların sonuçları ile uyumlu bulunmuştur.

Bu çalışmada, metformin cilt kanseri hücrelerinde antiapoptotik protein olan bcl-2'nin düzeyini anlamlı olarak azaltırken, kaspaz-3, bax, wee-1, AIF, gadd153 ve grp78 proteinlerini anlamlı olarak arttırdı. Hücre dışı faktörlerle düzenlenen Bcl-2 veya Bax gibi birçok ölüm ve hayatta kalma genleri apoptozda rol oynar (44). Pro-apoptotik Bcl-2 familyası üyelerinin (bax, bad) anti-apoptotik bcl-2 familyası (bcl-2, Bcl-XL ve Mcl-1) üyelerine oranı arttıkça, dış mitokondri zarında gözenekler oluşur, apoptojenik kaspazları aktive etmek ve apoptozu indüklemek için mitokondriyal proteinler serbest bırakılır (45). Metformin ile muamele edilmiş epitelyal ovaryum kanseri hücrelerinde kaspaz 3/7 aktivasyonunda artma, fosfo-Bcl-2, Bcl-2, Bcl-xL ve Mcl-1 anti-apoptotik proteinlerin ekspresyonunda bir azalma ve proapoptotik proteinlerin Bax ve fosfo-Bad'ın ekspresyonunda bir artma gözlemlenmiştir (23). Başka bir çalışmada benzer şekilde metformin primer ovaryum kanseri hücrelerinde apoptozis, Bcl-2 ekspresyonunu azaltarak ve Bax ekspresyonunu artırarak tetiklediği gözlemlenmiştir (42). Ayrıca, metformin ile uzun süreli verilmesi melanoma tedavisinde kaspaz 3 ile apoptozu indüklediğini gözlemlenmiştir (46). Meme kanseri hücrelerinde (MCF-7) benzer şekilde kaspaz-3, Bax protein ekspresyonunu artırırken, Bcl-2 protein ekspresyonunu düşürmüştür (43). Bir protein kinaz olan Wee1 inhibisyonu, kanserde terapötik bir hedef olarak görülmektedir (47). Apoptoz indükleyici faktör (AIF), apoptoz indüksiyonu üzerine normal lokalizasyonundan mitokondriyal intermembran boşluğundan çekirdeğe yer değiştiren yeni bir memeli, kaspazdan bağımsız ölüm efektörüdür (48). Başka bir çalışmada araştırmacılar AIF'nin kaspazdan bağımsız hücre apoptozisindeki merkezi rolü nedeniyle, nükleer ve sitoplazmatik AIF seviyelerini western blot ile belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, MDA-MB-231 hücrelerinin

metformin ile işlemden sonra AIF'nin nükleer protein fraksiyonunda arttığını ve sitoplazmatik protein bölmesinde azaldığını göstermiştir. Araştırmacılar AIF'nin çekirdeğe translokasyon oranının arttığını ve daha sonra hücre ölüm oranının arttığını belirtmişlerdir (49).

Başka bir çalışmada insan kolorektal kanser (COLO 205) hücrelerinin silibinin ve metformin ile kombinasyon tedavisi sinerjistik olarak artmış PTEN ekspresyonu ve AMPK fosforilasyonu yoluyla hücre sağkalımının inhibe edilmesini sağladığı, bunun da kaspaz 3 ve AIF ekspresyonunda bir artışa neden olduğu belirtilmiştir (50). Metforminin insan ovaryum kanser hücrelerinde grp78, gadd153 ve kaspaz 3 ekspresyonunu etkili bir şekilde arttırdığını bulunmuştur (51). Yapılan bir başka çalışmada metformin insan akciğer kanseri hücre hatları A549 ve NCI-H1299'da apoptozise neden olduğunu ve hücrelerin çoğalmasında doza ve zamana bağlı bir şekilde önemli ölçüde inhibe ettiğini ve JNK / p38 MAPK yolağını ve GADD153'ü aktive ederek apoptozu indüklediğini bildirilmiştir (52). Yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile farklı kanser hücre hatlarında metforminin etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile benzerdir.

Sonuç

Sonuç olarak çalışmamız metforminin melanom cilt kanseri hücre hattında hücre içi apoptotik yolları aktive edip, antiapoptotik proteinleri inhibe ederek melanom cilt kanserinin üremesini azalttığını göstermiştir. Ayrıca bu çalışma metformin üzerine yapılacak bir sonraki aşama olan hayvan deneyi çalışmalarına da ışık tutmaktadır.

Teşekkür

Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından desteklenmiştir (Proje no. 16569).

Kaynaklar

- Bailey CJ, Day C. Metformin: its botanical background. *Practical Diabetes Int* 2004; 21: 115.
- Del Barco S, Vazquez-Martin A, Cufi S, Oliveras-Ferraro C, Bosch-Barrera J, Joven J. et al. Metformin: multi-faceted protection against cancer. *Oncotarget* 2011; 2: 896-917.
- Viollet B, Guigas B, Sanz Garcia N, Leclerc J, Foretz M, Andreelli F. Cellular and molecular mechanisms of metformin: an overview. *Clin Sci* 2012; 122 (6): 253-270.
- Martin-Castillo B, Vazquez-Martin A, Oliveras-Ferraro C, Menendez JA. Metformin and cancer: doses, mechanisms and the dandelion and hormetic phenomena. *Cell Cycle* 2010; 9 (6): 1057-1064.
- Evans JM, Donnelly LA, Emslie-Smith AM, Alessi DR, Morris AD. Metformin and reduced risk of cancer in diabetic patients. *BMJ* 2005; 330: 1304-1305.
- Lee MS, Hsu CC, Wahlqvist ML, Tsai HN, Chang YH, Huang YC. Type 2 diabetes increases and metformin reduces total, colorectal, liver and pancreatic cancer incidences in Taiwanese: a representative population prospective cohort study of 800,000 individuals. *BMC Cancer* 2011; 11:20. doi: 10.1186/1471-2407-11-20.
- Libby G, Donnelly LA, Donnan PT, Alessi DR, Morris AD, Evans JM. New users of metformin are at low risk of incident cancer: a cohort study among people with type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2009; 32: 1620-1625.
- Pulito C, Donzelli S, Muti P, Puzzo L, Strano S, Blandino G. microRNAs and cancer metabolism reprogramming: the paradigm of metformin. *Ann Transl Med* 2014; 2 (6): 58.
- Hay N, Sonenberg N. Upstream and downstream of mTOR. *Genes Dev* 2004; 18(16):926-945.
- Dowling RJ, Zakikhani M, Fantus IG, Pollak M, Sonenberg N. Metformin inhibits mammalian target of rapamycin-dependent translation initiation in breast cancer cells. *Cancer Research* 2007; 67 (22): 10804-10812.
- Han G, Gong H, Wang Y, Guo S, Liu K. AMPK/mTOR-mediated inhibition of survivin partly contributes to metformin-induced apoptosis in human gastric cancer cell. *Cancer Biol Ther* 2015; 16 (1): 77-87.
- Honjo S, Ajani JA, Scott AW, Chen Q, Skinner HD, Stroehlein J. et al. Metformin sensitizes chemotherapy by targeting cancer stem cells and the mTOR pathway in esophageal cancer. *Int J Oncol* 2014; 45 (2): 567-574.
- Kalender A, Selvaraj A, Kim SY, Gulati P, Brülé S, Viollet B. et al. Metformin, independent of AMPK, inhibits mTORC1 in a rag GTPase-dependent manner. *Cell*

Metab 2010; 11: 390-401.

- Jalving M, Gietema JA, Lefrandt JD, de Jong S, Reyners AK, Gans RO. et al. Metformin: taking away the candy for cancer? *Eur J Cancer* 2010; 46 (13): 2369-2380.
- Kahn BB, Alquier T, Carling D, Hardie DG. AMP-activated protein kinase: ancient energy gauge provides clues to modern understanding of metabolism. *Cell Metabolism* 2005; 1 (1): 15-25.
- Zhou G, Myers R, Li Y, Chen Y, Shen X, Fenyk-Melody J. et al. Role of AMP-activated protein kinase in mechanism of metformin action. *The Journal of Clinical Investigation* 2001; 108 (8): 1167-1174.
- Alimova IN, Liu B, Fan Z, Edgerton SM, Dillon T, Lind SE. et al. Metformin inhibits breast cancer cell growth, colony formation and induces cell cycle arrest in vitro. *Cell Cycle* 2009; 8 (6): 909-915.
- Zakikhani M, Dowling R, Fantus IG, Sonenberg N, Pollak M. Metformin is an AMP kinase-dependent growth inhibitor for breast cancer cells. *Cancer Research* 2006; 66 (21): 10269-10273.
- Vazquez-Martin A, Oliveras-Ferraro C, Menendez JA. The antidiabetic drug metformin suppresses HER2 (erbB-2) oncoprotein overexpression via inhibition of the mTOR effector p70S6K1 in human breast carcinoma cells. *Cell Cycle* 2009; 8: 88-96.
- Nelson LE, Valentine RJ, Cacicedo JM, Gauthier MS, Ido Y, Ruderman NB. A novel inverse relationship between metformin-triggered AMPK/SIRT1 signaling and p53 protein abundance in high glucose-exposed HepG2 cells. *Am J Physiol Cell Physiol* 2012; 303: C4-C13. doi: 10.1152/ajpcell.00296.2011.
- Cerezo M, Tichet M, Abbe P, Ohanna M, Leiraiki A, Rouaud F. et al. Metformin blocks melanoma invasion and metastasis development in AMPK/ p53-dependent manner. *Mol Cancer Ther* 2013; 12: 1605-1615.
- Li P, Zhao M, Parris AB, Feng X, Yang X. p53 is required for metformin-induced growth inhibition, senescence and apoptosis in breast cancer cells. *Biochem Biophys Res Commun* 2015; 464 (4): 1267-1274.
- Yasmeen A, Beauchamp MC, Piura E, Segal E, Pollak M, Gotlieb WH. Induction of apoptosis by metformin in epithelial ovarian cancer: involvement of the Bcl-2 family proteins. *Gynecologic Oncology* 2011; 121 (3): 492-498.
- Mossman T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. *J Immunol Methods* 1983; 65 (1-2): 55-63.
- Forslund K, Hildebrand F, Nielsen T, Falony G, Le Chatelier E, Sunagawa S. et al. Disentangling type 2 diabetes and metformin treatment signatures in the human gut microbiota. *Nature* 2015; 528: 262-266.
- Preiss D, Dawed A, Welsh P, Heggie A, Jones AG, Dekker J. et al. Sustained influence of metformin therapy on circulating glucagon-like peptide-1 levels in individuals with and without type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab* 2017; 19: 356-363.
- Miller RA, Chu Q, Xie J, Foretz M, Viollet B, Birnbaum MJ. Biguanides suppress hepatic glucagon signalling by decreasing production of cyclic AMP. *Nature* 2013; 494: 256-260.
- Malek M, Aghili R, Emami Z, Khamseh ME. Risk of cancer in diabetes: the effect of metformin. *ISRN Endocrinology*, 2013.
- Bowker SL, Majumdar SR, Veugelers P, Johnson JA. Increased cancer-related mortality for patients with type 2 diabetes who use sulfonylureas or insulin. *Diabetes Care* 2006; 29: 254-258.
- Landman GW, Kleefstra N, van Hateren KJJ, Groenier KH, Gans ROB, Bilo HJG. Metformin associated with lower cancer mortality in type 2 diabetes: ZODIAC-16. *Diabetes Care* 2010; 33: 322-326.
- Decensi A, Puntoni M, Goodwin P, Cazzaniga M, Gennari A, Bonanni B. et al. Metformin and cancer risk in diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. *Cancer Prev Res* 2010; 3 (11): 1451-1461.
- Cazzaniga M, Bonanni B, Guerrieri-Gonzaga A, Decensi A. Is it time to test metformin in breast cancer clinical trials? *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2009; 18: 701-705.
- Goodwin PJ, Ligoil JA, Stambolic V. Metformin in breast cancer: time for action. *J Clin Oncol* 2009; 27: 3271-3273.
- Bodmer M, Becker C, Meier C, Jick SS, Meier CR. Use of metformin and the risk of ovarian cancer: a case-control analysis. *Gynecologic Oncology* 2011; 123 (2): 200-204.
- Buzzai M, Jones RG, Amaravadi RK, Lum JJ, DeBerardinis RJ, Zhao F. Systemic treatment with the antidiabetic drug metformin selectively impairs p53-deficient tumor cell growth. *Cancer Res* 2007; 67 (14): 6745-6752.
- Cantrell LA, Zhou C, Mendivil A, Malloy KM, Gehrig PA, Bae-Jump VL. Metformin is a potent inhibitor of endometrial cancer cell proliferation—implications for a novel treatment strategy. *Gynecologic Oncology* 2010; 116 (1): 92-98.
- Kumar S, Meuter A, Thapa P, Langstraat C, Giri S, Chien J et al. Metformin—take is associated with better survival in ovarian cancer: A case-control study. *Cancer* 2013; 119: 555-562.
- Lee DJ, Kim B, Lee JH, Park SJ, Hong SP, Cheon JH. et al. The effect of metformin on responses to chemotherapy and survival in stage iv colorectal cancer with diabetes. *Korean J Gastroenterol* 2013; 60: 355-361.
- Memmott RM, Mercadob JR, Maier CR, Kawabata S, Fox SD, Dennis PA. Metformin prevents tobacco carcinogen-induced lung tumorigenesis. *Cancer Prev Res* 2010; 3: 1066-1076.
- Sadeghi N, Abbruzzese JL, Yeung SC, Hassan M, Li D. Metformin use is associated with better survival of diabetic patients with pancreatic cancer. *Clin Cancer Res*

Metforminin Melanom Cilt Kanserine Etkisi - Alp ve ark.

- 2012; 18: 2905-2912.
41. Fang Z, Xu X, Zhou Z, Xu Z, Liu Z. Effect of metformin on apoptosis, cell cycle arrest migration and invasion of A498 cells. *Molecular Medicine Reports* 2014; 9 (6): 2251-2256.
 42. Patel S, Singh N, Kumar L. Evaluation of effects of metformin in primary ovarian cancer cells. *Asian Pac J Cancer Prev* 2015; 16 (16): 6973-6979.
 43. Queiroz EA, Puukila S, Eichler R, Sampaio SC, Forsyth HL, Lees SJ. et al. Metformin induces apoptosis and cell cycle arrest mediated by oxidative stress, AMPK and FOXO3a in MCF-7 breast cancer cells. *PLoS one* 2014; 9 (5): e98207.
 44. Kang MH, Reynolds CP. Bcl-2 inhibitors: targeting mitochondrial apoptotic pathways in cancer therapy. *Clinical Cancer Research* 2009; 15 (4): 1126-1132.
 45. Adams JM, Cory S. The Bcl-2 protein family: arbiters of cell survival. *Science* 1998; 281 (5381): 1322-1326.
 46. Tomic T, Botton T, Cerezo M, Robert G, Luciano F, Puissant A. et al. Metformin inhibits melanoma development through autophagy and apoptosis mechanisms. *Cell Death & Disease* 2011; 2 (9): e199.
 47. Do K, Doroshow JH, Kummer S. Wee1 kinase as a target for cancer therapy. *Cell Cycle* 2013; 12 (19): 3348-3353.
 48. Lorenzo HK, Susin SA, Penninger J, Kroemer G. Apoptosis inducing factor (AIF): a phylogenetically old, caspase-independent effector of cell death. *Cell Death and Differentiation* 1999; 6 (6): 516.
 49. Liu H, Scholz C, Zang C, Schefe JH, Habel P, Regierer AC. et al. Metformin and the mTOR inhibitor everolimus (RAD001) sensitize breast cancer cells to the cytotoxic effect of chemotherapeutic drugs in vitro. *Anticancer Research* 2015; 32 (5): 1627-1637.
 50. Tsai CC, Chuang TW, Chen LJ, Niu HS, Chung KM, Cheng JT. et al. Increase in apoptosis by combination of metformin with silibinin in human colorectal cancer cells. *World Journal of Gastroenterology* 2015; 21 (14): 4169.
 51. Ma L, Wei J, Wan J, Wang W, Wang L, Yuan Y. et al. Low glucose and metformin-induced apoptosis of human ovarian cancer cells is connected to ASK1 via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress-associated pathways. *Journal of Experimental & Clinical Cancer Research* 2019; 38 (1): 77.
 52. Wu N, Gu C, Gu H, Hu H, Han Y, Li Q. Metformin induces apoptosis of lung cancer cells through activating JNK/p38 MAPK pathway and GADD153. *Neoplasma* 2011; 58 (6): 482-490.