

TÜRKİYE YAPRAKBİTLERİ (HOMOPTERA : APHIDIDAE) II. APHIDINAE : MACROPSOPHINI (II. KİSİM)

Nazife TUATAY¹

ÖZET

Türkiye'de tespit edilen Aphididae familyası türlerinin faunistik listesinin ikinci bölümünü oluşturan bu makale Aphidinae altfamilyası, Macropsophini tribusundan 18 cinse ait 45 türü kapsamaktadır. *Macchiatiella* del Guercio ve *Metopeurum* Modrvilko cinsleri ve *Dysaphis foeniculus* (Theobald), *D. lauberti* (Börner), *D. (Pomaphis) aucupariae* (Luckton), *Hyadaphis coriandri* (Das), *Macchiatiella rhamni* (Boyer de Fonscolombe), *Macrosiphoniella abrotani* (Walker), *M. absinthii* (L.), *M. pulvera* (Walker), *M. subaequalis* Börner, *M. tanacetaria* (Kaltenbach) ve kesin tür teşhisini yapılamayan *Metopeurum* sp. türleri Yurdumuz için yeni kayıtlardır.

Her bir türün Dünya'da ve Yurdumuz'daki yayılışı, konukçu bitkileri ve ekonomik zarar durumları belirtilmiştir.

GİRİŞ

Bu makale, Yurdumuz'da 1961-1972 yılları arasında toplanan Aphididae türlerinin faunistik listesinin ikinci bölümündür. Örneklerin toplanması, saklanması, teşhis için preparat yapımı birinci bölümde verildiği şekilde yapılmıştır (Tuatay, 1990).

Bu makale kapsamında *Diuraphis*, *Dysaphis*, *Elatobium*, *Eucarazzia*, *Hayhurstia*, *Hyadaphis*, *Hyperomyzus*, *Liosomaphis*, *Lipaphis*, *Longicaudus*, *Macchiatiella*, *Macrosipheniella*, *Macrosiphum*, *Masonaphis*, *Megoura*, *Metopeurum*, *Metopolophium* ve *Microlophium* cinslerinde 45 tür listelenmiştir. Bunlardan *Macchiatiella* del Guercio ve *Metopeurum* Modrvilko cinsleri ve *Dysaphis foeniculus* (Theobald), *D. lauberti* (Börner), *D. (Pomaphis) aucupariae* (Buckton), *Hyadaphis coriandri* (Das), *Macchiatiella rhamni* (Boyer de Fonscolombe), *Macrosiphoniella abrotani* (Walker), *M. absinthii* (L.), *M. pulvera* (Walker), *M. subaequalis* Börner, *M. tanacetaria* (Kaltenbach) ve kesin tür teşhisini yapılamayan *metopeurum* sp. türleri Yurdumuz için yeni kayıtlar olup listede (*) ile işaretlenmiştir.

Türlerin teşhisini, Dünya'da yayılışı ve konukçu bitkileri için Börner ve Heinze (1957), Bodenheimer ve Swirsky (1957), Shaposhnikov (1964), Tuatay ve Remaudiere (1964) ve Eastop (1966, 1972)'den faydalانılmıştır. diğer kaynaklardan alınan kısaltmalar için ayrıca literatür verilmiştir.

¹ Vall Dr. Reşit Sok. No: 7/2, ÇANKAYA-ANKARA
Yazının Yayımlanma ve Yönetim Kurulu'na Geliş Tarihi (Received): 2.3.1990.

Listede her bir türün toplandığı yer, tarih, toplayıcı, konukçu bitkiler ve zarar dumruları belirtilmiştir. Diğer araştırmacılar tarafından Yurdumuzda yapılan yaprakbiti kayıtları da, faunistik listeyi tamamlaması açısından literatür bildirimleri ile birlikte verilmiştir. Listede yer alan türlerin örnekleri Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Bitki Koruma Müzesi'nde bulunmaktadır.

APHIDINAE : MACROPSOPHINI
DIURAPHIS Aizenberg, 1935

Diuraphis noxius (Mordvilko and Kurdjumov, 1913)

Yayılışı-Batı Avrupa, Afrika, Güney Rodezya, Ukrayna, Moskova'ya kadar Kuzey Tranks-Kafkasya, Orta Asya Rusya'sı ve Ortadoğu.

Türkiye'de - Türkiye (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Isparta: Eğridir 15.6.1961, Yalvaç 27.4.1962; Ankara: Merkez 27.3.1962 (Tuatay et al., 1972) ve Bitlis: Ahlat 7.7.1959 G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964). Konya: Konuklar Devlet Üretme Çiftliği 25.4.1962, Sarayönü Yenicekaya Köyü 25.4.1962, Altonivâ 1.7.1962 ve Gözülü Devlet Üretme Çiftliği 28.11.1962; Ankara: Merkez 20.6.1962, 25.6.1963 ve 25.5.1964; Niğde: Bahçeli 26.6.1964; Erzincan: Merkez Demirpinar 8.7.1970; Ağrı: Patnos 15.7.1970; Van: Erciş 15.7.1970 ve Bitlis: Tatvan 22.7.1970 N. Tuatay. Ankara: Altınova 5.5.1963 Y. Türker. Konya: Gözülü Devlet Üretme Çiftliği 18.2.1963 Y. Sürmeli. Uşak: Ulubey 25.6.1964 M. Karman. Konya: Ereğli 18.7.1966, Gözülü Devlet Üretme Çiftliği 4.6.1970 ve Burdur: Bucak 15.5.1969 M. Duran. Burdur: Onmaz 7.6.1973 ve Bucak: Gündoğdu Köyü 7.6.1973 N. Koyuncu. Malatya: Hekimhan Kurşunlu 13.6.1973 ve 16.6.1973 S. Çavdaroğlu.

Konukcuları - *Agropyron*(ayırık), *Avena*(yulaf), *Bromus madritensis*, *Hordeum* (arpa), *Secale cereale* (çavdar), *Phleum* (el-kuyruğu) *Triticum* (buğday).

Türkiye'de çayırlarda (Bodenheimer and Swirsky, 1957). *Aeglops truncialis*, *Agropirum sp.*, *Avena sativa*, *Hordeum sp.*, *Triticum sp.*, *Viola tricolor* ve teşhis edilemiyen bir Graminaea (N. Tuatay).

Not : Arpa ve buğday zararlısı olarak tanıtan bu tür 1961 ve 1962 yıllarında Isparta ili Eğridir İlçesi ile Konya ili Yenice Köyü ve 1973 yılında Burdur ve Afyon bölgesi arpa ve buğdaylarında zarar yaptığı gözlenmiştir. Genellikle zararlı yapraklarda yaşar. Yoğunluğun fazlalaştığı yıllarda başaklarda da görülebilir. Zararının bulunduğu yapraklar uzunlaşmasına boru gibi kıvrılır. Önceleri sarımsı kırmızı ve daha sonra kırmızı-trak kahvemsi bir renk alır. Aynı zamanda sertleşerek elastikiyeti yok olur. Zarar gören tarlalarda bitkiler genellikle başak bağlamamaktadır. Bağlanan başaklar da çok cılız olup, sertleşen uç yapraklardan kendilerini kurtaramamaktadır.

Diuraphis (Holcaphis) frequens (Walker, 1848)

Yayılışı - Holaearktik bölge.

Türkiye'de - Bitlis: Tatvan-Reşadiye 11.10.1962 Erkek ve yumurtlayan dişi ve Diyarbakır: Bismil-Yasince 16.10.1962 G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Konukçuları - *Agropyron* (ayırık), *Hordeum* (arpa), *Lolium* (çim) ve *Triticum* (buğday).

Türkiye'de toplandığı bitkiye ait bir kayıt yoktur.

DYSAPHIS Börner, 1951

Dysaphis crataegi (Kaltenbach, 1843)

Yayılışı - Avrupa, Birleşik Amerika Devletleri (Stroyan, 1957), Güney Kafkasya, Orta Asya Rusya'sı ve Ortadoğu.

Türkiye'de - İstanbul Belgrad Ormanı (Acatay, 1943), Türkiye (Düzungüneş ve Tuatay, 1956). Ankara 6.11.1960; Konya: Beyşehir 7.5.1961 N. Tuatay (Tuatay et al., 1972) ve Van: Vangölü civarı. 10.10.1962 G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964)). Ankara 30.4.1939 F.S. Bodenheimer. Kastamonu 27.4.1961 H. Muche. Is-partı: Eğridir 9.5.1961 ve Ankara: Karagöl 13.7.1967 N. Tuatay.

Konukçuları - *Crataegus* (akdiken), *Daucus carota* (havuç), *Pastinaca sativa* ve *P. pimpinellifolia*.

Türkiye'de - *Crataegus* yetişen bölgelerimizde yaygındır.

Dysaphis devecta (Walker, 1849)

Yayılışı - Avrupa ve Rusya.

Türkiye'de - Malatya 12.7.1959 G. Remaudiere ve M. Yüksel (Tuatay et Remaudiere, 1964). Ankara: Merkez 22.4.1961 ve Burdur Tefenli 21.6.1969 N. Tuatay.

Konukusu - *Malus sylvestris* Miller (elma).

Türkiye'de - *Malus sylvestris* Miller. (G. Remaudiere ve M. Yüksel).

Not: Kolonilerin bulunduğu yapraklar kızararak bombeleşir. Özellikle genç fidanlarda zaman zaman önemli zarara neden olmaktadır.

Dysaphis foeniculus (Theobald, 1923).*

Yayılışı - Birleşik Amerika, Pakistan, Mısır, Kıbrıs, Güney Avustralya, Kwinslanya, Tasmanya, Viktorya, Yeni Zelanda, Eritre, Kenya, Tonganika, Rodezya ve Cezayir.

Türkiye'de - Ankara: Merkez 30.6.1963 N. Tuatay.

Konukçuları - *Anethum* sp. (dereotu), *Apium graveolens* (kereviz), *Daucus carota* (havuç), *Eryngium campestre*, *E. niaritimum*, *E. bungei*, *Ferula* sp. (asaotu), *Foeniculum vulgare*, *Foeniculum* sp., Rumex brownii, Rumex spp. (kuzukulağı).

Türkiye'de - *Eryngium campestre* (bugadikeni) N. Tuatay.

Dysaphis lauberti (Börner, 1940) *

Yayılışı - Avrupa.

Türkiye'de - Burdur: Değirmen 12.5.1961 N. Tuatay.

Konukçuları - *Heracleum* (tavşancılotu), ender olarak *Conium* (baldırın).

Türkiye'de - *H. sphondylium* (N. Tuatay).

***Dysaphis tulipae* (Boyer de Fonscolombe, 1841)**

Yayılışı - Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika, Orta Asya Rusya'sı, Ortadoğu, Mısır, Güney Avustralya, Tasmanya, Viktorya, Batı Avustralya, Yeni Zelanda, Kenya ve Rodezya.

Türkiye'de - İstanbul, Nisan - 1939 (Bodenheimer and Swirsky, 1957). İstanbul: Merkez Emirgan. 25.5.1969 Ş. Sahtiyancı.

Konukçuları - *Chionodoxa* (karyıldızı), *Crocus* (safran), *Gladiolus* (gladiol), *İris* (süsen), *Lilium* (zambak), *Moraea robinsoncane*, *Musa ensete* ve *Tulipa* (lale).

Türkiye'de - *Tupila* sp. (Bodenheimer and Swirsky, 1957). *T. gesnariana* (Ş. Sahtiyancı).

***Dysaphis (Pomaphis) aucupariae* (Buckton, 1879) ***

Yayılışı - Batı Avrupa, Kırım, Kuzey Kafkasya ve Trans-Kafkasya.

Türkiye'de - Ankara: Karagöl 9.6.1961 N. Tuatay.

Konukçuları - *Plantago lanceolata* (Dar yapraklı sınırotu), *P. media*, *P. major* ve *Sorbus terminalis* (Yabani üvez).

Türkiye'de - *S. terminalis* (N. Tuatay).

Not: Kolonilerin bulunduğu yapraklar enine bükülür ve sarımsı bir renk alır.

***Dysaphis (Pomaphis) plantaginea* (Passerini, 1860)**

Yayılışı - Palaearktik bölge.

Türkiye'de - Ankara 24.5.1939 ve 15.6.1940 ve Gaziantep 29.5.1939 (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Niğde: Merkez 5.5.1961; Isparta: İlyas 13.5.1961, Eğridir 26.4.1968; Ankara 18.5.1961, Merkez 25.5.1964 ve 5.5.1975; Antalya: Korkuteli 8.6.1963; Kayseri: Develi 17.5.1967; Elâzığ: Ezik Hüsenik 1.6.1969; Urfa: Gülpınar 8.6.1969; Gaziantep: Burç 10.6.1969; Burdur: Tefenni 21.1.1969; Samsun: Merkez 24.6.1971; Giresun: Merkez 30.6.1971; Gümüşhane: İki su mevkii 13.7.1971; Çanakkale: Umurbey 24.6.1972 ve Tekirdağ: Merkez Naip köyü 26.6.1972 N. Tuatay, İstanbul: Merkez Üsküdar 6.5.1961 Y. Yetmen. Samsun 23.5.1962 L. Miller. Sakarya: Merkez yazılık 14.5.1971 Ş. Sahtiyancı. Antalya: Korkuteli 11.6.1963 İ. Demir. Antalya: Elmalı 19.6.1963 A. Süzen. Niğde: Kayaardı 15.2.1967 K. Gümüş. Diyarbakır 5.5.1969; Elazığ: Kesrik 6.5.1969 ve Şahhacı Köyü 5.5.1970 S. Taşçıoğlu. İzmir: Bornova 20.4.1971 M. Tunçyürek.

Konukçuları - *Plantago lanceolata* (Dar yapraklı sınırotu), *P. media* (*L. major*), *Amygdalus communis* (badem), *P. domestica* (erik), *Malus sylvestris* Miller. (elma).

Türkiye'de - *Amygdalus* sp. ve *Malus* (Bodenheimer and Swirsky, 1957). *M. japonica* (N. Tuatay).

Not: Elma yetişen bölgelerimizde yaygındır. kolonilerin bulunduğu yapraklar orta damar yönünde iki yandan boru gibi kıvrılırlar. Aynı zamanda kırmızımsıträk sarımsı bir renk alırlar.

Dysaphis (Pomaphis) pyri (Boyer de Fonscolombe, 1841)

Yayılışı - Batı Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya Rusya'sı ve Ortadoğu.

Türkiye'de - Ankara 29.4.1941 ve 6.5.1941 (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Ankara 24.5.1939 ve 15.5.1961 N. Tuatay (Tuatay et al., 1967 ve 1972). İzmir: Kemalpaşa Merkez 4.3.1968, Bornova Merkez 24.4.1968 ve 26.4.1972 (Giray, 1974). Ankara 27.5.1939 F.S. Bodenheimer. Niğde: Merkez 6.5.1961; Konya: Beyşehir 7.5.1961; Isparta: Gelendost 7.5.1961 ve Ankara: Merkez 2.6.1964 N. Tuatay. Kayseri: Bünyan Mahya Köyü 16.5.1967 A. Kalkandelen. İstanbul: Merkez Göztepe 28.10.1965 S. Keyder. Malatya 25.4.1967 Ü. Erkal.

Konukçular - *Galium* (yoğurtotu), *Linum* (keten), *Rubia* ve *Pyrus communis* (armut).

Türkiye'de - *P. communis* (Bodenheimer and Swirsky, 1957). *P. elaeagrifolia* (ahlat) (Giray, 1974).

Not: Toplamlarımız süresinde yoğunluk yaptığı kayıt edilmemesine rağmen armut yetişen bölgelerimizde yaygındır.

Dysaphis (Pomaphis) sorbi (Kaltenbach, 1843)

Yayılışı - Avrupa, Kafkasya, Ural dağları ve Ortadoğu.

Türkiye'de - Ankara 5. ay (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Artvin: Artvin serisi Sallet mevkii 1610 m 2.8.1964 (Çanakçıoğlu, 1966).

Konukçuları - *Campanula patula* (Yayılmış çançiceği), *C. persicifolia*, *C. rotundifolia*, *Jasione montana* (uyuzotu), *Sorbus aucuparia* (kuşuvezi), *S. cerasus*, *S. domestica* (üvez), *S. hybrida*.

Türkiye'de - *Sorbus* sp. (Çanakçıoğlu, 1966).

***Dysaphis* sp.**

Türkiye'de - Ankara: Karagöl 13.6.1967 N. Tuatay.

Konukçuları - *Crataegus* sp. (Ak diken).

ELATOBIUM Mordvilko, 1914

Elatobium momii (Shinji, 1922)

Yayılışı - Japonya.

Türkiye'de - Giresun: Bicik Mercandere mevkii 1560 m 13.8.1964 ve Bursa: Uludağ Sarialan 1650 m. 22.8.1965 (Çanakçıoğlu, 1966 ve 1975).

Konukçuları - *Abies firma* (mavi köknar).

Türkiye'de - *A. nordmanniana bornmülleriana* (Uludağ köknarı) ve *A. nordmanniana* (Kafkas köknarı) (Çanakçıoğlu, 1975).

EUCARAZZIA del Guercio, 1921

Eucarazzia elegans (Ferrari, 1872)

Yayılışı - İtalya, İspanya, Manoko ve Ortadoğu.

Türkiye'de - İstanbul 6.4.1939 (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Ankara 27.12.1960 N. Tuatay (Tuatay et Remaudiere, 1964), Ankara 21.9.1965 ve İzmir: Çeşme 9.5.1966 N. Tuatay.

Konukçuları - *Mentha* sp. ve *Salvia* sp.

Türkiye'de - Teşhis edilemiyen bir bitki türünden (Bodenheimer and Swirsky, 1957). *Lavandula stoechas* (Lavanta çiçeği), *Mentha* sp. (nane) ve *Salvia splende* (Ateş çiçeği) (N. Tuatay).

HAYHURSTIA del Guercio, 1917

Hayhurstia atriplicis (Linnaeus, 1761)

Yayılışı - Holarktik bölge.

Türkiye'de - Ankara 6.1941 (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Eskişehir: Mayıslar 10.3.1961 M. Göbelez ve Elazığ 13.19.1962 (erkek) G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere 1964). Antalya: Kaş Sütlügen 1340 m 7.8.1965 (Çanakçıoğlu, 1975). Van: Merkez 16.7.1970, Edremit Salmansu 18.7.1970 ve Edirne: Merkez Yeni Kadın köyü 28.6.1972 N. Tuatay.

Konukusu: *Atriplex* (karapazı), *Beta* (pancar), *Chenopodium* (kazayağı) ve *Spinacia* (ıspanak)

Türkiye'de *Chenopodium* sp. (Bodenheimer and Swirsky, 1957). *Solanum lycopersicum* (domates) (Çanakçıoğlu, 1957) *Atriplex* sp. (N. Tuatay).

HYADAPHIS Kirkaldy, 1904

Hyadaphis corlandri (Das, 1918)*

Yayılışı - Kenya, Nijerya, Rodezya, Güney Afrika, Akdeniz bölgesi, Sudan, Hindistan, Pakistan, Mısır, Ortadoğu ve belki Kwinsland.

Türkiye'de— Balıkesir: Türkeli Adası 22.8.1962 ve Konya 8.11.1967 N. Tuatay. İstanbul: Merkez Pendik 17.6.1967 U. Ataman

Konukçuları: *Anethum* sp. (dereotu), *Coriandrum sativum* (kişnişotu), *Daucus arota* (havuç) *Foeniculum piperitum*, *F. vulgare*, *Foeniculum* sp. ve *Pithyrant-*

hus tortuosos.

Türkiye'de- *Eryngium maritimum* (N. Tuatay)

Hydaphis foeniculi (Passerini, 1860)

Yayılışı - Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Afrika, Kwinsland, Güney Avustralya, Tasmanya, Viktorya, Yeni Zellanda, Rodezya, Pakistan ve Ortadoğu.

Türkiye'de- Ankara 5.1939 (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Bitlis: Tatvan Erkek ve yumurtlayan dışı) G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964). İstanbul: Maçka parkı 50 m 21.6.1964 (Çanakçıoğlu, 1966). İzmir: Çeşme Ovacık 18.6.1968 ve Bornova Merkez 14.4.1972 (Giray, 1974). Ankara: Karagöl 19.7.1964 ve 14.7.1966; Burdur: Tefenli Karamanlı 24.6.1969 ve Erzincan: Çağlayan 4.7.1970 N.Tuatay.

Konukçuları - *Apium graveolens* (kereviz), *Cicuta douglassi*, *C. occidentalis*, *Conium maculatum* (baldırın), *Daucus carota* (havuç), *Foeniculum*, *Levisticum officinale*, *Lonicera* spp. (hanımeli), *Pastinaca sativa*, *Petroselinum* sp. (maydonoz) ve *Xylosteum*.

Türkiye'de- *Lonicera* sp. (Bodenheimer and Swirsky, 1957). *Eveniculum vulgare* ve *Pimpinella anisum* (anason) (Giray, 1974). *Lonicera caederulea* (Gök mavisi hanımeli), *Lonicera* sp. ve bir *Umbellifirae* (N.Tuatay)

Not: Burdur ili anasonlarında 1964 - 1966 yıllarında zarar yaptığı gözlenmiştir. Zarar gören bitkilerde meyveye yatma oranı düşer. Aynı zamanda meyveler cılız tescük eder. Bu nedenlerle de verim azalır, kalitesi bozulur.

***HYPROMYZUS* Börner, 1933**

Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 1958)

Yayılışı - Avrupa, Amerika, Afrika, Arjantin, Brezilya, Kuzeyde Kibini Dağlarına kadar Batı Sibirya, Trans-Kafsakya, Orta Asya Rusyası ve Ortadoğu.

Türkiye'de- Eskişehir: Mayıslar 10.3.1961 M. Göbelez ve İstanbul: Maltepe 12.1.1961 N.Tuatay (Tuatay et Remaudiere, 1964). Sakarya 11.5.1963 M. Göbelez. Antalya: Alanya 6.6.1963; Muğla-Aydın yolu 12.6.1963 ve Aydın-İzmir yolu 9.5.1966 N.Tuatay.

Konukçuları - *Crossularia rectinata*, *Lactuca sativa* (baş marul) *Ribes nigrum* (kara bektaşıfüzümü), ender olarak *R. alpinum*, *R. rubrum*, *R. ussuriensis*, *Sonchus asper*, *S. oleraceus* ve *S. baluster*.

Türkiye'de- *L. sativa*, *S. asper* ve *Sonchus* sp. (yalancı marul) (N.Tuatay).

Hyperomyzus? lactucae (Linnaeus, 1758)

Türkiye'de-Sakarya 11.5.1963 M. Gölebez.

Hyperomyzus (Neonasonovio)? picridis (Börner and Blunck 1916)

Türkiye'de-İstanbul: Merkez Erenköy 1.6.1972 Ş.Sahtiyancı.

Türkiye'de toplandığı bitkiye ait bir kayıt yoktur.

LIOSOMAPHIS Walker, 1868

Liosomaphis berberidis (Kaltenbach, 1843)

Yayılışı - *Berberis*'in yetiştiği bütün bölgeler (Eastop., 1966).

Türkiye'de-Bitlis: Ahlat 7.7.1959 G.Remaudire; Konya: Beyşehir 7.5.1961 ve Ankara 19.5.1961 N.Tuatay (Tuatay et Remaudiere, 19674). Ankara: Merkez 17.6.1966 ve 8.7.1967; İstanbul: Merkez 29.6.1966; Çankırı: İlgazdağı Belören mevkii 17.11.1968 (Erkek ve yumurtlayan dışı) ve Giresun: Tirebolu 1.7.1971 N.Tuatay.

Konukçuları - *Berberis vulgaris* (kadın tuzluğu), *B.thunbergii*, *Manohonia*.

Türkiye'de - *B.vulgaris* (G.Remaudiere). *Berberis* sp. *M.aguipolum* ve *Mohnia* sp. (N.Tuatay).

LIPAPHIS Mordvilko, 1928

Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843)

Yayılışı - Dünya'da geniş yayılma alanı olan bir türdür.

Türkiye'de- Gaziantep: Merkez Kale 10.4.1962 Y.Sürmeli (Tuatay et Remaudiere, 1964). Ankara: Beypazarı 21.11.1963 ve Mersin: Silifke Narlıköy Cennet-Cehennem 5.6.1963 N.Tuatay.

Konukçuları - *Alliaria*, *Arabis*, *Bunias*, *Cakile*, *Cardamine hirsuta*, *Capsella bursa-pastoris* (çoban çantası), *Erysimum*, *Hypes*, *Matthiola* (kültür formu), *Nasturtium* (su teresi), *Raphanus*, *Sinapis arvensis* (yabani hardal), *Sisymbrium officinale* (bülbül otu), *Thlaspis* (tarla akçaçiçeği) ve ender olarakta *Brassica* (lahana).

Türkiye'de- *Camelina* sp. ve bir *Cruciferae* (N.Tuatay). *Lepidium draba* ve *Sinapis arvensis* (Y. Sürmeli).

Lipaphis (Lipaphidiella) lepidii (Nevsky, 1929)

Yayılışı - Orta Asya, Pakistan ve Ortadoğu.

Türkiye'de - Eskişehir: Biçer 11.5.1961 N. Göbelez (Tuatay et Remaudiere, 1964). Eskişehir: Biçer 20.6.1963 ve Ankara: Merkez 30.6.1963 N. Tuatay.

Konukçuları - *Lepidium draba*, *L. repens* ve *Lepidium* sp.

Türkiye'de - *Lepidium* sp. (M. Göbelez).

LONGICAUDUS Van der Goot, 1913

Longicaudus trirhodus (Walker, 1849)

Yayılışı - Avrupa, Kuzey Amerika, Trans-Kafkasya ve Batı Sibirya.

Türkiye'de - İstanbul 8.4.1939 (? F.S. Bodenheimer) (Tuatay et Remaudiere, 1964). Van: Edremit Salmansu 18.7.1970 N. Tuatay.

Konukçuları - *Aquilegia vulgaris* (Haseki külesi), ender olarak *A. chrysanthia*, v.d., *Rosa canina* (yaban gülü), *R. rubiginosa*, *R. villosa*, v.d., *Thalictrum minus* (ufak çayır seddi), *T. aquilegiifolium*.

Türkiye'de - *Rosa* (? F.S. Bodenheimer). *Thalictrum* sp. (N. Tuatay).

MACCHIATIELLA del Guercio, 1909

Macchiatiella rhamni (Boyer de Fonscolombe, 1841)

Yayılışı - Batı Avrupa, Doğu ve Güney Ural'lar, Batı Kazakistan ve Trans-Kafkasya.

Türkiye'de-Erzurum: İspir Serçeme 10.7.1971 N. Tuatay.

Konukçuları - *Polygonum alpinum*, *P. montanum*, *Rhamnus alpina* (Alp cehrisi) ve *R. cathartica* (adi cehri).

Türkiye'de - *Cornus* sp. (kızılçık) (N. Tuatay).

MACROSIPHONIELLA del Guercio, 1911

Macrosiphoniella abrotani (Walker, 1852)*

Yayılışı - Avrupa (İngiltere ve İsviçre) ve Viktorya.

Türkiye'de - Van: Muradiye 15.7.1970 ve Trabzon: Akçaabat 7.7.1971 N. Tuatay.

Konukçuları - *Artemisia abrotanum* (pelin).

Türkiye'de - *Artemisia* spp. (N. Tuatay).

Macrosiphoniella absinthii (Linnaeus, 1758)*

Yayılışı - Batı Avrupa ve Rusya.

Türkiye'de - Van: Başkale 21.7.1970 ve Artvin: Merkez Mersivan 10.7.1970 N. Tuatay.

Konukçuları - *Artemisia absinthium* (acı pelin).

Türkiye'de - *Artemisia* sp. ve *Achillea* sp. (civanperçemi) (N. Tuatay).

Macrosiphoniella artemisiae (Boyer de Fonscolombe, 1841)

Yayılışı - Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika, Japonya, Orta, Güney ve Batı Sibirya ve Ortadoğu.

Türkiye'de - Diyarbakır 7.10.1962 ve Bitlis 11.10.1962 G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964). Isparta: Eğridir 28.4.1968; Burdur: Gölhisar 22.5.1969 ve Giresun: Merkez 7.6.1971 N. Tuatay.

Konukcuları - *Artemisia absinthium* (acı pelin), *A. campestris* (tarla pelini) ve *A. vulgaris* (pelin).

Türkiye'de - *A. vulgaris* (C. Remaudiere). *Artemisia* spp. (N. Tuatay)

Macrosiphonella helichrysi Remaudiere, 1952

Yayılışı - Fransa. (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Türkiye'de - Kastamonu: İnebolu 22.7.1964 N. Tuatay, (Tuatay et Remaudiere, 1964). Van: Başkale Güzelsu 20.7.1970 N. Tuatay.

Konukcuları - *Helichrysum stoechas*.

Türkiye'de - *H. graveoleus* (hasır çiçeği) ve *Dipsacus* spp. (firçaotu) (N. Tuatay).

Macrosiphonella oblonga (Mordvilko, 1901)

Yayılışı - Avrupa (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Türkiye'de - Diyarbakır 7.10.1962 G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964). Giresun: Merkez 27.6.1971 N. Tuatay.

Konukcuları - *Artemisia vulgaris* (pelin)

Türkiye'de - *A. vulgaris* (G. Remaudiere). *Artemisia* sp. (N. Tuatay).

Macrosiphonella pulvera (Walker, 1848)*

Yayılışı - Batı Avrupa, Güneybatı ve Doğu Sibirya ve Orta Asya Rusya'sı.

Türkiye'de - Ankara: Malya 3.6.1961, Elmadağ 24.5.1967 ve I. Çubuk barajı 13.6.1967; Eskişehir - Sivrihisar yolu 12.5.1966 ve Erzurum: İspir 10.7.1970 N. Tuatay.

Konukcuları - *Artemisia austriaca* ve *Artemisia maritima* (N. Tuatay)

Türkiye'de - *A. absinthium* (acı pelin) ve *Artemisia* spp. (N. Tuatay).

Macrosophiniella sanborni (Gillette, 1908)

Yayılışı - Dünya'da çok yaygın bir türdür.

Türkiye'de - Türkiye (Düzungünüş ve Tuatay, 1956). Ankara 15.12.1938, 13.5.1939, 1.6.1939, 10.4.1940 ve 15.6.1940 (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Gaziantep 29.5.1939. Sakarya 16.6.1961 M. Göbelez (Tuatay et. al., 1972). İzmir: Bornova Merkez 2.10.1965 (Giray, 1974). Konya: Koçaş Devlet Üretme Çiftliği 4.5.1961, Akşehir 13.6.1961, Çumra 21.6.1962; Manisa: Soma 10.10.1961; Malatya: Merkez 19.10.1963; Urfa 7.6.1969; Samsun: Bafra 25.6.1971 ve Rize: Ardeşen 5.7.1971 N. Tuatay. Eskişehir: Biçer 10.6.1961 ve Adapazarı: Arifiye 16.6.1961, M. Göbelez. Bolu 28.7.1966 B. Alkan.

Konukçuları - *Chrysanthemum cascade*, *C. frutescens*, *C. indicum* (Hint kri-zantemi), *C. sinensis* ve *C. yedoensis*.

Türkiye'de - *Chrysanthemum* sp. (Düzungüneş ve Tuatay, 1956). *Chrysanthemum* spp. (Diğer toplayıcılar).

Macrosiphoniella staegeri Hille Ris Lambers, 1947

Yayılışı - Batı ve Orta Avrupa (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Türkiye'de - Bitlis: Tatvan 9.10.1962 (Erkek ve yumurtlayan dışı) G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Konukçuları - *Centaurea* spp. (peygamberciği).

Türkiye'de - *Centaurea* sp. (G. Remaudiere).

Macrosiphoniella subaequalis Börner, 1942*

Yayılışı - Fransa.

Türkiye'de - Çanakkale: Lapseki Suluca köyü 24.6.1972 N. Tuatay.

Konukçuları - *Artemisia campestris* (tarla pelini).

Macrosiphoniella tanacetaria (Kaltenbach, 1843)*

Yayılışı - Batı Avrupa ve Rusya.

Türkiye'de - Ankara: Karagöl 14.7.1966 N. Tuatay.

Konukçuları - *Tanacetum vulgare* (solucanotu).

Türkiye'de - *T. vulgare* (N. Tuatay).

Macrosiphoniella teriolana Hille Ris Lambers, 1931

Yayılışı - Almanya, Fransa, İsviçre ve İtalya (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Türkiye'de - Bitlis: Tatvan 9.10.1962 G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Konukçuları - *Artemisia campestris* (tarla pelini).

Türkiye'de - *A. campestris* (G. Remaudiere).

***Macrosiphoniella* sp.**

Türkiye'de - Van: Başkale - Güzelsu 20.7.1970 N. Tuatay.

Macrosiphoniella (Papillomyzus) tuberculata (Nevsky, 1928)

Yayılışı - Orta Asya, İsrail, İran ve Suriye (Tuatay ve Remaudiere, 1964).

Türkiye'de - Diyarbakır: Silvan 6.7.1959; Elazığ: Pertek 14.10.1962 (erkek ve yumurtlayan dışı), Hazar gölü 15.10.1962 (erkek ve yumurtlayan dışı) G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Konukçuları - *Carduus* (kangal) ve *Picnomon acarna*.

Türkiye'de - *P. acarna* (G. Remaudiere).

Macrosiphoniella (Phalangomyzus) tapuscae (Hottes and Frison, 1931)

Yayılışı - Avrupa ve Kuzey Amerika (Tuatay et Remaudiere, 1964), Ortadoğu.

Türkiye'de - Bitlis: Ahlat 7.7.1959, Bitlis 8.10.1962 ve 11.10. 1962, Tatvan-Şükran 10.10.1962 (erkek ve yumurtlayan dişi) G. Remaudiere; Niğde 5.5.1961 ve Ankara: Elmadağ 31.5.1961 (N. Tuatay et Remaudiere, 1964). Ankara: Nallıhan 30.5.1961; Erzurum: Dumlu 9.7.1970 ve Van: Başkale 21.7.1970 N. Tuatay.

Konukçuları - *Achillea millefolium*, *Anthemis ruthenica*, *A. tinctoria* (boyacı papatyası), *Matricaria chamomilla* ve *M. inodora* (kokusuz yalancı papatyası).

Türkiye'de - *Achilleaspp.* ve *Fumariasp.* (N. Tuatay). *M. inodora* (G. Remaudiere).

***MACROSIPHUM* Passerini, 1860**

Macrosiphum cholodkovskyi (Mordvilko, 1909)

Yayılışı - Avrupa ve Trans-Kafkasya.

Türkiye'de - Bolu: Abant 18.7.1962 N. Tuatay ve C. Smith (Tuatay et Remaudiere, 1964).

Konukçuları - *Bupleurum* (tavşankulağı), *Galium* (yoğurtotu), *Ulmaria palustris*, *U. filipendula* ve *Valeriana* (kediotu).

Türkiye'de - *U. filipendula* (N. Tuatay ve C. Smith).

Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878)

Yayılışı - Avrupa, Amerika, Kwinsland, Güney Avustralya, Tasmanya, Viktorya, Yeni Zellanda, Bermuda, Jamaika, Brezilya, Kolombiya, Japonya, Seylan ve Madagaskar.

Türkiye'de - İstanbul 10.5.1955, 11.1.1961 ve 20.2.1961; Ankara 8.7.1961 N. Tuatay (Tuatay et Remaudiere, 1964). İzmir: Bornova Merkez 25.5.1966, 26.6.1968 ve 24.4.1973 (Giray, 1974). İstanbul: Bahçeköy 110 m 26.5.1965 (Çanakçıoğlu, 1975). Ankara 16.5.1939 ? F.S. Bodenheimer. Ankara: Merkez 15.6.1963, 10.9.1965, 16.6.1966 ve 12.8.1970; İstanbul: Merkez 5.9.1956 ve 20.2.1961; Erzurum: Tortum 9.7.1970 ve Amasya: Merkez Suluöz 24.6.1971 N. Tuatay. Sakarya: Arifiye 10.3.1961 M. Göbelez. İzmir: Ödemiş Gölcük 4.10.1962 M. Orhan. İstanbul: Göztepe 24.8.1964 U. Ataman, İstanbul 7.6.1968, Emirgan 9.4.1968 ve 2.5.1968, Erenköy 6.5.1968; Sakarya: Arifiye 6.6.1973, Tavukla 8.6.1973 Ş. Sahtiyancı. Ankara: Sincan 29.6.1971 S. Çalışkaner.

Konukçuları - Dicotyledon ve Monocotyledon'lar, ender olarak Gramineae veya Cyperaceae.

Türkiye'de - *Cucumis melo* (kavun), *Lactuca* (marul), *Primula* ve *Solanum lycopersicum* (domates) (Tuatay et Remaudiere, 1964). *Cucurbita pepo* (kabak),

Sanguisorba minor (küçük çayırdüğümesi) ve *Sesamum indicum* (susam) (Giray, 1974). *Euphorbia* sp. (F.S.Bodenheimer). *Capsella bursa pastoris* (çoban çantası), *Primula officinalis* (çuha çiçeği), *Solanum melongena* (patlıcan) (N. Tuatay). *Solanum tuberosum* (patates) (M. Göbelez). *Tulipasp.* (lale) ve bir Graminaea (Ş. Sahtiyancı).

Not: Domates, patates, salatalık, susam v.d. kültür bitkilerinde zarar yapmaktadır.

***Macrosiphum funestum* (Macchiati, 1885)**

Yayılışı - Avrupa, Orta ve Güney Trans-Kafkasya.

Türkiye'de - Bolu: Abant 18.7.1962 N. Tuatay ve C. Smith; Kastamonu-İnebolu yolu 22.7.1964 N. Tuatay (Tuatay et Remaudiere 1964). Giresun: Tirebolu 1.7.1971; Rize: İğdere Yalı Köyü 4.7.1971; Artvin: Seyitler Baharat 9.7.1971 ve Merkez Yukarı Mezreler 10.7.1971 N. Tuatay.

Konukçuları - *Galium* spp. (yoğurtotu), *Rubus* spp. (böğürtlen).

Türkiye'de - *R. fruticosus* ve *Rubus* spp. (N. Tuatay).

***Macrosiphum rosae* (Linnaeus, 1758)**

Yayılışı - Bütün Dünya'da yaygın bir türdür.

Türkiye'de - Türkiye (Düzungüneş ve Tuatay, 1956). Ankara ilk ve sonbahar; İstanbul .4.1943 (Bodenheimer and Swirsky, 1957). İstanbul 4.8.1939; Isparta 25.4.1952 N. Tuatay (Tuatay et al., 1967). İzmir: Bornova Merkez 24.5.1965 (Giray, 1974). İstanbul 5.4.1952, Merkez Bebek 29.6.1966 ve Emirgan 7.6.1968; Ankara Merkez 5.12.1952, 14.12.1960, 5.1.1961 ve Kayaş 5.7.1967; Isparta: Atabey 10.5.1961; Burdur: Bucak 11.5.1961; Çankırı: İlgazdağı 21.7.1964; Giresun: Karalı, 28.6.1971; Trabzon 3.7.1971; Rize 5.7.1971 ve Artvin: Merkez Mersivan 10.7.1971 N. Tuatay. Adana: Kozan 23.4.1962; Isparta 8.5.1962; Sakarya: 18.5.1962 ve 19.5.1962 Y. Sürmeli. Bolu: Abant 18.7.1962 N. Tuatay ve C. Smith. Samsun 23.5.1962 L. Miller. Antalya: 12.6.1963 Y. Türker, Korkuteli 11.6.1963 H. Balçı ve Elmalı 19.6.1963 İsmet. İstanbul: Emirgan 7.6.1968 Ş. Sahtiyancı. İzmir: Bornova 25.5.1972 M. Tunçyürek ve Tire 12.6.1974 F. Cengiz.

Konukçuları - *Dipsacus* (firçaotu), *Knautia*, *Rosa* (gül), ender olarak *Ceum*, *Ilex aquifolium* ve *Scabiosa* spp. (şeytanotu).

Türkiye'de - *Rosa* (Düzungüneş ve Tuatay, 1956) *Scabiosaspp.* ve *Valerianasp.* (kediotu) (N. Tuatay). *Tulipa gesneriana* (Ş. Sahtiyancı). *Fregaria vesca* (çilek) (F. Cengiz).

Not: Güllerin önemli bir zararlısıdır. Genellikle sürgün uçlarında, uç yapraklarının alt yüzlerinde bulunurlar. Yağ güllerinde zaman zaman tomurcuk ve çiçek devresinde yoğunluk yaparlar. Bu devrede zararı çok önemlidir. Güllüklerde yağ veriminin düşmesine ve kalitesinin bozulmasına neden olurlar.

MASONAPHIS Hille Ris Lambers, 1939

Masonaphis dzhibladzeae Shaposhnikov, 1914

Yayılışı - Kuzey Kafkasya ve Trans-Kafkasya.

Türkiye'de - Giresun: Bicik Çamalan 1860 m 13.8.1964 (Çanakçioğlu, 1975). Giresun: Taşhan 28.6.1971 ve 1.7.1971; Trabzon: Arsen 6.7.1971; Artvin: Merkez Yukarı Mezreler Kafkasör 9.7.1971 ve 10.7.1971 N. Tuatay.

Konukçuları - *Rhododendron flaeum* (orman gülü).

Türkiye'de - *R. flaeum* (Çanakçioğlu, 1975). *R. ponticum* ve *Rhododendron* sp. (N. Tuatay).

MEGOURA Buckton, 1876

Megoura viciae Buckton, 1876

Yayılışı - Avrupa, Birleşik Amerika, Orta Asya, Trans-Kafkasya ve Ortadoğu.

Türkiye'de - Ankara (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Trabzon: Araklı 6.7.1971 N. Tuatay.

Konukçuları - *Lathyrus pratensis*, *L. tuberosum*, *Lupinus* spp., *Medicago* (yonca), *Vicia sepium*, *V. sativa* (fıg), *V. faba* (bakla) v.d.

Türkiye'de - *M. sativa* (Bodenheimer and Swirsky, 1957). *Vicia* spp. (N. Tuatay).

METOPEURUM Mordvilko, 1914*

Metopeurum sp.

Türkiye'de - Erzurum: Tortum Dumlu 9.7.1970 N. Tuatay.

Konukçuları - *Fumaria* sp. (şahtere).

METOPOLOPHIUM Mordvilko, 1914

Metopolophium dirhodum (Walker, 1849)

Yayılışı - Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Asya, Trans-Kafkasya, Orta Asya Rusyası ve Ortadoğu.

Türkiye'de - Isparta: Atabey 10.5.1961 N. Tuatay; Bitlis: Ahlat 7.7.1959; Bitlis 11.10.1962 ve Elazığ: 13.10.1962 G. Remaudiere (Tuatay et Remaudiere, 1964). Sakarya: Arifiye 10.3.1961 M. Göbelez. Konya: Gözülü Devlet Üretme Çiftliği 29.11.1962 ve Çankırı: İlgaç Balderen 7.11.1968 N. Tuatay.

Konukçuları - *Agrimonia*, *Avena* (yulaf), *Bromus*, *Calamagrostis*, *Dactylis* (domuz ayırığı), *Elytrigea*, *Festuca*, *Fragaria* (çilek), *Holcus*, *Hordeum*, (arpa), *Clyceria*, *Iris* (süsen), *Phalaris*, *Phleum*, *Poa*, *Rosa* (gül), *Secale* (çavdar), *Sorghum* (darı) *Triticum* (buğday) ve *Zea* (mısır).

Türkiye'de - *Rosa* ve *Triticum* (G. Remaudiere). *Aeglops truncialis* ve teşhis edilemiyen bir bitki (N. Tuatay). *Hordeum* (M. Göbelez).

Not: Toplamalarımız süresinde yoğunluğu gözlenmemiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde zaman zaman tahillarda zarar yaptığı bildirilmektedir.

***MICROLOPHIUM* Mordvilko, 1914**

***Microlophium carnosum* (Buckton, 1876)**

Yayılışı - Avrupa, ? Birleşik Amerika Devletleri, Trans-Kafkasya, Orta Asya Rusya'sı ve Ortadoğu.

Türkiye'de - İstanbul 1913 (Fahringer, 1922) ve Ankara (Bodenheimer and Swirsky, 1957). Bitlis (Tuatay et Remaudiere, 1964). Sakarya: Merkez ve Tekeler 14.5.1971 I. Çakır.

Konukçuları - *Urtica dioica* (ışırghan) ve *U. urens*.

Türkiye'de - *U. dioica* (Bodenheimer and Swirsky, 1964). *Urtica* sp. (I. Çakır).

SUMMARY

APHIDS (HOMOPTERA : APHIDIDAE) OF TURKEY II. APHIDINAE : MACROPSOPHINI (Part II)

This second part of the faunistic list of Turkish aphids comprises 45 species of 18 genera belonging to the tribe Macropsophini. The included genera are *Diuraphis*, *Dysaphis*, *Elatobium*, *Eucarazzia*, *Hayhurstia*, *Hyadaphis*, *Hyperomyzus*, *Liosomaphis*, *Lipaphis*, *Longicaudus*, *Macchiatiella*, *Macrosiphoniella*, *Macrosiphum*, *Masonaphis*, *Megoura*, *Metopolophium*, *Microlophium*. Two genera: *Macchiatiella* del Guercio and *Metopeurum* Mordvilko and 11 species: *Dysaphis foeniculus* (Theobald), *D. lauberti* (Börner), *D. (Pomaphis) aucupariae* (Buckton), *Hyadaphis coriandri* (Das), *Macchiatiella rhamni* (Boyer de Fonscolombe), *Macrosiphoniella abrotani* (Walker), *M. absinthii* (L.), *M. pulvera* (Walker), *M. subaequalis* Börner, *M. tanacetaria* (Kaltenbach) and *Metopeurum* sp. are new records for Turkey which are marked with asterisk (*). Distributions in world and Turkey, host plants and a short note on the economical importance of each species were given.

LITERATÜR

- ACATAY, A., 1943. İstanbul Çevresi ve bilhassa Belgrad Ormanındaki zararlı orman böcekleri, müca-deleleri ve işletme üzerindeki tesirleri. Y.Z.E. Çalışmalarından, Sayı: 142, Ankara.
- BODENHEIMER, F.S. and E. SWIRSKY, 1957. The Aphidoidea of the Middle East. The Weizmann Sciens Press of Israel, Jerusalem.
- BÖRNER, C. und K. HEINZE, 1957. "Aphidina Aphidoidea". Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Band V, 402, Editor: P. Sorauer. Paul Paray, Berlin.
- ÇANAKÇIOĞLU, H., 1966. Türkiye'de orman ağaçlarına arız olan bitki bitleri (Aphidoidea) üzerinde araş-tırmalar. İstanbul Univ. Orman Fakültesi Dergisi, Seri, **16 (2)**: 131-190.
- _____, 1975. The Aphidoidea of Turkey. İstanbul Univ. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1751/189.
- DÜZGÜNEŞ, Z. ve N. TUATAY, 1956. Türkiye Aphidleri. Ziraat Vekaleti, Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü, Sayı 4/63.
- EASTOP, V.F., 1966. A taxonomic study of Australian Aphidoidea (Homoptera). Australian Jour. Zool., **14**: 339-592.
- _____, 1972. A taxonomic review of the species of *Cinara* Curtis occurring in Britain (Hemiptera: Aphidi-dae). Bull. of the British Museum (N.H.) Entomology, **27 (2)**, London.
- FAHRINGER, J., 1922. Eine Rhynchotenausbeute aus der Türkei. Konowia, **1**:305
- GİRAY, H., 1974. İzmir ili çevresinde Aphididae (Homoptera) familyası türlerine ait ilk liste ile bunların ko-nukçu ve zarar şekilleri hakkında notlar. Ege Univ. Ziraat Fakültesi Dergisi, **11(1)**:39-69.
- REMAUDIERE, G. et N. TUATAY, 1963. Un *Macrosiphoniella*(sg. *Paczoskia*) Nevsky Nouveaus de la Tur-quie (Hom. Aphidoidea). Rev. Path. Veg. Ent. Agr. France, **42 (4)** : 245-251.
- SHAPOSHNIKOV, G. Kh., 1964. Suborder Aphidinea. In Keys to the insects of the European part of the USSR. Editor: G.Ya. Bei-Bienko, Moskov and Leningrad, 496-616.
- STROYAN, H.L.G., 1957. The British species of *Sappaphis* Matsumura. Part I. Introduction and Subgenus *Sappaphis* sensu strica. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. London.
- TUATAY, N., 1988. Türkiye yaprakbitleri (Homoptera: Aphididae). I. Aphidinae: Macropsophini (I. Kısım). Bitki Koruma Bülteni, **28 (1-2)**:1-28.
- _____, et G. REMAUDIERE, 1964. Première contribution au catalogue des Aphididae (Hom.) de la Tur-quie. Rev. Path. Veg. Ent. Agr. Fr., **43(4)** : 243-278.
- _____, S. Güll; A. Demirtola; A. Kalkandelen ve N. Çağatay, 1967. Nebat Koruma Müzesi böcek kataloğu (1961-1966). T.B. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, Ankara.
- _____, A. Kalkandelen ve N. (Çağatay) Aysev, 1972. Nebat Koruma Müzesi böcek kataloğu (1961-1971). T.B. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, Mesleki Kitaplar Serisi, Ankara.