

Otoerotik Asfiksi

ALİ YEMİŞCİGİL^{a)}, HÜSEYİN KARALI^{b)}, BEYHAN EGE^{a,b)}, İ.HAMİT HANCI^{a)},
ŞÜHEYLA ERTÜRK^{a)}

^{a)} Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye

^{b)} Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, İzmir Grup Başkanlığı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ

Asıyla ilgili seksüel perversiyon kavramı ilk kez *Marquis de Sade* tarafından tanımlanmış, 18. yüzyıldan bu yana yapılmış çeşitli yayınlarda konunun çeşitli özellikleri gösterilmeye çalışılmıştır (1). Bu tür asi olguları, çok görülen intihar amaçlı asılardan farklılıklar gösterir (2).

Otoerotik natürdeki asılarda, mazoşistik zevk ya da seksüel uyarı elde etmek için kişinin kendini asması sırasında kazara ölüm oluşmaktadır (3). Her yaştaki kişilerde görülebildiği, ancak olguların çoğunluğunu 12-23 yaş grubundaki erkeklerin oluşturduğu, kızların ise bu yönetime başvurmadıkları bildirilmektedir (3,4).

OLGU BİLDİRİSİ

İntihar amaçlı asi olgusu olduğu belirtilerek otopsi için Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne getirilen, 16 yaşındaki E.A.'ya ait olay yeri keşif ve ölü muayene tutanağı incelendi.


Evindeki banyoda sırtını duvara yaslamış ve ayaklarını öne doğru uzatmış oturur pozisyonunda duran bir erkek cesedinin üzerinde beyaz bir bluz, çiçekli bir etek, sütyen, kadın külotu ve çorabı ile boynunda altın zincir ve sol kolunda bir erkek saati bulunduğu, asi aracı olarak beyaz renkli bir naylon ipin kullanıldığı, ayrıca 2 cm çapındaki bir keçeli kalemin dip kısmına kadar girecek şekilde anüse sokulmuş olduğunun yazılı bulunduğu görüldü.

Yaptığımız muayenede, enli külot lastiğinin beline kemer şeklinde bağlandıktan sonra uzun bırakılan diğer ucun bir bölümünün *glans penis*'e bağlandığı, kalan bölümün çengelli iğneyle kalçası sol yanında cilde tutturulduğu, bu şekilde penisin testisleri ikiye ayırarak arkaya doğru çekildiği görüldü. Önden bakıldığında kadın dış genital organı görünümünü andırıyordu (Resim 1). Anüsteki keçeli kalemin çıkarılışı da Resim 2'de görülmektedir.

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nde 13.5.1991 günü, 1991/71 protokol numarası verilerek yapılan otopsisinde:

Dış muayenede, 170 cm boyunda ve atletik yapıdaki kişinin dudaklarında ve her iki eli tırnak yataklarında siyanoz ile subkonjunktival peteşiyal kanamalar bulunduğu görüldü. Boynunda, çene ile gırtlak arasında, önden arkaya ve aşağıdan yukarı doğru seyreden, 0,5 cm kalınlığında telem vardı. Penis başında ise lastikle sıkılması nedeniyle meydana gelmiş ekimoz tesbit edildi.

İç muayenede, kafatası boşluğu açıldığında beynin ödemli olduğu saptandı. Boyun bölgesinde telemin altına uyan alandaki yumuşak dokularda ekimoz vardı. Hyoid kemik ve tiroid kartilajda kırık yoktu. Göğüs boşluğu açıldığında akciğerlerin ödemli olduğu ve subplevral peteşiyal kanamalar bulunduğu görüldü. Diğer organlarda da asfiksiye bağlı değişiklikler bulundu.



Resim 1. Enli külot lastiğinin özel bir biçimde bağlanarak dış genital organlarda oluşturulan görünüm.



Resim 2. Anüse sokulmuş keçeli kalem.

TARTIŞMA

Yaş, cins ve otopsi bulguları yönünden (3,5) bildirilen diğer olgularla benzerlik gösteren olgumuza ait olay yeri keşif tutanağında, kaynaklarda belirtilen bazı özel görünümünden (duvarlardaki kadın resimleri gibi) söz edilmediği saptandı (3).

Bu tür aktivitelerin büyük bir gizlilik içinde yapıldığı ve şahısların normal cinsel yaşamlarının da bulunduğu söz edilmekteyse de (6,7) olgumuzun kaynaklarda belirtilenin aksine daha önce kadın giysileri kullanıldığı görülerek anne ve babası tarafından uyarıldığı öğrenilmiştir.

Seksüel asfiksini tartışıldığı bir televizyon programından sonra aynı yöntemle meydana gelmiş ölümler bildirilmiştir (6,8), toplum yapısındaki farklılıklar göz önüne alınırsa ülkemizde bu çarpık seksüel tatmin yönteminin kitle iletişim araçları yoluyla öğrenilmesi olanaksızdır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 50 ila 1000 kadar otoerotik asfiksi olgusu saptandığı (6), ayrıca bu olguların anglo-Sakson ve Alman ırklarında, latin ve zenci ırklara oranla daha fazla görüldüğü bildirilmektedir (4). Otopsi yapılan asılar içinde ilk kez rastladığımız olgu, hem seksüel perversiyonu, hem de otoerotik natürde bir ası olması nedeniyle ilginç bulunmuştur.

KAYNAKLAR

- 1 Clark, M.A., Kerr, F.C. (1986) *J. Forensic Sci.*, **31**, 747-755.
- 2 Gordon, I., Shapiro, H.A., Berson, S.D. (1988) in *Forensic Medicine, a Guide to Principles*, pp. 115, 3rd edn, Churchill Livingstone, Edinburgh.
- 3 Simpson, K., Knight, B. (1985) in *Forensic Medicine*, 9th edn, pp. 104-105, Butler- Tahner, London.
- 4 Camps, F.E., Robinson, A.E., Lucas, B.G.B. (1976) in *Gradwohl's Legal Medicine*, 3rd edn, pp. 520-522, John Wright&Sons Ltd., Bristol.
- 5 Luke, J.L., Reay, D.T., Eisele, J.W., Bonell, H.J. (1985) *J. Forensic Sci.*, **30**, 1140-1147.
- 6 O'Halloran, R.L., Lovell, F.W. (1988) *J. Forensic Sci.*, **33**, 1491-1492.
- 7 Watanabe, T. (1968) in *Atlas of Legal Medicine*, pp. 156, J.B.Lippincott Co., Philadelphia.
- 8 Dietz, P.E. (1989) *J. Forensic Sci.*, **34**, 528-530.

Ayrı baskı için:

Prof.Dr. Beyhan Ege
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
Bomova, İzmir, Türkiye