

## Eine neue Art die Untergattung (*Thymapion*) aus der Türkei ( Coleoptera : Curculionidae )

M.S. Bajtenov\* N. Lodos\*\*

### Ö z e t

Türkiye'den *Thymapion* alt cinsine ait yeni bir tür  
(Coleoptera : Curculionidae)

Bu çalışmada Güney Anadolu'da (Gaziantep) yeni bir *Apion* türü bulunarak deskripsiyonu yapılmıştır. Yeni tür *Apion (Thymapion) subconsors* n. sp.'un konukçusu kesin olarak belli değildir. Holotype ve 1 paratype ♀ hâlen Alma-Ata, Bilim Akademisi, Zooloji Enstitüsünde (Rusya); 2 paratype (1♂, 1♀) ise E. Ü. Ziraat Fakültesi, Entomoloji ve Zirai Zooloji Kürsüsünde (İzmir) muhafaza edilmektedir.

*Apion (Thymapion) subconsors* n. sp. (Fig. a-b).

Körper schwarz, Fühlerbasis und Geisselglieder grell-gelb; Oberflaeche mit reichlicher weisser Beharung.

♂. Quere Kopfform mit grossen gewölbten Augen; Stirn zwischen Augen etwas eng an der Rüsselbasis; Rüssel gleich der Laenge Halsschild; regelmässig, nicht stark gebogen, auf Rückenrüssel spaerliche kleine Punkte; Fühler bei Rüsselbasis gelegen; Fühlerbasis dünn, Scapus 2.5 mal laenger als erstes Geisselglied, das 2-4. Glied oval, das 5-6. Glied rund-oval, das 7. Glied rund; Keule kurz-oval, schwarzbraun; Halsschild quer, auf der Seite gewölbt mit Abschnürungen bei Vorder-und Hinterrand, mit zurückziehender Hinter-

\* Institut für Zoologie, Akademie der Wissenschaft, Alma-Ata die Sowjetunion

(UDSSR)

\*\* Landwirtschaftliche Fakultaet, der Universitae Ege, Izmir (Turkei)




Fig. a-b; *Apion subconsors* n. sp. ♂

a: Umriss des Körpers- b: Aedaeagus.

ecke, dicht punktiert; Schildchen rundes dreieck; Flügeldecken oval, an der Basis mit abgerundeten schwieligdicken Schulterbeule, auf Seiten parallelen deutliche Streifen; Zwischenraeume und Seitenbrust stark mit Haare bedeckt; Beine schläng, Vorderschienen rot-braun, Tarsen eng; Penis lanzettenförmig mit enger Spitze, Laenge 1.6-1.7 mm.

♀. Rüssel dünner, laenger; Augen kleiner.

#### Vorliegendes Material :

Holotypus: ♂ Türkei, Gaziantep, Juli, 1971.

Paratypen: 1♂, 2♀ mit denselben Datum und Ort.

Die beschriebene Art steht *Apion consors* Desbr., *A. minutissimum* Rosenthal. und *A. hoffmanni* Wagn. nahe, von diesen unterscheidet sich die grell-gelbe Fühler, andere Halsschild- und Penisbau.

## **Summary**

**A new species of subgenus *Thymapion* from Turkey  
(Coleoptera: Curculionidae)**

*Apion (Thymapion) subconsors* n. sp. is found in Gaziantep and described. The host plant is not known. Type and 1 paratype (♀) specimen deposited at the moment in the Institute of Zoology, Academy of Science, Alma-Ata (USSR); 2 paratypes (1♂, 1♀) are preserved in Izmir (E.U. Faculty of Agriculture, Turkey).