

## Notizen über Apionen (Coleoptera, Curculionidae) in der Türkei

M. S. Bajtenov\*

N. Lodos\*\*

### Summary

#### Notes on some *Apion* species of Turkey (Col., Curculionidae)

In this paper some *Apion* species of which collected in different part of Turkey are given according to the subgeneric systematics. *A. argentatus* and *A. normandi* are new records for Turkey and *A. neorelictum* established as a new synonymy of *A. impressidorsum*.

Waehrend der Bearbeitung der Apionen in der Türkei haben die Autoren eine Reihe von Arten gefunden, deren geographisches vorkommen eine Neuigkeit darstellt. Im folgenden werden einige von ihnen aufgezaehlt, die von zoogeographischem Interesse sind. Eine Art, welche von den Autoren beschrieben wurde, wurde als Synonim angegeben.

#### Subgenus *Lepidapion* Schilsky

*Apion argentatus* Gerstaecker, 1854. *Stettiner Ent. Zeit.*, 15: 258. Typus befindet sich in Berlin (Zoologisches Museum).

Türkei: Çorum (Bayat), 6.8.1979 (N. Lodos).

Die Art ist verbreitet in Algerien, Spanien, Frankreich, Italien. In der Türkei zum erstenmal aufgetreten.

#### Subgenus *Metapion* Schilsky

*Apion normandi* Desbrochers, 1899-1900. *Frelon*, 9: 81. Beschrieben aus Tunis «Teboursouk». Typus befindet sich in Paris (Mus. Nation. d'Hist. Natur).

\* Institut für Zoologie, Akademie der Wissenschaft, Alma-Ata, die Sowjetunion (UdSSR).

\*\* Landwirtschaftliche Fakultaet der Universitaet Ege, Izmir, Türkei.  
Alinş (Received) : 16. 6. 1980

Türkei: Diyarbakır, 22.7.1977 (N. Lodos). Früher war die Art nur in Tunis bekannt (Bajtenov, 1980).

*Apion breiti* Wagner, 1910. *Bull. de la Soc. d. Sc. de Bukarest*, 19 (5): 939. Beschrieben in Rumaenien. Typus befindet sich in München (Museum Frey).

Türkei: Kırklareli (Pınarhisar), auf *Ruta graveolens*, 7.6.1975 (N. Lodos); Tefenni (Burdur), auf *Pimpinella anisum*, 27.6.1963.

Die Art ist verbreitet in Bulgarien (Angelov, 1976), Rumaenien, UdSSR.

Subgenus *Catapion* Schilsky

*Apion cyanellum* Desbrochers, 1895-1896. *Frelon*, 5 (1): 138 (284). Beschrieben im Kaukasus. Typus befindet sich in Paris (Mus. Nation. d'Hist. Natur.).

Türkei: Ağrı Dağı, 6.8.1977, auf Ungraeser; Hakkari, Şemdinli, 12.6.1976; Van, auf *Astragalus* sp., 6.8.1977, (N. Lodos).

Bemerkung: In Katalogus die Kaefer (Wagner, 1942) *A. cyanellum* Desbr. faelschlich zugeordnet zu Subgenus *Synapion* Schilsky. Diesen Fehler wiederholt Ter-Minassian (1972), in dem Artikel über die Apioninen des Kaukasus.

Subgenus *Chlorapion* Wagner

*Apion impressidorsum* Desbrochers - *A. neorelictum* Bajt. and Lodos, 1977, Syn.n. (Bajtenov and Lodos, 1977).

### Özet

#### Türkiye'nin *Apion* türleri üzerine notlar

Bu makalede yurdumuzun farklı yerlerinden toplanan *Apion* türleri alt cinslerine ayrılarak dünyadaki yayılışlarıyla birlikte verilmektedir. Bu arada *A. argentatus* ve *A. normandi* türlerinin yurdumuz için yeni olduğu ayrıca *A. neorelictum* türünün de *A. impressidorsum*'un sinonimi olduğu belirtilmektedir.

### Literatur

- Angelov, P., 1976. Curculinoidea, Coleoptera I Fauna na Bulgaria. Sofya 5: 5 - 355.  
Bajtenov, M.S. and N. Lodos, 1977. A new species of *Apion* Hbst from Turkey  
(Coleoptera: Curculionidae). Ege Üniversitesi Ziraat Fakült. Derg., 14 (3) :  
407 - 411.  
\_\_\_\_\_, 1980. Obzor vidov podroda Metapion Schilsky roda *Apion* Herbst  
(Col. Curculionidae). Entomol obozr., (in press).  
Ter-Minassian, M.E., 1972 : Obzor vidov jukov-dolgonosikov roda *Apion* Herbst  
(Coleoptera, Apionidae) Kavkaza, Entomol. obozr., 4 : 140 - 148.