

Bursa ve Yalova illeri Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde araştırmalar*

A. Yavuz KILIÇ**

Summary

Investigations on Tabanidae (Diptera) Fauna of Bursa and Yalova Provinces of Turkey

This faunistic study carried out in Bursa and Yalova provinces, and 56 Tabanidae species belonging to 3 subfamilies of Tabanidae (Diptera) were determined. 41 of this species, *Silvius alpinus* (Fab.), *Nemorius vitripennis* Meig., *Chrysops caecutiens* (L.), *Atylotus flavoguttatus* (Szil.), *A. loewianus* (Vill.), *Hybomitra bimaculata* (Macq.), *H. Ciureai* (Seg.), *Tabanus armeniacus* Kröb., *T. atropathenicus* Ols., *T. briani* Led., *T. cordiger* Meig., *T. cucus* Szil., *T. eggeri* Schin., *T. fraseri* Aust., *T. glaukopis* Meig., *T. indrae* Haus., *T. leleani* Aust., *T. miki* Brauer, *T. obsoletens* Pand., *T. oppugnator* Aust., *T. paradoxus* Jaenn., *T. portschinskii* Ols., *T. quatuornotatus* Meig., *T. regularis* Jaenn., *T. rupium* Brauer, *T. shannonellus* Kröb., *T. subparadoxus* Ols., *T. sudeticus* Zell., *T. tergestinus* Egger, *T. unifasciatus* Lw., *T. yasujensis* Bogatschev & Samedov, *Haematopota italica* Meig., *H. longantennata* Ols., *H. ocelligera* Kröb., *H. pallens* Lw., *H. pandazisi* Kröb., *H. pluvialis* (L.), *H. subcylindrica* Pand., *Dasyramphis carbonarius* (Meig.), *D. umbrinus* (Meig.) and *Philipomyia graeca* (Fab.) are new records for this area. Here, the seasonal activities in connection with the collection dates and habitats of the species were given along with their distribution in the study area.

Key words: Tabanidae, Diptera, Bursa, Yalova, Turkey

Anahtar sözcükler: Tabanidae, Diptera, Bursa, Yalova, Türkiye

Giriş

Günümüze kadar Türkiye Tabanidae familyasına ait 161 tür ve 12 alt tür tespit edilmiştir (Yağcı & Dinçer, 1996; Kılıç, 1999a, 2001c; Hayat & Schacht, 2000). Trakya ve Marmara Bölgesinin Tabanidae faunası büyük ölçüde ortaya konmuş

* Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.

** Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir
e-mail: aykilic@anadolu.edu.tr

Alınış (Received): .29.05.2003

olmasına karşılık (Kılıç, 1996, 1999b, 2001a, b), Bursa ilinden bildirilen Tabanidae türü sayısı **Pangonius (Melanopangonius) haustellatus**, **P. (s. str.) fulvipes**, **P. (s. str.) pyritosus**, **P. (s. str.) variegatus**, **Chrysops (s.str.) flavipes**, **Atylotus fulvus**, **Hybomitra muehlfeldi**, **Tabanus autumnalis**, **T. bifarius**, **T. bromius**, **T. exclusus**, **T. lunatus**, **T. prometheus**, **T. spodopterus**, **T. tinctus**, **T. unifasciatus**, **Philipomyia aprica** olmak üzere 17 (Loew, 1859; Brauer, 1880; Szilady, 1914, 1923; Kröber, 1921; Enderlein, 1925, 1932; Leclercq, 1966a, 1966b, 1967a, 1967b, Olsufjev et al., 1967); Yalova'dan bildirilen tür sayısı ise **Tabanus bromius** olmak üzere sadece 1'dir (Leclercq, 1967a). Bu nedenle daha önceki çalışmaları tamamlayıcı nitelikte olan ve Anadolu ile Avrupa arasında önemli göç yolları üzerinde bulunan Bursa ve Yalova illerinin Tabanidae faunası bu çalışmaya saptanmaya çalışılmıştır.

Belirlenen türlerin bu illerdeki coğrafik yayılışlarının yanında, habitat özellikleri ve mevsimsel aktiviteleri ile ilgili kısa bilgiler de verilmiştir.

Materiyal ve Metot

Çalışma bölgesi $28^{\circ} 10' 30''$ 00' kuzey enlemleri ile $39^{\circ} 35' 40''$ 40' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Çalışmada Haziran-Ağustos 1996, 1997, Mayıs-Eylül 1998, Mayıs 1999 ve Mayıs, Temmuz 2000 aylarında 2300 ergin örnek toplanmıştır. Örnekler, değişik yükseltili alanlardan arazide kurulan Malezya tipi tuzakla ve çalışma bölgelerinde rastlanan at, eşek, katır, sığır gibi evcil büyükbaş hayvanların üzerinden mevsime ve gün uzunluğuna bağlı olarak 10.00-19.00 saatleri arasında yakalanmıştır.

Tespit edilen türlerin Türkiye'deki yayılışı daha önceki çalışmalarda Kılıç (1999a) ve Hayat & Schacht (2000) tarafından verildiğinden burada tekrarlanmıştır. Örnekler Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü koleksiyonlarında bulunmaktadır.

Kısaltmalar: B.: Beldesi; K.: Köyü; Mrk.: Merkez.

Bulgular

Altfamilya: **Pangoninae**

Tribus: Pangoniini

1. *Pangonius (s. str.) pyritosus* Loew, 1859

Bursa: Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 1 ♂.

Altfamilya: **Chrysopsinae**

Tribus: Chrysopsini

2. *Silvius (s. str.) alpinus* (Fabricius, 1805)

Bursa: İnegöl (Hamzabey K.): 280 m., 22.5.1999, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 1 ♀.

3. *Nemorius vitripennis* (Meigen, 1820)

Bursa: Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 3 ♀♀.

4. *Chrysops (s. str.) caecutiens* (Linnaeus, 1761)

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 2 ♀♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 2 ♀♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 8.8.1996, 1 ♀; 4.9.1998, 1 ♀; İnegöl (Kinik K.): 400 m., 28.6.1997, 2 ♀♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1300 m., 25.7.2000, 4 ♀♀; Keles (Gököz K.): 1100 m., 29.6.1997, 3 ♀♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 29.6.1997, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Karaköy K.): 950 m., 3.9.1998, 1 ♀; Orhaneli (Mrk.): 600 m., 9.7.1997, 1 ♀; Orhaneli (Nalınlar K.): 650 m., 19.8.1998, 1 ♀; 2.9.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 1 ♀; **Yalova:** Çınarcık (Teşvikiye K.): 100 m., 18.8.1998, 1 ♀.

5. *Chrysops (s.str.) flavipes* Meigen, 1804

Bursa: Mrk.(Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Gölcük K.): 100 m., 19.6.1998, 2 ♀♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 1 ♀; Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 10 ♀♀; Harmancık (Mrk.): 700 m., 9.7.1997, 1 ♀; İnegöl (Kinik K.): 200 m., 22.5.1999, 1 ♀; İnegöl (Rüştiye K.): 700 m., 30.6.1996, 1 ♀; Keles (Sarıyar K.): 1000 m., 25.7.1996, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Karaköy K.): 950 m., 3.9.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Mrk.): 200 m., 19.5.1997, 1 ♀; Orhaneli (Nalınlar K.): 450 m., 2.9.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m. 2.8.1996, 1 ♀; Yenişehir (Selimiye K.): 250 m., 2.8.1998, 1 ♀.

Altfamilya: Tabaninae

Tribus: Tabanini

6. *Atylotus fulvus* (Meigen, 1820)

Bursa: Mrk. (Soğukpınar K.): 980 m., 19.7.1998, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀.

7. *Atylotus loewianus* (Villeneue, 1920)

Bursa: Mrk. (Büyükdeliler K.): 920 m., 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 700 m., 29.6.1997, 1 ♀; 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Dağakça K.): 600 m., 18.7.1998, 2 ♀♀; Mrk. (Doğancı K.): 250 m., 19.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Gölcük K.): 100 m., 2.8.1998, 1 ♀; Gemlik (Umurbey K.): 150 m., 18.8.1998, 6 ♀♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 6 ♀♀; İnegöl (Kinik K.): 400 m., 30.8.1997, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1300 m., 25.7.2000, 1 ♀; İznik (Mrk.): 20 m., 27.5.1999 3 ♀♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 20.8.1998, 1 ♀; Kestel (Kozluören K.): 500 m., 20.8.1998, 6 ♀♀; Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 2 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Kadirçeşme K.): 250 m., 1.8.1998, 1 ♀; Yenişehir (Selimiye K.): 250 m., 2.8.1998, 4 ♀♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 1 ♀; Orhangazi (Mrk.): 100 m., 19.7.1998, 1 ♀; **Yalova:** Armutlu (Mrk.): 20 m., 17.8.1998, 1 ♀; Çınarcık (Teşvikiye K.): 50 m., 19.7.1998,

5 ♀♀; 17.8.1998, 13 ♀; Mrk. (Üverpınar K.): 10 m., 19.7.1998, 6 ♀♀; Mrk. (Sugören K.): 100 m., 1.8.1998, 3 ♀♀.

8. *Hybomitra bimaculata* (Macquart, 1826)

Bursa: Mrk. (Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 1 ♀.

9. *Hybomitra caucasica* Szilady, 1923

Yalova: Karamürsel (Kızderbent B.): 10 m., 27.5.2000, 1 ♀.

10. *Hybomitra ciureai* (Seguy, 1937)

Bursa: Karacabey (Ekmekçi K.): 50 m., 27.8.1997, 1 ♀; İznik (Boyalıca K.): 50 m., 19.7.1998, 1 ♀; Orhangazi (Çakırlı K.): 50 m., 19.7.1998, 1 ♀; **Yalova:** Armutlu: 20 m., 17.8.1998, 1 ♀; Çınarcık (Teşvikiye K.): 50 m., 17.8.1998, 1 ♀; Yalova (Üverpınar K.): 10 m., 19.7.1998, 1 ♀.

11. *Tabanus armeniacus* Kröber, 1928

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 700 m., 2.8.1996, 1 ♀; 29.6.1997, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; İnegöl (Rüştîye K.): 700 m., 30.6.1996, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 2 ♀♀; 1300 m., 25.7.2000, 2 ♀♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 3 ♀♀; **Yalova:** Çınarcık (Teşvikiye K.): 100 m., 17.8.1998, 1 ♀.

12. *Tabanus atropathenicus* Olsufjev, 1937

Bursa: Mrk. (Seferişiklar K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀.

13. *Tabanus autumnalis* Linnaeus, 1761

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 700 m., 29.6.1997, 1 ♀; İnegöl (Ulaca K.): 300 m., 22.5.1999, 2 ♀♀; İznik (Beşevler K.): 50 m., 27.5.2000, 1 ♀; Karacabey (Mrk.): 50 m., 1.8.1998, 1 ♀; Yenişehir (Alaylı K.): 400 m., 16.8.1998, 1 ♀; Yenişehir (Çayırlı K.): 250 m., 2.8.1998, 1 ♀; Yenişehir (Selimiye K.): 250 m., 2.8.1998, 1 ♀.

14. *Tabanus bifarius* Loew, 1858

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 700 m., 29.6.1997, 3 ♀♀; Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 5 ♀♀; Mrk. (Erdoğan K.): 220 m., 19.6.1998, 6 ♀♀; Mrk. (Gölcük K.): 100 m., 19.6.1998, 3 ♀♀; Mrk. (Gündoğdu K.): 450 m., 28.6.1997, 2 ♀♀; Mrk. (Seferişiklar K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 6 ♀♀; Mrk. (Tuzaklı K.): 450 m., 29.6.1997, 4 ♀♀; Büyükorhan (Celepler K.): 760 m., 9.7.1997, 1 ♀; Gemlik (Mrk.): 10 m., 28.6.1997, 2 ♀♀; Harmancık (Mrk.): 700 m., 9.7.1997, 1 ♀; İnegöl (Kınık K.): 200 m., 22.5.1999, 3 ♀♀; İnegöl (Rüştîye K.): 700 m., 30.6.1996, 9 ♀♀; İnegöl (Ulaca K.): 300 m., 22.5.1999, 5 ♀♀; İznik (Beşevler K.): 50 m., 27.5.2000, 10 ♀♀; İznik (Mrk.): 50 m., 28.6.1997, 13 ♀♀; Orhangazi (Paşapınar K.): 150 m., 28.6.1997, 2 ♀♀; İnegöl (Kınık K.): 400 m., 28.6.1997, 18 ♀♀; Keles (Gököz K.): 1100 m., 29.6.1997, 4 ♀♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 29.6.1997, 4 ♀♀; Orhaneli (Mrk.): 600 m., 9.7.1997, 1 ♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 22 ♀♀; Yenişehir (Mrk.): 350 m., 28.6.1997, 4 ♀♀; **Yalova:** Armutlu (Mrk.): 20 m., 28.6.1997, 3 ♀♀; Çınarcık

(Teşvikiye K.): 50 m., 28.6.1997, 5 ♀; Karamürsel (Kızderbent B.): 10 m., 27.5.2000, 1 ♀.

15. *Tabanus briani* Leclercq, 1962

Bursa: Harmancık (Mrk.): 750 m., 8.8.1996, 1 ♀; 9.7.1997, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 1 ♀.

16. *Tabanus bromius* Linnaeus, 1761

Bursa: Mrk. (Bağlı K.): 1170 m., 18.7.1998, 4 ♀; Mrk. (Büyükdelerler K.): 920 m., 2.8.1996, 23 ♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 700 m., 2.8.1996, 48 ♀; 29.6.1997, 3 ♀; Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 3 ♀; Mrk. (Erdoğan K.): 220 m., 19.6.1998, 1 ♀; Mrk. (Güneybudaklar K.): 750 m., 20.8.1998, 4 ♀; Mrk. (Seferişikler K.): 600 m., 18.7.1998, 26 ♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 6 ♀; 19.7.1998, 18 ♀; 20.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Uludağ-Millipark.): 1400 m., 29.6.1997, 1 ♀; Büyükorhan (Zaferiye K.): 1000 m., 2.9.1998, 2 ♀; Gemlik (Mrk.): 10 m., 28.6.1997, 2 ♀; Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 2 ♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 3.7.1996, 6 ♀; 4.9.1998, 2 ♀; 8.8.1996, 13 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 52 ♀; 1 ♂; 2.9.1998, 2 ♀; İnegöl (Kınık K.): 400 m., 28.6.1997, 7 ♀; 30.8.1997, 2 ♀; İnegöl (Rüştîye K.): 700 m., 30.6.1996, 50 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 8 ♀; 1300 m., 25.7.2000, 7 ♀; İznik (Bayındır K.): 250 m., 16.8.1998, 2 ♀; İznik (Mrk.): 50 m., 28.6.1997, 8 ♀; 22.5.1999, 1 ♀; 27.5.1999, 1 ♀; Karacabey (Ekmekçi K.): 50 m., 27.8.1997, 1 ♀; Karacabey (Hürriyet K.): 50 m., 1.8.1998, 1 ♀; Karacabey (Mrk.): 20 m., 1.7.1997 1 ♀; Keles (Mrk.): 1200 m., 25.7.1996, 1 ♀; 29.6.1997, 2 ♀; 20.8.1998, 1 ♀; Kestel (Kozluören K.): 500 m., 20.8.1998, 1 ♀; Keles (Sarıyar K.): 1000 m., 25.7.1996, 3 ♀; Mudanya (Esence K.): 100 m., 1.8.1998, 2 ♀; Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 2 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 6 ♀; Mustafakemalpaşa (Kadirçeşme K.): 250 m., 1.8.1998, 11 ♀; Mustafakemalpaşa (Karaköy K.): 950 m., 3.9.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Mrk.): 400 m., 1.7.1997, 3 ♀; Orhangazi (Paşapınar K.): 150 m., 28.6.1997, 2 ♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 4 ♀; Orhaneli (Mrk.): 600 m., 9.7.1997, 7 ♀; 19.8.1998, 4 ♀; Orhaneli (Nalınlar K.): 450 m., 19.8.1998, 4 ♀; 2.9.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 6 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m. 2.8.1996, 3 ♀; 300 m., 19.8.1998, 7 ♀; Yenişehir (Alaylı K.): 400 m., 16.8.1998, 3 ♀; Yenişehir (Çayırlı K.): 250 m., 2.8.1998, 5 ♀; 31.8.1998, 2 ♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 12 ♀; Yenişehir (Mrk.): 350 m., 28.6.1997, 4 ♀; Yenişehir (Selimiye K.): 250 m., 2.8.1998, 9 ♀; **Yalova:** Armutlu (Mrk.): 20 m., 19.7.1998, 2 ♀; 1.9.1998, 1 ♀; Çınarcık (Teşvikiye K.): 5 m., 19.7.1998, 2 ♀; 50 m., 17.8.1998, 2 ♀; 31.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Kurtköy K.): 200 m., 31.8.1998 1 ♀; Mrk. (Üverpınar K.): 10 m., 19.7.1998, 9 ♀.

17. *Tabanus cordiger* Meigen, 1820

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 700 m., 29.6.1997, 1 ♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 2 ♀; İnegöl (Rüştîye K.): 700 m. 30.6.1996, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 3 ♀; 1300 m., 25.7.2000, 1 ♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 29.6.1997, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 1 ♀.

18. *Tabanus cululus* Szilady, 1923

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 2 ♀♀; Keles (Sarıyar K.): 1000 m., 25.7.1996, 5 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 1 ♀; Orhaneli (Mrk.): 450 m., 19.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 7 ♀♀.

19. *Tabanus eggeri* Schineri, 1868

Bursa: Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 1 ♀; Mudanya (Esence K.): 100 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Hacıalı K.): 400 m., 26.7.1996, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Kadirçeşme K.): 250 m., 1.8.1998, 1 ♀; Yenişehir (Selimiye K.): 250 m., 2.8.1998, 1 ♀; **Yalova:** Çınarcık (Teşvikiye K.): 5 m., 19.7.1998, 2 ♀♀; Mrk. (Sugören K.): 100 m., 1.8.1998, 2 ♀♀; Mrk. (Üverpınar K.): 10 m., 19.7.1998, 1 ♀.

20. *Tabanus exclusus* Pandelle, 1883

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 47 ♀♀; 1000 m., 2.9.1998, 1 ♀; Mrk. (Dağakça K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Mrk. (Doğancı K.): 200 m., 19.8.1998, 1 ♂; Mrk. (Güneybudaklar K.): 750 m., 20.8.1998, 3 ♀♀; Mrk. (Seferişiklar K.): 600 m., 18.7.1998, 2 ♀♀; 20.8.1998, 3 ♀♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 980 m., 19.7.1998, 7 ♀♀; 20.8.1998, 5 ♀♀; Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 1 ♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 3.7.1996, 1 ♀; 8.8.1996, 60 ♀♀; 4.9.1998, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1300 m., 25.7.2000, 3 ♀♀; Keles (Baraklı K.): 1000 m., 2.9.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 4 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 18 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Kadirçeşme K.): 250 m., 1.8.1998, 2 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Karaköy K.): 950 m., 3.9.1998, 1 ♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 2 ♀♀; Orhaneli (Mrk.): 450 m., 19.8.1998, 4 ♀♀; Orhaneli (Nalınlar K.): 450 m., 19.8.1998, 6 ♀♀; 2.9.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 13 ♀♀; 300 m., 19.8.1998, 1 ♀; Yenişehir (Selimiye K.): 250 m., 2.8.1998, 2 ♀♀; **Yalova:** Çınarcık (Teşvikiye K.): 100 m., 18.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Sugören K.): 100 m., 1.8.1998, 1 ♀.

21. *Tabanus fraseri* Austen, 1925

Bursa: Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 3 ♀♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; 2.9.1998, 1 ♀; İnegöl (Kınık K.): 400 m., 30.8.1997, 3 ♀♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 20.8.1998, 1 ♀; Kestel (Kozluören K.): 500 m., 20.8.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Kadirçeşme K.): 250 m., 1.8.1998, 1 ♀; **Yalova:** Armutlu: 20 m., 17.8.1998, 2 ♀♀; Çınarcık (Teşvikiye K.): 50 m., 17.8.1998, 7 ♀♀; 100 m. 31.8.1998, 2 ♀♀.

22. *Tabanus glaucopis* Meigen, 1936

Bursa: Mrk. (Bağlı K.): 1170 m., 18.7.1998, 14 ♀♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 3 ♀♀; Mrk. (Dağakça K.): 600 m., 18.7.1998, 2 ♀♀; Mrk. (Seferişiklar K.): 600 m., 20.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 980 m., 19.7.1998, 30 ♀♀; 20.8.1998, 1 ♀; Büyükorhan (Zaferiye K.): 1000 m., 2.9.1998,

2 ♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 8.8.1996, 1 ♀; 4.9.1998, 2 ♀; Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 3 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; 2.9.1998, 3 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1300 m., 25.7.2000, 124 ♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 20.8.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 7 ♀; Mustafakemalpaşa (Karaköy K.): 950 m., 3.9.1998, 1 ♀; Orhaneli (Karınçalı K.): 450 m., 18.7.1998, 2 ♀; Orhaneli (Nalınlar K.): 450 m., 19.8.1998, 1 ♀; 2.9.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 300 m., 19.8.1998, 1 ♀.

23. *Tabanus indrae* Hauser, 1939

Bursa: Harmancık (Mrk.): 750 m., 8.8.1996 2 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 4 ♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 2 ♀; Orhaneli (Nalınlar.): 450 m., 19.8.1998, 2 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 5 ♀; Yenişehir (Alaylı K.): 400 m., 16.8.1998, 1 ♀; **Yalova:** Karamürsel (Kızderbent B.): 10 m., 27.5.2000, 1 ♀.

24. *Tabanus leleani* Austen, 1920

Bursa: Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 1 ♀; İznik (Mrk.): 550 m., 28.6.1997, 1 ♀; Yenişehir (Çayırlı K.): 250 m., 2.8.1998, 1 ♀; 31.8.1998, 1 ♂; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 1 ♀; **Yalova:** Armutlu (Mrk.): 20 m., 1 ♀; Çınarcık (Teşvikiye K.): 50 m., 17.8.1998, 1 ♀.

25. *Tabanus lunatus* Fabricius, 1794

Bursa: Mrk. (Büyükdeliler K.): 920 m., 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 11 ♀; 700 m., 29.6.1997, 1 ♀; Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 2 ♀; 200 m., 19.8.1998, 2 ♀; Mrk. (Gündoğdu K.): 450 m., 28.6.1997, 2 ♀; Mrk. (Seferişiklar K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Mrk. (Uludağ-Sogukpinar K.): 1050 m., 29.6.1997, 8 ♀; 980 m., 19.7.1998, 10 ♀; Büyükorhan (Danacılar K.): 1050 m., 18.7.1998, 3 ♀; Büyükorhan (Zaferiye K.): 1000 m., 2.9.1998, 1 ♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 3.7.1996, 5 ♀; 8.8.1996, 13 ♀; 9.7.1997, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 5 ♀; İnegöl (Hamzabey K.): 280 m., 22.5.1999, 6 ♀; İnegöl (Rüştîye K.): 700 m., 30.6.1996, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 1 ♀; 1300 m., 25.7.2000, 1 ♀; İznik (Mrk.): 550 m., 28.6.1997, 3 ♀; Keles (Gököz K.): 1100 m., 29.6.1997, 1 ♀; Keles (Sarıyar K.): 1000 m., 25.7.1996, 2 ♀; Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 3 ♂; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 6 ♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 2 ♀; Orhaneli (Karınçalı K.): 450 m., 18.7.1998, 2 ♀; Orhaneli (Mrk.): 600 m., 9.7.1997, 5 ♀; 450 m., 19.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 10 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; Yenişehir (Alaylı K.): 400 m., 16.8.1998, 1 ♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 8 ♀; Yenişehir (Mrk.): 350 m., 28.6.1997, 6 ♀; **Yalova:** Armutlu (Mrk.): 20 m., 1 ♀; Çınarcık (Teşvikiye K.): 50 m., 17.8.1998, 2 ♀.

26. *Tabanus maculicornis* Zetterstedt, 1842

Bursa: İnegöl (Tahtaköprü B.): 1300 m., 25.7.2000, 11 ♀; İznik (Mrk.): 150 m., 28.6.1997, 2 ♀; Orhangazi (Paşapınar K.): 150 m., 1 ♀.

27. *Tabanus miki* Brauer, 1880

Bursa: Mrk. (Büyükdeliler K.): 920 m., 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 5 ♀♀; 700 m., 29.6.1997, 1 ♀; Mrk. (Dağakça K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 6 ♀♀; Mrk. (Seferişiklar K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 980 m., 19.7.1998, 1 ♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 3.7.1996, 2 ♀♀; 8.8.1996, 2 ♀♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 19 ♀♀; İnegöl (Kinik K.): 400 m., 28.6.1997, 1 ♀; İnegöl (Rüştiye K.): 700 m., 30.6.1996, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 2 ♀♀; 1300 m., 25.7.2000, 4 ♀♀; Keles (Gököz K.): 1100 m., 29.6.1997, 1 ♀; Keles (Sarıyar K.): 1000 m., 25.7.1996, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 1 ♀; İznik (Mrk.): 550 m., 28.6.1997, 1 ♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 4 ♀♀; Orhaneli (Mrk.): 600 m., 9.7.1997, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 5 ♀♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 7 ♀♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 1 ♀; Yenişehir (Mrk.): 350 m., 28.6.1997, 1 ♀; **Yalova:** Çınarcık (Teşvikiye K.): 100 m., 18.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Sugören K.): 100 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Üverpınar K.): 10 m., 19.7.1998, 2 ♀♀.

28. *Tabanus obsoletescens* Pandelle, 1883

Bursa: Mrk. (Büyükdeliler K.): 920 m., 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; 600 m., 2.9.1998, 2 ♀♀; Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 12 ♀♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 8.8.1996, 2 ♀♀; 4.9.1998, 2 ♀♀; Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Karaköy K.): 950 m., 3.9.1998, 3 ♀♀; Orhaneli (Akalan K.): 700 m., 19.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Nahınlar K.): 450 m., 100 m., 19.8.1998, 4 ♀♀; 2.9.1998, 11 ♀♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 300 m., 19.8.1998, 1 ♀.

29. *Tabanus oppugnator* (Austen, 1923)

Bursa: Mrk. (Tuzaklı K.): 450 m., 29.6.1997, 1 ♀; İnegöl (Ulaca K.): 300 m., 22.5.1999, 1 ♀.

30. *Tabanus paradoxus* Jaennicke, 1866

Bursa: Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 1 ♀.

31. *Tabanus portschinskii* Olsufjev, 1937

Bursa: Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 2 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 3 ♀♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 7 ♀♀.

32. *Tabanus prometheus* Szilady, 1923

Bursa: Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 2 ♀♀.

33. *Tabanus quatuornotatus* Meigen, 1820

Bursa: İnegöl (Rüştiye K.): 700 m. 30.6.1996, 1 ♀; 430 m., 22.5.1999, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 2 ♀♀; İznik (Mrk.): 550 m.,

28.6.1997, 3 ♀♀; Keles (Gököz K.): 1100 m., 29.6.1997, 5 ♀♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 29.6.1997, 7 ♀♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 4 ♀♀.

34. *Tabanus regularis* Jaennicke, 1866

Bursa: Harmancık (Mrk.): 750 m., 8.8.1996, 3 ♀♀; İnegöl (Rüştisiye K.), 700 m., 30.6.1996, 1 ♀; Karacabey (Hürriyet K.): 50 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Hacıali K.): 400 m., 26.7.1996, 1 ♀; Orhaneli (Mrk.): 450 m., 19.8.1998, 3 ♀♀; Orhaneli (Nalınlar K.): 450 m., 19.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; Yenişehir (Alaylı K.): 400 m., 16.8.1998, 1 ♀; Yenişehir (Selimiye K.): 250 m., 2.8.1998, 1 ♀; **Yalova:** Çınarcık (Teşvikiye K.): 5 m., 19.7.1998, 1 ♀.

35. *Tabanus rupium* Brauer, 1880

Bursa: İnegöl (Rüştisiye K.): 280 m., 22.5.1999, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 3 ♀♀; Keles (Sarıyar K.): 1000 m., 25.7.1996, 1 ♀.

36. *Tabanus shannonellus* Kröber, 1936

Bursa: Mrk. (Güneybudaklar K.): 750 m., 20.8.1998, 2 ♀♀.

37. *Tabanus spodopterus* Meigen, 1820

Bursa: Mrk. (Dağakça K.): 600 m., 18.7.1998, 3 ♀♀; Büyükorhan (Zaferiye K.): 1000 m., 2.9.1998, 1 ♀; Mudanya (Esence K.): 100 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 3 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Hacıali K.): 400 m., 26.7.1996, 1 ♀; **Yalova:** Çınarcık (Teşvikiye K.): 5 m., 19.7.1998, 2 ♀♀; Mrk. (Sugören K.): 100 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Üverpınar K.): 10 m., 19.7.1998, 3 ♀♀.

38. *Tabanus subparadoxus* Olsufjev, 1937

Bursa: Mrk. (Büyükdeliler K.): 920 m., 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 980 m., 19.7.1998, 1 ♀.

39. *Tabanus sudeticus* Zeller, 1847

Bursa: İnegöl (Kinik K.): 400 m., 28.6.1997, 5 ♀♀; **Yalova:** Çınarcık (Teşvikiye K.): 5 m., 19.7.1998, 1 ♀; Mrk. (Sugören K.): 100 m., 1.8.1998, 1 ♀.

40. *Tabanus tergestinus* Egger, 1859

Bursa: İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 7 ♀♀; İnegöl (Hilmiye K.): 550 m., 30.8.1997, 1 ♀; İnegöl (Kinik K.): 400 m., 28.6.1997, 3 ♀♀; İnegöl (Rüştisiye K.): 700 m., 30.6.1996, 2 ♀♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 6 ♀♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 2 ♀♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 3 ♀♀; **Yalova:** Mrk. (Sugören K.): 100 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mrk. (Üverpınar K.): 10 m., 19.7.1998, 2 ♀♀.

41. *Tabanus tinctus* Walker, 1850

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 7 ♀♀; Mrk. (Seferiışıklar K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 1 ♀; 980 m.,

19.7.1998, 1 ♀; Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 1 ♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 8.8.1996, 2 ♀♀; Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 2 ♀♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 6 ♀♀; Orhaneli (Koca K.): 650 m., 19.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Mrk.): 450 m., 19.8.1998, 4 ♀♀; Orhaneli (Nalınlar K.): 450 m., 19.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 9 ♀♀.

42. *Tabanus unifasciatus* Loew, 1858

Bursa: Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 1 ♀; Mrk. (Seferiışıklar K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Harmancık (Karaca K.): 850 m., 4.9.1996, 3 ♀♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 3.7.1996, 1 ♀; 8.8.1996, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 2 ♀♀; İznik (Mrk.): 550 m., 28.6.1997, 1 ♀; Keles (Gököz K.): 1100 m., 29.6.1997, 1 ♂; Mudanya (Zeytinbağı B.): 30 m., 1.8.1998, 1 ♀; Mudanya (Esence K.): 100 m., 1.8.1998, 2 ♀♀; Orhaneli (Karıncalı K.): 450 m., 18.7.1998, 1 ♀; Orhaneli (Nalınlar K.): 450 m., 19.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 2 ♀♀; Yenişehir (Mrk.): 350 m., 28.6.1997, 1 ♀.

43. *Tabanus yasujensis* Jezek, 1981

Bursa: Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 1 ♀.

Tribus: Haematopotini

44. *Haematopota crassicornis* Wahlberg, 1848

Bursa: İnegöl (Kinik K.): 200 m., 22.5.1999, 1 ♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1300 m., 25.7.2000, 1 ♀.

45. *Haematopota italica* Meigen, 1804

Bursa: Mrk. (Seferiışıklar K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Harmancık (Mrk.): 700 m., 9.7.1997, 1 ♀; Keles (Pinarcık K.): 950 m., 20.8.1998, 1 ♀; Keles (Sarıyar K.): 1000 m., 25.7.1996, 1 ♀.

46. *Haematopota longantennata* Olsufjev, 1937

Bursa: İnegöl (Kinik K.): 400 m., 28.6.1997, 1 ♀; İnegöl (Rüştîye K.): 700 m., 30.6.1996, 1 ♀; 22.5.1999, 1 ♀; **Yalova:** Karamürsel (Kızderbent B.): 10 m., 27.5.2000, 1 ♀.

47. *Haematopota ocelligera* Kröber, 1922

Bursa: Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 9 ♀♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Gölcük K.): 100 m., 19.6.1998, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; İznik (Mrk.): 550 m., 28.6.1997, 1 ♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 29.6.1997, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 2 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Mrk.): 400 m., 1.7.1997, 1 ♀; Orhaneli (Mrk.): 600 m.,

9.7.1997, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 22 ♀♀; Yenişehir (Mrk.): 350 m., 28.6.1997, 4 ♀♀; Yenişehir (Selimiye K.): 250 m., 2.8.1998, 1 ♀; **Yalova**: Karamürsel (Kızderbent B.): 10 m., 27.5.2000, 1 ♀.

48. *Haematopota pallens* Loew, 1870

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 1 ♀; Harmancık (Mrk.): 750 m., 8.8.1996, 6 ♀♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; Keles (Sariyar K.): 1000 m., 25.7.1996, 3 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Çiviliçam K.): 1000 m., 26.7.1996, 1 ♀; Mustafakemalpaşa (Gündoğdu K.): 600 m., 26.7.1996, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 1 ♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 1 ♀.

49. *Haematopota pandazisi* (Kröber, 1936)

Bursa: Gemlik (Umburbey K.): 150 m., 18.8.1998, 5 ♀♀; İnegöl (Hilmiye K.): 550 m., 30.8.1997, 1 ♀; İnegöl (Kinik K.): 400 m., 30.8.1997, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 195 ♀♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.9.1998, 3 ♀♀; İznik (Bayındır K.): 250 m., 16.8.1998, 2 ♀♀; Kestel (Kozluören K.): 500 m., 20.8.1998, 13 ♀♀; **Yalova**: Armutlu (Mrk.): 20 m., 17.8.1998, 2 ♀♀; 50 m., 1.9.1998, 2 ♀♀; Çınarcık (Teşvikiye K.): 50 m., 17.8.1998, 15 ♀♀; 100 m., 31.8.1998, 18 ♀♀; Mrk. (Güney K.): 250 m., 16.8.1998, 5 ♀♀; Mrk. (Kurtköy K.): 200 m., 16.8.1998, 6 ♀♀; 31.8.1998, 2 ♀♀.

50. *Haematopota pluvialis* (Linnaeus, 1761)

Bursa: Mrk. (Gündoğdu K.): 450 m., 28.6.1997, 1 ♀; Büyükorhan (Celepler K.): 760 m., 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 1 ♀; İnegöl (Rüştive K.): 700 m., 30.6.1996, 2 ♀♀; Kestel (Kozluören K.): 500 m., 20.8.1998, 1 ♀.

51. *Haematopota subcylindrica* Pandelle, 1883

Bursa: Mrk. (Büyükdeliler K.): 920 m., 2.8.1996, 6 ♀♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 2 ♀♀; 700 m., 29.6.1997, 3 ♀♀; Mrk. (Dağakça K.): 600 m., 18.7.1998, 1 ♀; Mrk. (Soğukpinar K.): 1050 m., 29.6.1997, 2 ♀♀; Büyükorhan (Danacılar K.): 1050 m., 18.7.1998, 1 ♀; Harmancık (Mrk.): 700 m., 9.7.1997, 1 ♀; İnegöl (Çayyaka K.): 420 m., 2.8.1998, 4 ♀♀; İnegöl (Kinik K.): 400 m., 28.6.1997, 1 ♀; İnegöl (Rüştive K.): 700 m., 30.6.1996, 2 ♀♀; 430 m., 22.5.1999, 10 ♀♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 3 ♀♀; 25.7.2000, 5 ♀♀; Keles (Gököz K.): 1100 m., 29.6.1997, 2 ♀♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 20.8.1998, 1 ♀; Keles (Pınarcık K.): 950 m., 20.8.1998, 1 ♀; Orhaneli (Yürücekler K.): 530 m., 2.8.1996, 1 ♀; Yenişehir (Çayırlı K.): 250 m., 2.8.1998, 1 ♀; 31.8.1998, 1 ♀; **Yalova**: Karamürsel (Kızderbent B.): 10 m., 27.5.2000, 5 ♀♀.

Tribus: Diachlorini

52. *Dasyramphis anthracinus* (Meigen, 1820)

Bursa: İznik (Mrk.): 50 m., 27.5.2000, 1 ♀.

53. *Dasyramphis carbonarius* (Meigen, 1820)

Bursa: Mrk. (Uludağ-Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 1 ♀; 980 m., 19.7.1998, 1 ♀. Mrk. (Tuzaklı K.): 450 m., 29.6.1997, 1 ♀.

54. *Dasyramphis umbrinus* (Meigen, 1820)

Bursa: Mrk. (Çaybaşı K.): 700 m., 29.6.1997, 1 ♀; Mrk. (Erdoğan K.): 220 m., 19.6.1998, 11 ♀♀; Mrk. (Gündoğdu K.): 450 m., 28.6.1997, 1 ♀; Gemlik (Mrk.): 10 m., 28.6.1997, 2 ♀♀; İnegöl (Hamzabey K.): 280 m., 22.5.1999, 6 ♀♀; İnegöl (Kınık K.): 200 m., 22.5.1999, 4 ♀♀; İnegöl (Rüştîye K.): 700 m., 30.6.1996, 7 ♀♀; İznik (Beşevler K.): 50 m., 27.5.2000, 2 ♀♀; İznik (Mrk.): 50 m., 28.6.1997, 4 ♀♀; 50 m., 27.5.2000, 2 ♀♀; Karacabey (Mrk.): 20 m., 1.7.1997, 4 ♀♀; Keles (Gököz K.): 1100 m., 29.6.1997, 2 ♀♀; Keles (Mrk.): 1100 m., 29.6.1997, 2 ♀♀; Mustafakemalpaşa (Mrk.): 400 m., 1.7.1997, 3 ♀♀; Orhangazi (Paşapınar K.): 150 m., 28.6.1997, 2 ♀♀; Yenişehir (Mecidiye K.): 150 m., 28.6.1997, 3 ♀♀; Yenişehir (Mrk.): 350 m., 28.6.1997, 7 ♀♀; **Yalova:** Karamürsel (Kızderbent B.): 10 m., 27.5.2002, 13 ♀♀.

55. *Philipomyia aprica* (Meigen, 1820)

Bursa: Mrk. (Bağlı K.): 1170 m., 18.7.1998, 10 ♀♀; Mrk. (Çaybaşı K.): 530 m., 2.8.1996, 6 ♀♀; 700 m., 29.6.1997, 9 ♀♀; Mrk. (Dağakça K.): 600 m., 18.7.1998, 4 ♀♀; Mrk. (Doğancı K.): 420 m., 9.7.1997, 9 ♀♀; Mrk. (Seferiışıklar K.): 600 m., 18.7.1998, 11 ♀♀; Mrk. (Soğukpınar K.): 1050 m., 29.6.1997, 15 ♀♀; 980 m., 19.7.1998, 25 ♀♀; Mrk. (Tuzaklı K.): 450 m., 29.6.1997, 2 ♀♀; Mrk. (Uludağ-Millipark.): 1400 m., 29.6.1997, 1 ♂; Büyükorhan (Danaclar K.): 1050 m., 18.7.1998, 1 ♀; Harmancık (Mrk.): 700 m., 9.7.1997, 2 ♀♀; İnegöl (Rüştîye K.): 700 m., 30.6.1996, 1 ♂, 6 ♀♀; İnegöl (Tahtaköprü B.): 1400 m., 7.7.1996, 40 ♀♀; 1300 m., 25.7.2000, 5 ♀♀; Orhaneli (Karincalı K.): 450 m., 18.7.1998, 4 ♀♀; **Yalova:** Mrk. (Sugören K.): 100 m., 1.8.1998, 1 ♀.

56. *Philipomyia graeca* (Fabricius, 1794)

Bursa: Mrk. (Soğukpınar K.): 980 m., 19.7.1998, 2 ♀♀; Harmancık (Mrk.): 700 m., 9.7.1997, 1 ♀; Orhaneli (Yörükler K.): 550 m., 9.7.1997, 5 ♀♀.

Tartışma ve Sonuç

Bursa ve Yalova illeri çevresinden bütünlük göstermeyen ve tüm aktivite periyodunu kapsamayan önceki çalışmalarla toplam 17 Tabanidae türünün bildirildiği konuya ilgili önceki çalışmalarдан anlaşılmaktadır. Bu çalışmaya birlikte bu iller çevresinde belirlenen Tabanidae familyasına bağlı tür sayısı Bursa için 60'a, Yalova için 25'e ulaşmıştır. Bu çalışmada saptanan türlerden *Silvius alpinus*, *Nemorius vitripennis*, *Chrysops caecutiens*, *Atylotus flavoguttatus*, *A. loewianus*, *Hybomitra bimaculata*, *H. ciureai*, *Tabanus armeniacus*, *T. atropathenicus*, *T. briani*, *T. cordiger*, *T. cuculus*, *T. eggeri*, *T. fraseri*, *T. glaucopis*, *T. indrae*, *T. leleani*, *T. miki*, *T. obsoletes*, *T. oppugnator*, *T. paradoxus*, *T. portschinskii*, *T. quatuornotatus*, *T. regularis*, *T. rupium*,

T. shannonellus, *T. subparadoxus*, *T. sudeticus*, *T. tergestinus*, *T. unifasciatus*, *T. yasujensis*, *Haematopota italica*, *H. longantennata*, *H. ocelligera*, *H. pallens*, *H. pandazisi*, *H. pluvialis*, *H. subcylindrica*, *Dasyramphis carbonarius*, *D. umbrinus* ve *Philipomyia graeca* Bursa çevresinden ilk kez bildirilmektedir. Yalova çevresinde saptanan türlerden *Tabanus bromius* dışındaki ise bu il çevresi için yeni kayittır.

Bursa çevresinde önceki çalışmalarla bulunduğu bildirilen türlerden *Pangonius haustellatus* (Fab.), *P. (s. str.) fulvipes* Kröb., *P. variegatus* (Fab.) ve *Hybomitra muehlfeldi* (Brauer) türleri bu çalışmada tespit edilememiştir (Loew, 1859; Brauer, 1880; Kröber, 1921; Szilady, 1923). *Pangonius* cinsi türlerinin dişileri de erkekleri gibi çiçek salgısı ile beslenirler. Bu nedenle *Pangonius* örneklerinin tuzaklarla yakalanma olasılıkları düşüktür. Zira kan emen diğer türlerin dişilerini tuzak yöntemleri ile yakalamak olası iken, *Pangonius* türlerini ancak çiçekler üzerinden atrap vb. ile yakalamak olasıdır ki çalışmada bu yönteme de sık sık başvurulmuştur. Ancak yalnızca bir örnek yakalanabilimiştir. Önceki çalışmaların sonuçları ile birlikte değerlendirdiğinde, bu cinse ait örneklerde son araştırmalarda fazlaca rastlanmaması, beslenme biçimleri nedeniyle "bir çok bölgede habitat bozulmasının, bu türlerin yoğunluğunun azalmasına neden olduğu" düşüncesini akla getirmektedir. Zira yirminci yüzyıl başlarındaki faunistik çalışmalarında *Pangonius* türlerine ait bulgulara sıklıkla rastlanırken, son dönemdeki çalışmalarında aynı sıklıkta rastlanmamaktadır.

Çalışmada tespit edilen türlerin mevsimsel aktiviteleri bu çalışmada yakalandıkları tarihler esas alınarak incelendiğinde, çalışma bölgesinde Mayıs ayı ortalarında aktivitenin başladığı (gün/24 birey), Haziran ayının ikinci yarısından itibaren arttığı (gün/86 birey), Temmuz sonu-Ağustos başında maksimuma ulaşlığı (gün/154 birey), Ağustos ortasından itibaren azaldığı (gün/41 birey) ve Ağustos sonu-Eylül başında ise iyice azalarak sona erdiği (gün/19 birey) görülmektedir.

Aktivitesi tespit edilebilecek sayıda örneklerin yakalandığı türlerden *Chrysops caecutiens*, *C. flavipes*, *Atylotus loewianus*, *Tabanus bromius*, *T. exlusus*, *T. leleani*, *T. lunatus*, *T. miki*, *T. prometheus*, *T. tinctus*, *T. unifasciatus*, *Haematopota subcylindrica*'nın mevsim boyunca aktivite gösterdikleri; *Tabanus bifarius*'nın aktivitesinin bölgede Temmuz ayı ortalarına kadar; *T. fraseri* ve *T. obsoletes*'nın aktivitesinin Temmuz ayı sonlarından Eylül ayı başlarına; *T. glaucopis*'nın Temmuz ayı başında başlayan aktivitesinin mevsim sonuna kadar; *T. quatuornotatus* ve *T. tergestinus*'nın Haziran ve Temmuz aylarında; *Haematopota ocelligera*'nın Haziran ayı ortalarından Temmuz sonuna kadar; *H. pandazisi*'nın Temmuz sonundan aktivite dönemi sonuna kadar sürdüğü; *Dasyramphis* türlerinin erken dönemde (Mayıs-Haziran); *Philipomyia aprica*'nın Haziran ve Temmuz aylarında aktivite gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, araştırma alanına yakın olan Eskişehir ve Bilecik illerinde daha önce yapılmış çalışma sonuçlarından önemli bir farklılık göstermemektedir (Kılıç, 1992, 1996).

Çalışma alanında örneklerin toplandığı toplam 88 lokalitenin % 56'sı orman, % 21'i bahçe-orman, % 18'i bahçe ve % 5'i açık alan özelliği göstermektedir.

Bunun sonucu saptanan türlerin büyük bölümü Meşe (*Quercus* sp.) ve Çam (*Pinus* sp.) ormanlarının bulunduğu alanlardan yakalanmıştır. Saptanan türlerin habitat özellikleri literatürde verilen bilgilere benzerlik göstermekle birlikte (Chvala, et al., 1972) *Nemorius vitripennis*, *Atylotus fulvus*, *Hybomitra bimaculata*, *Tabanus armeniacus*, *T. protschinskii*, *T. tergestinus*, *T. yasujensis*, *Dasyramphis carbonarius* ormanlık; *Atylotus loewianus*, *Hybomitra ciureai*, *Tabanus bifarius*, *T. bromius*, *T. lunatus*, *T. oppugnator*, *T. quatuornotatus* ormanlık, bahçelik ve açık alanlardan; *Tabanus autumnalis* bahçelik ve açık alanlardan; *Tabanus leleani* bahçelik alanlardan, diğer türler ise ormanlık ve bahçelik alanlardan yakalanmışlardır. *Haematopota pandazisi*'nin, özellikle meşe ormanlarının yoğun bulunduğu Yalova (Çınarcık) çevresinde ve Uludağ'ın İnegöl sınırları içinde kalan eteklerindeki alanlarda çok yoğun yayılış gösterdiği gözlenmiştir.

Özet

Bursa ve Yalova illerini kapsayan bu faunistik çalışma ile Tabanidae (Diptera) familyasından 3 altfamilyaya ait 56 tür belirlenmiştir. Bunlardan *Silvius alpinus* (Fab.), *Nemorius vitripennis* Meig., *Chrysops caecutiens* (L.), *Atylotus flavoguttatus* (Szil.), *A. loewianus* (Vill.), *Hybomitra bimaculata* (Macq.), *H. ciureai* (Seg.), *Tabanus armeniacus* Kröb., *T. atropathenicus* Ols., *T. briani* Lecl., *T. cordiger* Meig., *T. cuculus* Szil., *T. eggeri* Schin., *T. fraseri* Aust., *T. glaucopis* Meig., *T. indrae* Haus., *T. leleani* Aust., *T. miki* Brauer, *T. obsoletes* Pand., *T. oppugnator* Aust., *T. paradoxus* Jaenn., *T. portschinskii* Ols., *T. quatuornotatus* Meig., *T. regularis* Jaenn., *T. rupium* Brauer, *T. shannonellus* Kröb., *T. subparadoxus* Ols., *T. sudeticus* Zell., *T. tergestinus* Egger, *T. unifasciatus* Lw., *T. yasujensis* Bogatschev & Samedov, *Haematopota italicica* Meig., *H. longantennata* Ols., *H. ocelligera* Kröb., *H. pallens* Lw., *H. pandazisi* Kröb., *H. pluvialis* (L.), *H. subcylindrica* Pand., *Dasyramphis carbonarius* (Meig.), *D. umbrinus* (Meig.) ve *Philipomyia graeca* (Fab.) olmak üzere 41 tür Bursa ve Yalova illerinden ilk kez bildirilmektedir. Çalışmada türlerin yayılışlarının yanında örneklerin toplanma tarihleri esas alınarak mevsimsel aktiviteleri ve bazı habitat özelliklerine ilişkin bilgiler de verilmiştir.

Teşekkür

Teşhisleri kontrol eden Wolfgang Schacht'a (Münih Zooloji Müzesi-Almanya) ve örnek karşılaştırma olanağı sağlayan Münih Zooloj Müzesi yöneticilerine teşekkür ederim.

Literatur

- Brauer, F., 1880. Die Zweiflugler des Kaiserlichen Museums zu Wien: Denkschr. Kaiserl. Akademie der Wiss. (**Mathem.-Naturwiss Classe**), **42**: 105-216.
- Chvala, M., L. Lyneborg & J. Moucha, 1972. The Horseflies of Europe (Diptera: Tabanidae). Ent. Soc. Copenague, E. W. Classey Ltd. Hampton, 1-502.
- Enderlein, G., 1925. Studien an blutsaugenden Insekten. I. Grundlagen eines neuen systems der Tabanidae. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **11**: 253-409.
- Enderlein, G., 1932. Einige neue palaarktische Tabaniden. **Mitt. D. ent. Ges. Berlin**, **3**: 63-64.
- Hayat R. & W. Schacht, 2000. Distributional data of Horse-flies from Turkey, with new records (Diptera, Tabanidae). **Entomofauna**, **21** (23): 265-284.

- Kılıç, A.Y., 1992. Eskişehir ve çevresi Tabanidae (Diptera) faunasının incelenmesi. **Türk. entomol. derg.**, **16** (3): 169-180.
- Kılıç, A.Y., 1996. Bilecik ili Tabanidae (Diptera) faunası üzerine araştırmalar. **Anadolu Üni. Fen Fak. Derg.**, **1**: 45-57.
- Kılıç, A.Y., 1999a. Checklist of Tabanidae (Diptera) from Turkey. **Türk Zooloji Dergisi**, **23**: 123-132.
- Kılıç, A.Y., 1999b. Trakya Bölgesi Tabanidae (Diptera) Faunası. **Türk Zooloji Dergisi**, **23** (1): 67-89.
- Kılıç, A.Y., 2001a. The Tabanidae (Diptera) Fauna of Balıkesir Province. **Türk Zooloji Dergisi**, **25**: 395-402.
- Kılıç, A.Y., 2001b. The Tabanidae (Diptera) Fauna of Çanakkale Province. **Türk Zooloji Dergisi**, **25**: 403-411.
- Kılıç, A.Y., 2001c. The Tabanidae (Diptera) Fauna of Kütahya Province of Turkey. **J. Ent. Res. Soc.**, **3** (3): 29-41.
- Kröber, O., 1921. Die Palearktischen Arten der Gattung **Pangonia** Latr. Versuch einer Auseinandersetzung. **Arch. Natg. Berlin**, **87**: 1-67.
- Leclercq, M., 1966a. Revision systematique et biogeographique des Tabanidae (Diptera) Palearctiques, Tabaninae. **Mem. Ins. Roy. Sci. Nat. Belg.**, **II** (79): 1-236.
- Leclercq, M., 1966b. Tabanidae (Diptera) de Turquie diagnosis D'**Atylotus hendrixii**, **Haematopota coolsi**, **Haematopota delozi** n. spp. **Bull. Rech. Agron. Gembloux**, **1** (3): 463-477.
- Leclercq, M., 1967a. Tabanidae (Diptera) de Turquie, II. Diagnosis D'**Hybomitra okayi**, **Atylotus hendrixii**, et **Haematopota hennauxi** n. spp. **Bull. Rech. Agron. Gembloux**, **2** (1): 106-127.
- Leclercq, M., 1967b. Tabanidae (Diptera) de Turquie III. **Bull. Rech. Agron. Gembloux**, **2**(4): 707-710.
- Loew, H., 1859. Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren, 6. **Beitrag**, **Berlin**, **Tabanidae**, 23-32.
- Olsufjev, N.G., J. Moucha & M. Chvala, 1967. Zur taxonomie und verbreitung der Europäischen und Kleinasiatischen arten der **Tabanus bovinus** gruppe. **Acta. Soc. Ent. Chechoslov.**, **63**: 303-313.
- Szilady, Z., 1914. Neue oder wenig bekannte Palearktische Tabaniden. **Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest**, **12**: 661-678.
- Szilady, Z., 1923. New on little known horseflies (Tabanidae). **Biol. Hung. Budapest**, **1** (1): 1-39.
- Yağcı, Ş. & Ş. Dinçer, 1996. Türkiye Tabanidae (Diptera) faunası için yeni bir tür **Tabanus caucasicus** Kröber, 1925. **Ank. Üniv. Vet. Fak. Derg.**, **Cilt 43**, Sayı 3 (ayrı basım): 357-359.