

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği ve Nomina Anatomica

Dr. Turan CENGİZ (*)

Anatomik terimlerin standardizasyonu için ilk ajım, çoğurluğunun Alman anatomistlerin teşkil ettiği bir grup tarafından 1895 de atıldı. Bu grubun eseri bugün Basle Nomina Anatomica (B.N.A.) adı altında anılır. 1933 yılında İngiliz ve Alman anatomistleri müşterek B.N.A. yı gözden geçirip geliştirdiler; (Birmingham Revision'u) ve 1936 da Jena Nomina Anatomica (J.N.A.) yı neşrettiler. Aynı senelerde; American Anatomistler cemiyeti de bir nomenclature listesi düzenledi ise de neşredildi.

1936 da Milano'da yapılan 4. internasional anatomistler kongresinde bir internasional nomenclature komitesi kuruldu. Ancak 1939 da ikinci cihan harbinin başlaması ile fazla bir ilerleme gösterilemedi.

1950 de Oxford da toplanan 5. İnternasional Anatomistler kongresinde terminology meselesinin yeniden ele alınmasına karar verildi. Ve daha ziyade büyük lisans gruplarını temsil eden memleketlerin temsilcilerinden kurulu yeni bir nomenclature komitesi teşkil edildi. Bu komite bugün International Anatomical Nomenclature Committee (I. A. N. C.) adı ile bilinen kuruluşun nüvesini teşkil etti.

Bu komite bugün bir ana komite ve sekiz alt komite halinde teş-

(*) Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protez, Maddeler Bilgisi ve Meslek Teknolojisi Kürsüleri Öğretim Görevlisi.

kılâtlanmıştır. Ana komitede Arjantin, Fransa, Japonya, U.S.A., İsviçre, İtalya, Rusya, Almanya, İngiltere temsil edilmektedir. Bu memleketler dışında; İsviçre, İspanya, Hollanda, Brezilya ve Belçika da alt komitelerde vazife almışlardır.

I.A.N.C. 1955 Paris toplantısından sonra Nomina Anatomicayı neşretti. Bu esere B.N.A. dan ve J.N.A. dan ayırmak için P.N.A. adı da verilmektedir.

Nomina Anatomica'nın 22. sayfasında (3. edition) dişler için kabul edinler internasyonal anatomik nomenklâtur kayıtlıdır. Bu kaydı aynen aşağıya alıyoruz.

Dentes

Corona dentis.

Tübercula (coronae) dentis.

Collum dentis.

Radix (Radices) dentis.

Apex radicis dentis.

Facies Masticatoria.

Facies Labialis (Buccalis).

Facies Lingualis.

Facies Contactus..

Facies medialis (dentium incisivorum et caninorum)

Facies Lateralis (dentium incisivorum et caninorum)

Facies Anterior (Dentium premolarium et molarium)

Facies Posterior (Dentium premolarium et molarium)

Cavum Dentis

Pulpa dentis

Papilla dentis

Canalis radicis dentis

Foramen apicis dentis

Dentinum

Enamelum

Cementum

Canaliculi dentales

Spatia interglobularis

Prismata Adamantina

Cuticula Dentis

Periodontium

Arcus dentalis superior

Arcus Dentalis inferior

Dentes incisivi

Dentes Canini

Dentes Premolares

Dentes Molares

 Dens serotinus

Dentes permanentes

Dentes Decidui.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde olduğu gibi, Diş Hekimliği Fakültesinde de anatomik terimler Nomina Anatomica'ya uygun kullanılmaktadır.

Bu durumda bazı meslek tabirlerimizde de Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde değişiklik yapılmak zorunluğu hasıl olmuştur.

Liste incelenirse en büyük değişikliğin evvelce approksimal yüz adı verilen yüzlerin isimlerinde olduğu görülür. Fakültemiz tesisatında ara yüzler için facies contactus (temas yüzleri) terimi yerleşmiştir. Kesiciler ve kaninlerde facies contactus madialis, facies contactus lateralis terimi küçük azılarda ve büyük azılarda facies contactus anterior ve facies contactus posterior terimleri kullanılmaktadır. Tabii böyle birçok tüberkülün fissurun adı da değişmektedir. Meselâ Fakültemiz Protez Propödetiği derslerinde şu şekilde cümleler sık geçer.

— Üst birinci büyük ağız dişi 4 ana tüberküle sahiptir; ikisi buccal tarafta ikisi palatal tarafta bulunan bu 4 tüberkülden buccal olanlar hafifçe **anterioze** olmuşlardır. Böylece posterio buccal tüberkül ile **Anterio-buccal** tüberkül birbirine yaklaşmıştır ve **Anterio-buccal** köşe ile **postero palatal** köşeyi birleştiren köşegen diğerine nazaran daha uzundur. v.s. veya üst 6 nolu dişte buccal yüzün ortasında başlıyan fissur iki buccal tüberkül arasından facies masticatoriaya dahil olur. Bu yüzün ortasına kadar derinleşerek polatal istikâmette yürürl. Buradan bir dik açı teşkil ederek **anteriora** döner.

Bu yeni terimlerin ileride «approximal yüz çürügü» gibi terimleri de «facies contactus çürügü» şeklinde sokacağından şüphe edilemez. Biz talebemize herhangi bir durumda tereddüte düşmemeleri için medial distal gibi eski terimleride öğretiyorsakta derslerimizde yeni terimleri kullanıyor ve kullanıyoruz.

Listede facies labialis ve buccalis tabirleri de kayıtlıdır. Biz bu

tabirlerden birincisini 1,2,3. nolarda ikincisini diğerlerinde kullanıyor ve ters kullanılmamasında titizlik gösteriyoruz.

Facies palatinus ile facies lingualis ise üst ve alt dişlere tahsis edilmiş olmakla bazı Avrupa literatüründe de yapıldığı gibi birbiri yerine veya palatinal yerine lingual tabirinin kullanılmasına müsama-ha etmiyoruz.

Düger bazı terimler ve mesela facies masticatoria, Canaliculi dentales dentes decidui evvelce de meslek literatürümüzde görülmüş ve eş manalı başka kelimelerle beraber kullanılmışlardır. Biz yeni te-rimleri diğerlerine tercihen kullanmaktayız.

N e t i c e :

Diş Hekimliği terminolojisinde uluslararası mesleki kongre-lerde sık sık yeni terim ve deyimlerin ortaya çıktıgı ve terminoloji me-selelerinin milli ve internasyonal kongrelerin birer önemli meselesi olduğu bilinmektedir.

Türk Diş Hekimleri 9. Milli Kongresi arifesinde Türk Diş Hekimliği Fakülteleri arasında ortaya çıkmaya başlamış ve gittikçe de artacak bu ayrılıklara ve meslekte bir momenclature çalışması gereğine dikkat çekmeyi ve kongre organizasyon komitesini uyarmayı vazife bilirim.

S U M M A R Y

Aujourd'hui un differentiation terminologique a commencé entre les facultes dentaires de notre pays. et naturelement cela sera augmenté de jour en jour.

Nous voulons fixer l'attention de la comite d'Organisation du 9 eme congrès national de medicine dentaire Turc, sur ce sujet.

L I T E R A T Ü R

1 — Nomina Anatomica exerpta medica foundation 1963.

2 — Oral Anatomy Sicher 1952