



ARAŞTIRMA MAKALESİ
RESEARCH ARTICLE
CBU-SBED, 2020, 7(3): 310-317

Kemoterapi ve Radyoterapi Alan Kanserli Bireylerde Yorgunluk ve Spiritüel İyilik Hali: Tanımlayıcı-Korelasyonel Bir Çalışma

Fatigue and Spiritual Well-being in Cancer Individuals Receiving Chemotherapy and Radiotherapy: A Descriptive-Correlational Study

Nur İzgü^{1*}, Zehra Gök Metin¹

¹Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
e-posta: akglnur@gmail.com, zehragok85@hotmail.com

ORCID: 0000-0001-6343-5923

ORCID: 0000-0003-0311-9982

*Sorumlu yazar/Corresponding author: Nur İzgü¹

Gönderim tarihi/Received:03.02.2020

Kabul tarihi/Accepted:11.05.2020

DOI:10.34087/cbusbed.684123

Öz

Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, kanserli bireylerde yorgunluk ve spiritüel iyilik hali arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı-korelasyonel tasarımla yürütülen bu araştırmaya 10 Haziran-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında bir kamu üniversitesi hastanesinde kemoterapi ve/veya radyoterapi alan kanserli bireyler (n=129) dahil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Kronik Hastalık Tedavisi Fonksiyonel Değerlendirmesi (FACIT) Yorgunluk Ölçeği ve FACIT Spiritüel İyilik Hali (FACIT-Sp) ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada hem yorgunluk şiddeti hem de spiritüel iyilik hali puan ortancası 34 olarak belirlenmiştir. Erkek, ileri evre kanser tanısına sahip ve komorbid hastalığı bulunan bireylerde yorgunluk şiddeti anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Bireylerin tanımlayıcı özelliklerine göre spiritüel iyilik hali puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). FACIT Yorgunluk Ölçeği ve FACIT-Sp Ölçeği toplam puanları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir (p<0,001).

Sonuç: Araştırmada yorgunluğun cinsiyet, kanser evresi ve komorbid hastalık varlığından etkilendiği, yorgunluk şiddeti azaldıkça spiritüel iyilik halinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle; onkoloji hemşirelerinin kanser ilişkili yorgunluğu değerlendirirken bireylerin spiritüel iyilik hali ve spiritüel bakım gereksinimlerini de göz önünde bulundurmaları, spesifik kanser türü ve evrelerini ele alan ileri prospektif araştırmaların yapılması önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kanser, yorgunluk, spiritüelite, iyilik, hemşirelik.

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate correlation between fatigue and spiritual well-being in individuals with cancer.

Materials and Methods: This descriptive correlational study was conducted in individuals with cancer (n=129) receiving chemotherapy and/or radiotherapy in a public university hospital between 10 June and 25 July 2019. Personal Information Form, Functional Assessment of Cancer Therapy (FACIT) Fatigue Scale and FACIT Spiritual Well-being (FACIT-Sp) Scale were utilized to collect data.

Results: In the study, both fatigue severity and spiritual well-being median scores were calculated as 34. Fatigue severity was significantly higher in male, individuals with advanced-stage cancer and comorbid disease (p<0.05). Spiritual well-being scores did not significantly differ according to descriptive characteristics of the study sample (p>0.05). A positive and weak correlation was found between the FACIT fatigue scale and FACIT-Sp scale scores (p<0.001).

Conclusion: This study concluded that perceived fatigue severity was affected by gender, stage of cancer, and presence of any comorbid disease, and as fatigue severity decreased, spiritel well-being increased. Moving from the study results, oncology nurses are recommended to consider spiritüel well-being and spiritel care needs of individuals

during cancer related fatigue assessment, and further prospective studies addressing specific type and cancer stages are suggested.

Key words: Cancer, fatigue, spirituality, well-being, nursing.

1. Giriş

Kanser ilişkili yorgunluk, kanser tedavisi alan ve tedavi sonrası sağ kalan bireylerde sık görülen ve yaşam

kalitesini olumsuz etkileyen rahatsız edici bir semptomdur. Literatürde kanser ilişkili yorgunluk prevalansının %59-100 olduğu rapor edilmiştir [1]. Kanser ilişkili yorgunluk hastalar tarafından halsizlik, bitkinlik, tükenmişlik, ağırlık hissi, çabuk yorulma, yavaşlama, enerji azlığı ya da yokluğu, uyuşukluk ve dermansızlık gibi kelimelerle tanımlanabilmektedir [2]. Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı tarafından yorgunluk; kanser ya da tedavisine bağlı ortaya çıkan, aktivite ile ilişkisi olmayan ve fonksiyonel durumu olumsuz etkileyen sıkıntı verici ve inatçı bir halsizlik ya da tükenmişlik hissi olarak tanımlanmıştır [3,4]. Kanser ilişkili yorgunluk; çok boyutlu, subjektif ve yönetimi oldukça zor olan bir semptomdur. Literatürde kanser hastalarında görülen yorgunluğun etiolojisinde kanser türü, evresi, tanı süresi, uygulanan kanser tedavileri, ağrı, iştahsızlık, bulantı-kusma, yetersiz beslenme, uyku bozuklukları, anemi, hipoksemi, enfeksiyonlar ve eşlik eden diğer kronik rahatsızlıkların etkili olabileceği bildirilmiştir [3,5]. Ayrıca, kanser tanı bireylerde etkili şekilde yönetilemeyen yorgunluk zamanla genel güçsüzlük, konsantrasyon güçlüğü veya dikkat azalması, günlük yaşam aktivitelerine karşı ilgi ve motivasyonda azalma, uyku sorunları, baş etmede yetersizlik, bitkinlik, hayal kırıklığı ve huzursuzluk gibi duygusal tepkiler, mesleki yaşam, aile ve çevre olan ilişkilerde bozulma, cinsel yaşamda güçlükler fonksiyonel kapasitenin azalmasından dolayı günlük yaşam aktivitelerinde başka kişilere bağımlı olma, anksiyete ve depresyon gibi ek sorunlara yol açarak bireylerin üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyo-ekonomik açıdan pek çok yıkıcı etkiye yol açabilmektedir[6-8]. Kanser ilişkili yorgunluk; duygusal, bilişsel, sosyal ve ekonomik değişikliklere neden olarak bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir [9-11]. Klinik bir araştırmada; yorgunluk yaşadığını belirten kanserli bireylerin yorgunluk nedeniyle günlük rutinlerini değiştirdikleri, uzak mesafe yürüme, merdiven çıkma ve yemek hazırlama gibi günlük aktivitelerini gerçekleştirmede güçlük yaşadıkları bildirilmiştir [9]. Buna ek olarak yorgunluk yaşayan kanserli bireylerde yalnızlık, izolasyon, umutsuzluk ve depresyon gibi psikososyal sorunlar da daha sık görülmekte; arkadaşlarla vakit geçirme, kişilerarası ilişkileri sürdürme gibi sosyal aktiviteler etkilenmekte; dikkati bir konuya yoğunlaştırmada zorlanma ve unutkanlık gibi bilişsel sorunlar görülebilmektedir [9,10]. Kanser tanısı alan bireyler yorgunlukla baş etmede dinlenme ve/veya uyuma, enerji koruma tekniklerini kullanma, semptomu kabullenme veya varlığını inkar etme, egzersiz yapma, ilaç kullanma ve sosyal destek alma gibi baş etme yöntemlerini kullanabilmektedirler [12]. Belirtilen bu

yöntemlere ek olarak kanser tanı bireyler hastalık ve tedaviye bağlı gelişen yorgunluk ve diğer semptomların yönetiminde spiritüel baş etme yöntemlerine de başvurabilmektedirler [13].

Spiritüelite, bireyin kendisi ve diğer insanlarla olan ilişkilerini, evrendeki yerini, yaşamın anlamını bulma ve kabul etme çabası olarak tanımlanmıştır[14]. Varoluşsal ve dini boyutları bulunan spiritüel kavramının varoluşsal boyutunu umut, kendine güven, iç huzur ve yaşamın anlamı gibi kavramlar oluştururken; dini boyutunu ise kutsal ve ebedi olana bağlılık duygusu oluşturmaktadır [14-16]. Literatürde spiritüel inanç ve uygulamaların kanser deneyimi boyunca ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik sorunlarla baş etmeyi güçlendirdiği ve bireylerin spiritüeliteyi bu sorunlarla baş etmede bir yöntem olarak kullandıkları bildirilmiştir [14,17-19]. Yapılan araştırmalar spiritüel iyilik hali yüksek olan kanserli bireylerin anksiyete düzeylerinin daha düşük ve umut duygularının daha güçlü olduğu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını daha iyi benimsedikleri ve yaşam kalitelerinin de daha iyi olduğunu destekler niteliktedir [20,21]. Buna benzer olarak spiritüel iyilik hali arttıkça kanserli bireylerin semptom sıkıntısının hafiflediğini rapor eden araştırmalar da bulunmaktadır [20,22,23].

Yorgunluk semptomu açısından bakıldığında, kanser ilişkili yorgunluk spiritüel iyilik hali penceresinden değerlendirilmemiş olup, yorgunluk şiddeti ile spiritüel iyilik hali arasındaki ilişki yalnızca bir çalışmada ele alınmıştır [24]. Kanser tanı bireylerle çalışan hemşirelerin holistik yaklaşım kullanarak kanser ilişkili semptomları, özellikle yorgunluğu etkili şekilde yönetebilmeleri, hastaların konfor düzeylerini ve yaşam memnuniyetlerini artırabilir [12]. Ayrıca, hemşirelerin kanserli bireylerde yorgunluğu etkileyebilecek durumları ve yorgunluğun bireyler üzerinde oluşturduğu fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri sistematik yolla ele alabilmesi, bireylerin spiritüel iyilik halinin gelişmesine de katkı sağlayabilir [25]. Bu nedenle, kanserli bireylerde en sık görülen semptomlardan biri olan yorgunluğun algılanmasında spiritüel iyilik halinin etkileri incelenmelidir. Bu araştırma, kanserli bireylerde yorgunluk ve spiritüel iyilik hali arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının onkoloji alanında çalışan hemşirelere yorgunluk semptomunu değerlendirirken bireylerin spiritüel iyilik hallerini de göz önünde bulundurmaları ve yorgunluk semptomunu etkileyebilecek spiritüel bakım gereksinimlerini karşılamada rehberlik edeceği düşünülmektedir. Ayrıca, bu araştırmadan elde edilen sonuçlarla kanser ilişkili yorgunluk yönetiminde bireylerin spiritüel bakım gereksinimlerinin ele alınabileceği müdahale araştırmalarına da katkı verilebileceği düşünülmektedir.

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma soruları aşağıda belirtilmiştir:

- Kanserli bireylerde yorgunluk şiddeti ve spiritüel iyilik hali nasıldır?
- Yorgunluk şiddeti ve spiritüel iyilik hali bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre nasıl değişmektedir?
- Yorgunluk ve spiritüel iyilik hali puanları arasında bir ilişki var mıdır?

2. Materyal ve Metot

2.1. Araştırmanın Tasarımı

Bu araştırma, kemoterapi ve/veya radyoterapi alan bireylerde kanser ilişkili yorgunluk ve spiritüel iyilik hali arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı-korelasyonel tasarımı yapılmıştır.

2.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Bu araştırma, bir kamu üniversitesi hastanesinin gündüz tedavi ünitesi ve radyasyon onkolojisi polikliniğinde 10 Haziran- 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür.

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini bir kamu üniversitesi hastanesinin gündüz tedavi ünitesi ve radyasyon onkoloji polikliniği'nde ayaktan kemoterapi ve radyoterapi alan kanserli bireyler oluşturmuştur. Araştırmaya 18 yaş üzerinde olan, iletişime engel olacak fiziksel ve/veya mental sağlık sorunu bulunmayan, kanser hastası olduğunu bilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan bireyler dahil edilmiştir. İletişime engel oluşturacak fiziksel ve/veya mental sağlık sorunu bulunan, tanısını bilmeyen ve araştırmaya katılmayı kabul etmeyen bireyler araştırma kapsamına alınmamıştır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış ve belirtilen tarih aralığında gündüz tedavi ünitesinde ve radyasyon onkolojisi polikliniğinde tedavi alan ve araştırma kriterlerine uyan tüm bireyler araştırmaya dahil edilmişlerdir. Veri toplama sürecinde 187 hastaya ulaşılmış; 1 hasta tanısını bilmediği, 3 hasta Türkçe konuşmadığı ve 54 hasta araştırmaya katılmayı kabul etmediği için araştırmaya dahil edilememiştir. Bu nedenle araştırma 129 kişiyle tamamlanmıştır. Araştırmanın gücü, elde edilen veriler üzerinden post-hoc power analiz yapılarak G. Power 3.1. programı ile belirlenmiştir. Kanserli bireylerin FACIT yorgunluk ölçeği puanları ile FACIT-Sp ölçeği puanları arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi kullanılarak, alfa değeri:0,05, etki büyüklüğü:0,5 olarak temel alındığında araştırmanın gücü 0,97 olarak hesaplanmıştır.

2.4. Veri Toplama Araçları

2.4.1. Kişisel Bilgi Formu

Kişisel bilgi formu, araştırmaya dahil edilen bireylerin bazı sosyo-demografik özellikleri ile hastalık ve tedavi sürecine ilişkin özelliklerini tanımlamak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Bu formda sosyo-demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir durumu) ve hastalık ve tedavi süreci özelliklerine ilişkin (kanser türü, kanser evresi, güncel tedavi protokolü, tanı anından beri geçen süre, kronik hastalık varlığı, hemoglobün değeri) toplam 11 soru bulunmaktadır[22-24].

2.4.2. Kronik Hastalık Tedavisi Fonksiyonel Değerlendirmesi Yorgunluk (FACIT-F) Ölçeği

FACIT-F Ölçeği, son bir hafta içerisindeki yorgunluğu subjektif olarak değerlendiren ve 13 ifadeden oluşan bir ölçüm aracıdır. Ölçek, "0=hiç, 1=çok az, 2=biraz, 3=oldukça ve 4=çok fazla" olmak üzere beşli likert derecelendirmesine sahiptir. Ölçeğin 11 maddesi (1-6, 9-13) ters ifade içermektedir. Ölçeğin 7 ve 8. maddeleri ise düz olarak hesaplanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-52 arasında değişmektedir. Ölçek toplam puanının yüksek olması, yorgunluk şiddetinin düşük olduğunu ifade etmektedir. Ölçekten alınan puanın 30 ve altında olması durumunda algılanan yorgunluğun klinik açıdan şiddetli olduğu bildirilmektedir [26]. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik analizi Çınar ve Yava tarafından yapılmış ve Cronbach alfa katsayısı 0,98 olarak bulunmuştur [27]. Bu araştırmada FACIT-F Ölçeği'ne ilişkin Cronbach alfa katsayısı, 0,905 olarak hesaplanmıştır.

2.4.3. Kronik Hastalık Tedavisi Fonksiyonel Değerlendirmesi Spiritüel İyilik Hali (FACIT-Sp) Ölçeği

FACIT-Sp, kronik ve yaşamı tehdit eden bir hastalığı olan bireylerin spiritüel iyilik hallerini değerlendirmek amacıyla, geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır [28]. Ölçek, "0=hiç, 1=çok az, 2=biraz, 3= oldukça ve 4=çok fazla" olmak üzere beşli likert derecelendirmesine sahip 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin "Anlam" alt boyutu (2., 3., 5. ve 8. maddeler), "Barış" alt boyutu (1., 4., 6. ve 7. maddeler) ve "İnanç" alt boyutu (9., 10., 11. ve 12. maddeler) olmak üzere toplam üç alt boyutu bulunmaktadır. FACIT-Sp Ölçeği'nde bireylerin son 7 günü göz önünde bulundurmaları ve ölçek maddelerini buna göre cevaplamaları beklenmektedir. Ölçekte negatif anlam taşıyan 4. ve 8. sorular için ters puanlama yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 0-48 puan arasında değişmekte, ölçekten alınan puanların yüksek olması, bireyin spiritüel iyilik düzeyinin arttığını, alınan puanların düşük olması ise bireyin spiritüel iyilik düzeyinin azaldığını göstermektedir. FACIT-Sp Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlanması Aktürk ve ark. tarafından yapılmış ve Cronbach alfa katsayısı "İnanç" alt boyutu için 0,93, "Anlam" alt boyutu için 0,78, "Barış" alt boyutu için 0,81 ve ölçeğin geneli için 0,87 olarak hesaplanmıştır [29]. Bu araştırmada Cronbach alfa katsayısı "İnanç" alt boyutu için 0,698, "Anlam" alt boyutu için 0,773, "Barış" alt boyutu için 0,800 ve ölçeğin geneli için 0,834 olarak hesaplanmıştır

2.5. Verilerin Toplanması

Araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan bireylerin sözlü ve yazılı onamları alındıktan sonra Kişisel Bilgi Formu, ardından FACIT yorgunluk ve FACIT-Sp ölçekleri araştırmacılar tarafından yüz-yüze görüşme tekniği kullanılarak doldurulmuş ve her bir hasta için veri toplama süreci yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür.

2.6. Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen veriler IBM SPSS istatistik programının 23.0 versiyonu ile analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmede Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren veriler için ortalama ve standart sapma, normal dağılım göstermeyen

veriler için ortanca, 25. ve 75. yüzdeler dilimleri, minimum ve maksimum değerleri kullanılmıştır. Kategorik veriler için ise sayı ve yüzde hesaplamalarından yararlanılmıştır. Yorgunluk ve spiritüel iyilik hali puanlarında örneklemin tanıtıcı özelliklere göre istatistiksel fark olup olmadığını değerlendirmek için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Farkı yaratan grubun belirlenmesi için ileri post-hoc Bonferoni düzeltmeli Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. Yorgunluk ve spiritüel iyilik hali ölçeği toplam puanları arasındaki ilişkiyi incelemek için Spearman Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Tüm istatistiksel hesaplamalarda istatistiksel anlamlılık için $p < 0,05$ değeri temel alınmıştır.

2.7. Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın uygulanabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik kurul izni (Karar no: 2019/13-03)

ve araştırmanın yürütüleceği kurumdan kurum izni alınmıştır. Araştırmaya katılan tüm bireylerin sözlü ve yazılı onamları alınmıştır.

3. Bulgular

3.1. Kanserli Bireylerin Tanıtıcı Özellikleri

Araştırmaya dahil edilen bireylerin yaş ortalaması $56,64 \pm 12,28$ yıl olup, yarısından fazlasını 56 yaş ve üzeri bireyler (%57,4) ve kadınlar (%54,3) oluşturmuştur. Araştırma örnekleminin büyük çoğunluğu evli (%82,2); %37,2'si ilköğretim mezunu olup; %67,7'si gelir durumunu "gelir gidere eşit" olarak tanımlamıştır. Araştırmaya dahil edilen bireylerin kanser tanı süre ortalamasının $12,94 \pm 3,06$ ay olduğu ve bireylerin %69'unun 1-6 ay önce tanı aldığı belirlenmiştir. Araştırmadaki bireylerin %31,8'inin gastrointestinal sistem, %22,5'inin akciğer kanseri, %14,7'sinin jinekolojik kanser ve %12,4'ünün meme kanseri olduğu görülmüştür.

Tablo 1. Tanımlayıcı Özelliklere Göre Ölçek Puanlarının Dağılımı (N=129)

Yaş ^a (56,64±12,28)	N	%	FACIT-F		Test değeri	p	FACIT-Sp		Test değeri	p
			Medyan (25. ve 75. Yüzdeler)				Medyan (25. ve 75. Yüzdeler)			
18-55	55	42,6	36,0 (29,0; 43,0)		^c 1,916	0,569	34,0 (30,0; 38,0)		^c 1,950	0,684
56+	74	57,4	32,0 (24,0; 45,2)				34,0 (24,0; 39,2)			
Cinsiyet										
Kadın	70	54,3	32,0 (24,0; 37,5)		^c 1,515	0,009	34,0 (29,0; 38,0)		^c 1,892	0,412
Erkek	59	45,7	28,0 (37,0; 46,0)				35,0 (30,0;40,0)			
Medeni durum										
Evli	106	82,2	33,0 (24,7; 44,0)		^c 1,125	0,563	34,5 (30,0;39,0)		^c 998,5	0,174
Bekar	23	17,8	35,0 (32,0; 43,0)				32,0 (28,0; 37,0)			
Eğitim durumu										
İlköğretim	48	37,2	30,0 (24,2; 39,7)				32,5 (29,0; 37,7)			
Lise	36	27,9	35,0 (24,2; 44,0)		^d 4,773	0,092	36,5 (30,0; 40,0)		^d 1,489	0,475
Üniversite	45	34,9	37,0 (28,0; 46,5)				34,0 (30,0; 38,5)			
Gelir durumu										
Gelir-giderden az	32	24,8	29,5 (22,2; 41,0)				32,5 (25,0; 38,5)			
Gelir-gidere eşit	86	66,7	36,0 (27,7; 44,0)		^d 3,601	0,165	34,5 (30,0; 39,0)		^d 2,307	0,314
Gelir giderden fazla	11	8,5	35,0 (24,0; 46,0)				30,0 (23,0; 42,0)			
Tanı süresi (ay)^a(12,94±30,60)										
1-6 ay	89	69,0	36,0 (25,0; 45,0)		^c 1,436	0,079	35,0 (30,0; 39,0)		^c 1,412	0,060
≥ 7 ay	40	31,0	31,5 (23,5; 47,0)				32,5 (25,5; 37,0)			
Kanser türü										
GİS	41	31,8	36,0 (25,5; 46,0)				33,0 (29,0; 38,0)			
Akciğer	29	22,5	37,0 (26,0; 47,0)				35,0 (30,0; 40,5)			
Jinekolojik	19	14,7	30,0 (15,0; 36,0)		^d 8,294	0,081	31,0 (28,0; 38,0)		^d 2,685	0,612
Meme	16	12,4	33,5 (26,2; 40,0)				28,7 (35,0; 39,0)			
^b Diğer	24	18,6	32,0 (24,0; 43,7)				35,0 (31,2; 39,7)			
Kanser evresi										
Evre I	13	10,1	37,0 (30,5; 46,0)				34,0 (28,5; 37,5)			
Evre II	35	27,1	37,0 (32,0; 45,0)		^d 14,089	0,003*	37,0 (31,0; 41,0)		^d 5,324	0,150
Evre III	42	32,6	33,5 (25,7; 45,2)				33,0 (29,0; 37,2)			
*Evre IV	39	30,2	28,0 (21,0; 37,0)				33,0 (28,0; 37,0)			
Uygulanan tedavi										
Kemoterapi	99	76,7	32,0 (24,0; 43,0)				34,0 (29,0; 38,0)			
Radyoterapi	10	7,8	36,5 (29,2; 42,0)		^d 5,227	0,073	32,5 (26,2; 35,2)		^d 1,683	0,431
Kombine tedavi	20	15,5	40,0 (32,0; 48,0)				35,0 (30,0; 41,0)			
Kronik hastalık varlığı										
Yok	69	53,5	37,0 (27,0; 46,0)		^c 1,618	0,032	34,0(30,0; 39,5)		^c 1,862	0,325
Var	60	46,5	31,5 (23,2; 42,7)				34,0(29,0; 38,0)			

aOrtalama±Standart sapma, bProstat, larenks, lenfoma, mezotelyoma, testis, yumuşak doku tümörü cMann Whitney U testi kullanılmıştır.

dKruskal Wallis testi kullanılmıştır. *Bonferoni düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanılmıştır

Araştırmaya dahil edilen bireylerin %32,6'sının kanser evresinin evre-3 olduğu belirlenmiştir. Araştırma sırasında bireylerin büyük çoğunluğunun (%76,7) kemoterapi aldığı gözlenmiştir. Bireyler, komorbid hastalık varlığı açısından incelendiğinde, %46,5'inin en az bir kronik hastalığı olduğu bulunmuştur (Tablo 1). Tabloda belirtilmemekle birlikte bireylerin hemogloblin değeri ortalamasının 11,85±1,50 g/dl olduğu hesaplanmıştır.

3.2. FACIT-F ve FACIT-Sp Puanlarının Dağılımı

Her iki ölçekten alınan puan ortancaları incelendiğinde hem FACIT yorgunluk ölçeği hem de FACIT-Sp ölçeği puan ortancalarının 34,0 olduğu belirlenmiştir. FACIT yorgunluk ölçeğinden alınan puanlar 7-52 arasında dağılım gösterirken; FACIT-Sp ölçeğinden alınan puanlar 10-48 arasında dağılmıştır (Tablo 2). FACIT-Sp ölçeği alt boyut puan ortancaları: anlam alt boyutu için 13,0; barış ve inanç alt boyutları için 11,0 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). Tabloda belirtilmemekle birlikte, araştırma örnekleminin %65,1'inde FACIT

yorgunluk ölçeği toplam puanının 30'un üstünde olduğu ve bu bireylerin yorgunluk düzeylerinin şiddetli olmadığı belirlenmiştir.

Bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre ölçek puanlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı değerlendirildiğinde; yaş, medeni durum, eğitim durumu, kanser türü, tanı süresi ve uygulanan tedavi türüne göre yorgunluk şiddeti ve spiritüel iyilik halinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p>0,05$). Cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde, yorgunluk şiddetinin erkeklerde ve kronik hastalığı olan bireylerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$). Buna ek olarak, evre IV kanser tanısı olan bireylerin algıladıkları yorgunluk şiddetinin diğer kanser evrelerine göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur ($p<0,05$). Cinsiyet, kronik hastalık varlığı ve kanser evresi değişkenlerine göre FACIT-Sp ölçeği puanlarındaki değişim incelendiğinde, bu değişkenler açısından ölçek puanlarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (Tablo 1; $p>0,05$).

Tablo 2. FACIT-F ve FACIT-Sp Ölçeklerinin Puan Dağılımı (N=129)

Ölçek	Median	25. yüzdilik	75. yüzdilik	Min-Maks
FACIT Yorgunluk	34,0	25,0	44,0	7,0-52,0
FACIT-Sp	34,0	29,0	39,0	10,0-48,0
Anlam	13,0	11,0	15,0	4,0-16,0
Barış	11,0	8,0	13,0	0,0-16,0
İnanç	11,0	9,0	14,0	2,0-16,0


FACIT-F ve FACIT-Sp Ölçek Puanları Arasındaki Korelasyon

Yorgunluk şiddeti ve spiritüel iyilik hali arasındaki ilişki incelendiğinde, FACIT yorgunluk ölçeği ile FACIT-Sp ölçeğinden alınan puanlar arasında pozitif yönde zayıf bir korelasyon bulunmuş ve spiritüel iyilik hali puanları arttıkça yorgunluk ölçeğinden alınan puanların da artış

gösterdiği belirlenmiştir ($p<0,001$). Ayrıca, FACIT yorgunluk ölçeği ile FACIT-Sp ölçeğinin "anlam" ve "barış" alt boyut puanları arasında da pozitif yönde zayıf bir korelasyon bulunmuştur (Tablo3; $p<0,001$). İki ölçek puanları arasındaki korelasyon grafiği Şekil 1'de gösterilmiştir.

Tablo 3. FACIT-F ve FACIT-Sp Ölçekleri Arasındaki Korelasyon (N=129)

	FACIT-F		FACIT-Sp			
	Total		Anlam	Barış	İnanç	Toplam
FACIT-F	r	1.000				
	p	-				
FACIT-SP						
Anlam	r	0,428	1.000			
	p	<0,001	-			
Barış	r	0,491	0,596	1.000		
	p	<0,001	<0,001	-		
İnanç	r	0,052	0,390	0,289	1.000	
	p	0,578	<0,001	0,001	-	
Toplam	r	0,376	0,794	0,795	0,716	1.000
	p	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	-



Şekil 1. Yorgunluk şiddeti ile spiritüel iyilik hali arasındaki ilişki

*ST: Spiritüel İyilik Hali Ölçeği Toplam Puanı

**YT: Yorgunluk Ölçeği Toplam Puanı

4. Tartışma

Literatürde kanserli bireylerin sıklıkla yakındıkları fiziksel semptomlar arasında yer alan yorgunluğun değerlendirilmesi, yorgunluk yönetiminde bireylerin desteklenmesi ve yorgunlukla baş etmede bireysel baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi onkoloji hemşireliği açısından önemle ele alınması gereken bir konudur. Bu araştırmada, farklı kanser tanılarında sahip, erken veya ileri evrede olan ve farklı tedavi süreçlerinden geçen bireylerin yorgunluk şiddetleri belirlenmiş, yorgunluğu anlamlandırma ve yönetmede bireyler üzerinde olumlu veya olumsuz etki gösterebilen spiritüel iyilik hali de eş zamanlı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda hastaların spiritüel iyilik hali arttıkça yorgunluk şiddetinin azaldığı bulunmuştur.

Bu araştırmada yorgunluk şiddeti puan ortancası 34 olarak belirlenmiştir. Literatürde farklı kanser türü ve evrelerine sahip bireylerle yürütülen başka bir çalışmada yorgunluk şiddeti ortalamasının $36,1 \pm 12,1$ olduğu rapor edilmiştir [30]. Courtier ve ark.'nın [31] radyoterapi alan meme kanserli bireylerde yorgunluğu değerlendirdikleri başka bir çalışmada, yorgunluk puanı ortancası 44 olarak bildirilmiştir. Yukarıda sonuçları bildirilen her iki araştırmada da hastaların yorgunluk şiddetleri FACIT yorgunluk ölçeği ile değerlendirilmiş, hastaların algıladıkları yorgunluk şiddetinin bu araştırma bulguları ile benzerlik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Literatürde kanser tanılı bireylerde yorgunluğun cinsiyet, yaş, kanser türü, kanser evresi, komorbid hastalıklar ve tedavi seçeneklerinden etkilenebileceği bildirilmiştir [32-34]. Bu araştırmada bireylerin tanımlayıcı özelliklerine göre yorgunluk şiddetindeki farklılık incelendiğinde erkek,

hastalığı ileri evrede olan ve komorbid hastalığı bulunan bireylerin daha şiddetli yorgunluk yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Yaş ve kanser türü değişkenleri açısından değerlendirildiğinde ise algılanan yorgunluk şiddetinde herhangi bir fark bulunmamıştır. Lewis ve ark.'nın [24] 200 kanserli bireyle yorgunluğu değerlendirdikleri bir çalışmada, bireylerin kanser türü ve aldıkları tedavi türünün bu araştırmaya benzer şekilde yorgunluk şiddeti üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı bildirilmiştir. Aynı araştırmada bu araştırma bulgularından farklı olarak cinsiyete göre yorgunluk şiddetinde anlamlı bir farklılık olmadığı rapor edilmiştir [24]. Literatürde bu araştırma bulgularından farklı olarak, yaş ve kanser türünün yorgunluk şiddetini etkilediğini bildiren araştırmalar da bulunmaktadır [34,35]. Bu araştırma ve önceki araştırma bulguları arasındaki farklılıkların, örneklem özelliklerinden, yorgunluğun subjektif ve çok boyutlu bir semptom olmasından kaynaklanabileceği öngörülmüştür.

Bu araştırmada incelenen diğer bir parametre ise kanserli bireylerin spiritüel iyilik halleridir. Araştırma kapsamındaki bireylerde spiritüel iyilik hali puan ortancasının 34 olduğu ortaya çıkmıştır. Bai ve ark.'nın [20] Amerika Birleşik Devletleri'nde 52 ileri evre kanser tanılı bireyde spiritüel iyilik halini inceledikleri bir araştırmada; FACIT-SP ölçeği puan ortalaması 36,37 olarak bildirilmiştir [20]. Kandasamy ve ark.'nın [36] Hindistan'da ileri evre kanserli bireylerde gerçekleştirdikleri başka bir araştırmada da bireylerin spiritüel iyilik hali puan ortalaması 24,48 olarak daha düşük düzeyde rapor edilmiştir. Leak ve ark.'nın [22] Afrika kökenli olup Amerika'da yaşayan meme kanserli bireylerde spiritüel iyilik halini inceledikleri başka bir araştırmada da bireylerin spiritüel iyilik hallerinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu araştırma bulgularının Bai ve ark.[20] ile Leak ve ark.'nın [22] araştırma sonuçları ile tutarlı olduğu; Kandasamy ve ark.'nın [36] sonuçlarını doğrulamadığı dikkat çekicidir. Yukarıda belirtilen araştırmalar örneklem özellikleri açısından incelendiğinde; Bai ve ark.'nın [20] kanser evresi, yaş ve cinsiyet açısından araştırma örneklemimize benzer kanserli bireylerle çalıştığı, Kandasamy ve ark.'nın [36] ise araştırmalarını sadece 50 ileri evre hospis hastası ile yürüttükleri görülmüştür. Tüm bu bulgular ele alındığında; araştırma sonuçlarındaki farklılıkların bireylerin yaşadıkları kültürel ortamlar, değer ve inançları, hastalıklarının doğası ve kullandıkları baş etme yöntemleri ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.

Bu araştırmada literatüre katkı sağlayan ve altı çizilmesi gereken bir diğer önemli bulgu ise; kanserli bireylerin yorgunluk şiddeti ile spiritüel iyilik hali arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmada bireylerin yorgunluk şiddetleri ile spiritüel iyilik halleri arasında pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir korelasyon

ortaya çıkmıştır. Kandasamy ve ark.'nın ileri evre kanserli bireylerde anksiyete, depresyon, semptom sıkıntısı, yaşam kalitesi ve spiritüel iyilik hali arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmada da bu çalışmaya benzer şekilde yorgunluk şiddeti ile spiritüel iyilik hali arasında zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bildirilmiştir [36]. Rabow ve Knish'in ayaktan tedavi edilen kanserli bireylerde spiritüel iyilik halini inceledikleri bir diğer çalışmada, bireylerin yorgunluk düzeyi arttıkça spiritüel iyilik hallerinin azaldığı rapor edilmiştir [23]. Lewis ve ark.'nın farklı evre kanser tanısı olan bireylerle yürüttükleri bir çalışmada da bireylerin yorgunluk şiddeti ile spiritüel iyilik halleri arasında negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişki ortaya konmuştur [24]. Bu araştırma ve önceki araştırma bulguları bütüncül olarak yorumlandığında, bireylerin yorgunluk şiddeti arttığında spiritüel iyilik halinin de daha düşük olduğu görülmüştür.

4.1. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışmada kanser türü, evresi, alınan tedavi türü, yaş ve cinsiyet gibi değişkenler gözetilmeksizin karma bir örnekleme yorgunluk ve spiritüel iyilik hali arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu nedenle araştırma sonuçlarının tüm kanserli bireylere genellenemeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca çalışmada bireyler kemoterapi veya radyoterapi seanslarının sayısı gözetilmeksizin bir defaya mahsus değerlendirilmiş, prospektif bir izlem yapılmamıştır.

5. Sonuç

Bu çalışmada bireylerin algıladıkları yorgunluğun genel olarak çok şiddetli olmadığı ve cinsiyet, kanser evresi ve kansere eşlik eden kronik hastalıklardan anlamlı düzeyde etkilendiği sonucuna ulaşılmış, yorgunluk şiddeti azaldıkça spiritüel iyilik halinin arttığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle; onkoloji hemşirelerinin kanser ilişkili yorgunluğu değerlendirirken bireylerin spiritüel iyilik halleri ve spiritüel bakım gereksinimlerini de göz önünde bulundurmaları ve bu gereksinimlere yönelik uygun hemşirelik girişimlerini planlamaları, spesifik kanser türü ve evrelerini de ele alan ileri prospektif araştırmaların yapılması önerilmiştir.

Referanslar

1. Weis, J, Cancer-related fatigue: prevalence, assessment and treatment strategies. *Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research*, 2011, 11(4), 441-6.
2. Karakoç, T, Kanser hastalarında yorgunluk ve hemşirelik bakımı, *Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi*, 2008, 3(8), 99-118.
3. Can, G, Enç, N, Akkaya, S, Onkoloji hemşireliğinde kanıt dayalı semptom yönetimi, *Konsensus*, 2007, 7, 64-6.
4. Sherman, DW, *Palliative care nursing: Quality care to the end of life*: Springer Publishing Company, 2010.
5. Wang, XS, Zhao, F, Fisch, M, O'Mara, AM, Cella, D, Mendoza, TR, Cleeland, CS, Prevalence and characteristics of moderate to severe fatigue: a multicenter study in cancer patients and survivors, *Cancer*, 2014, 120(3), 425-32.
6. Aydın Bektaş H, Akdemir, N, Kanserli bireylerde fonksiyonel durumun Önemi, *Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 2009, 12(3), 54-60.
7. Karakoç, T, Kanser hastalarında yorgunluk ve hemşirelik bakımı, *Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi*, 2008, 3(8), 99-118.

8. Yavuzşen, T, Kömürcü, Ş. Kanser hastalarında halsizlik semptomunun değerlendirilmesi ve birlikte görülen klinik problemler. *Gülhane Tıp Dergisi*, 2008, 50 (2),141-46.
9. Curt, GA, editor Impact of fatigue on quality of life in oncology patients. *Seminars in Hematology*, 2000, Elsevier.
10. Curt, GA, Breitbart, W, Cella, D, Groopman, JE, Horning, SJ, Itri, LM et al. Impact of cancer-related fatigue on the lives of patients: new findings from the Fatigue Coalition, *The Oncologist*, 2000,5(5), 353-60.
11. Charalambous, A, Kouta, C, Cancer related fatigue and quality of life in patients with advanced prostate cancer undergoing chemotherapy, *BioMed Research International*, 2016.
12. Mitchell, SA, Cancer-related fatigue, *Cancer Nursing: Principles and Practice*, 2011, 772-91.
13. Visser, A, Garssen, B, Vingerhoets, A, Spirituality and well-being in cancer patients: a review, *Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, 2010, 19(6), 565-72.
14. Bulkley, J, McMullen, CK, Hombrook, MC, Grant, M, Altschuler, A, Wendel, CS, et al. Spiritual well-being in long-term colorectal cancer survivors with ostomies, *Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, 2013, 22(11), 2513-21.
15. Cotton, SP, Levine, EG, Fitzpatrick, CM, Dold, KH, Targ, E, Exploring the relationships among spiritual well-being, quality of life, and psychological adjustment in women with breast cancer. *Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, 1999, 8(5), 429-38.
16. Vincenzi, BB, Interconnections: Spirituality, spiritual care, and patient-centered care, *Asian Pacific Journal of Oncology Nursing*, 2019, 6(2), 104.
17. Baetz, M, Bowen, R. Chronic pain and fatigue: Associations with religion and spirituality, *Pain Research and Management*, 2008, 13(5), 383-8.
18. Meraviglia, M, editor Effects of spirituality in breast cancer survivors. *Oncology Nursing Forum*, 2006, 33(1), E1-E7.
19. Sousa, FFdPR, Freitas, SMFdM, Farias, AGdS, Cunha, MdCdS, Araújo, MFdM, Veras, VS, Religious/spiritual coping by people with cancer undergoing chemotherapy: Integrative literature review, *SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Alcool e Drogas*, 2017,13(1), 45-51.
20. Bai, M, Lazenby, M, Jeon, S, Dixon, J, McCorkle, R, Exploring the relationship between spiritual well-being and quality of life among patients newly diagnosed with advanced cancer, *Palliative & Supportive Care*, 2015, 13(4), 927-35.
21. Whitford, HS, Olver, IN, Peterson, MJ, Spirituality as a core domain in the assessment of quality of life in oncology, *Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, 2008, 17(11), 1121-8.
22. Leak, A, Hu J, King, CR, Symptom distress, spirituality, and quality of life in African American breast cancer survivors, *Cancer Nursing*, 2008, 31(1), E15-E21.
23. Rabow, MW, Knish, SJ, Spiritual well-being among outpatients with cancer receiving concurrent oncologic and palliative care, *Supportive Care in Cancer*, 2015, 23(4), 919-23.
24. Lewis, S, Salins, N, Rao, MR, Kadam, A, Spiritual well-being and its influence on fatigue in patients undergoing active cancer directed treatment: A correlational study, *Journal of Cancer Research and Therapeutics*, 2014, 10(3), 676-80.
25. Çetinkaya, B, Altundağ, S, Azak, A, Spiritüel bakım ve hemşirelik. *Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 2007, 8(1), 47-50.
26. Tennant, K, Assessment of fatigue in older adults: the FACIT fatigue scale (version 4). *Supportive Care in Cancer*, 2015, 23(5), 1355-64.
27. Cinar, D, Yava, A, Validity and reliability of functional assessment of chronic illness treatment-fatigue scale in Turkish patients with type 2 diabetes. *Endocrinologia Diabetes y Nutrition*, 2018, 65(7), 409-17.
28. Peterman, AH, Fitchett, G, Brady, MJ, Hernandez, L, Cella, D, Measuring spiritual well-being in people with cancer: the functional assessment of chronic illness therapy—Spiritual well-being scale (FACIT-Sp), *Annals of Behavioral Medicine*, 2002, 24(1), 49-58.
29. Aktürk, Ü, Erci, B, Araz M, Functional evaluation of treatment of chronic disease: Validity and reliability of the Turkish version of the spiritual well-being scale, *Palliative & Supportive Care*, 2017, 15(6), 684-92.

30. Butt, Z, Lai, J-s, Rao, D, Heinemann, AW, Bill, A, Cella, D, Measurement of fatigue in cancer, stroke, and HIV using the functional assessment of chronic illness therapy—fatigue (FACIT-F) scale, *Journal of Psychosomatic Research*, 2013, 74(1), 64-8.
31. Courtier, N, Gambling, T, Enright, S, Barrett-Lee, P, Abraham, J, Mason, MD, Psychological and immunological characteristics of fatigued women undergoing radiotherapy for early-stage breast cancer, *Supportive Care in Cancer*, 2013, 21(1), 173-81.
32. Banipal, RPS, Singh, H, Singh, B. Assessment of cancer-related fatigue among cancer patients receiving various therapies: A cross-sectional observational study, *Indian Journal of Palliative Care*, 2017, 23(2), 207-11
33. Mota, DDCdF, Pimenta, CAAdM, Caponero, R, Fatigue in colorectal cancer patients: prevalence and associated factors, *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 2012, 20(3), 495-503.
34. Walsh, D, Donnelly, S, Rybicki, L, The symptoms of advanced cancer: relationship to age, gender, and performance status in 1,000 patients, *Supportive Care in Cancer*, 2000, 8(3), 175-9.
35. Servaes, P, van der Werf, S, Prins, J, Verhagen, S, Bleijenberg, G, Fatigue in disease-free cancer patients compared with fatigue in patients with chronic fatigue syndrome, *Supportive Care in Cancer*, 2001, 9(1), 11-7.
36. Kandasamy, A, Chaturvedi, S, Desai, G, Spirituality, distress, depression, anxiety, and quality of life in patients with advanced cancer, *Indian Journal of Cancer*, 2011, 48(1), 55-9.

<http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/cbusbed> isimli yazarın CBU-SBED başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

