

SERBEST TRANSVERS REKTUS ABDOMİNİS MUSKULOKUTAN (TRAM) FLEP KULLANIMI İLE MASTEKTOMİ İLE AYNI SEANSTA MEME REKONSTRÜKSİYONU

Murat TOPALAN*, Aylin BİLGİN KARABULUT*, Atilla ARINCI*, İsmail ERMİŞ*,
Vagif KALENDEROV*, Metin ERER*

ÖZET

Meme kanserli olgularda mastektomi ile beraber tek seanslı meme rekonstrüksiyonu yapılması hasta ve cerrah açısından büyük avantajlar taşımaktadır. Günümüzde en seçkin yöntem otojen doku kullanılmıştır. Uygun vakalarda transvers rektus abdominis flebinin serbest transferi ile tek seanslı meme rekonstrüksiyonu üstün kozmetik sonuç sağlamaktadır.

Bu çalışmada, meme kanserli bir olguya eksiyonel cerrahi ile beraber aynı seanslı serbest TRAM flebi ile meme rekonstrüksiyonu tamılmaktadır. İyi kozmetik sonuç elde edilmiş fakat hasta tüm adjuvan tedaviye rağmen iki buçuk sene sonra metastatik hastalık nedeniyle kaybedilmiştir. Meme kanseri tedavisinde amaç, maliniteyi elimine ederken yaşam kalitesinin en üst düzeye taşınmasıdır. Günümüzde, bunu en iyi sağlayan yöntem ise TRAM flebinin tek seanslı serbest transferi ile yapılan memenin rekonstrüksiyonudur.

Anahtar Kelimeler: Meme rekonstrüksiyonu, serbest flep, TRAM flebi

SUMMARY

Immediate breast reconstruction with free transvers rectus abdominis musculocutaneous (Tram) Flap Immediate reconstruction of breast following mastectomy is very advantageous both for the patient and the surgeon. Currently the best method of reconstruction is the autogenous tissue and free transfer of the transvers rectus abdominis musculocutaneous (TRAM) flap provides excellent cosmetic results in selected cases.

In this case report, immediate breast reconstruction with free TRAM flap is demonstrated. The aesthetic result has been very good but the patient has died of metastatic disease two years six months following reconstruction. The goal in breast reconstruction is eliminating of the malignancy as well as provision of a better quality of life. This aim can be accomplished by immediate breast reconstruction utilizing TRAM flap as an autogenous free tissue transfer.

Key Words: Breast reconstruction, free flap, TRAM flap

GİRİŞ

1982 yılında Hartrampf ve arkadaşları tarafından transvers rektus abdominis muskulokutan (TRAM) flebinin meme rekonstrüksiyonu için tanımlanmasından sonra, otojen doku ile meme rekonstrüksiyonu popülerize olmuştur⁽⁴⁾. TRAM flap, rektus abdominis kasının periumbilikal perforatörleri yolu ile beslenen alt abdominal deri ve derialtı yağ dokusundan oluşmaktadır. Kasın arteriel beslenmesi superior ve inferior derin epigastrik arterler ile olmaktadır⁽⁸⁾. Boyd, Taylor ve Corlett tarafından yapılan kadavra çal-

ışmalarında rektus abdominis kası ve karın ön duvarının beslenmesi, muskulokutan perforatörlerin anatomik lokalizasyonları, karın duvarı zonlara ayrılarak tüm detayları ile ortaya konulmuştur⁽¹⁾.

Pediküllü TRAM flebi meme rekonstrüksiyonu için superior pediküllü olarak, epigastrika superior arterden beslenecek şekilde planlanır⁽⁵⁾. Son yıllarda TRAM flebinin inferior epigastrik sistem kullanılarak mikrovasküler transferi giderek yaygınlaşmış ve mikrocerrahının rutin kullanımına girmesi ile otojen doku ile meme rekonstrüksiyonunda

elde edilen başarılarla yeni bir döneme girdimiştir.


MATERIAL ve METOD

30 yaşında, sekiz yıl önce tek doğum yapmış, sosyoekonomik düzeyi iyi, yüksek eğitim görmüş, sportmen fizik yapısı ve sosyal yaşıntısına önem veren bayan hasta, son üç ay içerisinde yıkanırken sol meme üst dış kadranda eline gelen kitle nedeniyle başvurdu. Meme cerrahları tarafından yapılan klinik muayenede, memede aynı lokalizasyon-


da çapı yaklaşık 3 cm boyutlarında nodülleri te gösteren kitle ile aynı taraf aksillasında çapı 2 cm den küçük birden fazla mobil aksiller lenfadenopati palpe edildi.

Sol memedeki kitleye eksizyonel biopsi yapıldı (Resim 1). Histopatolojik inceleme sonucunda tümörün multisentrik karakterde invazif duktal karsinom olduğu saptanarak, hastaya total mastektomi (meme ucu, areola, insizyon hattını içeren deri ve tüm meme glandı eksizyonu) ve aksiller disseksiyon ameliyatı planlandı (Resim 2). Ameliyat ön-

Resim 1. Mastektomi öncesi, biopsi yapıldıktan sonraki görünüm



Resim 2. Ameliyat öncesi planlama




cesi hasta ve ailesi ile yapılan görüşmelerde, meme rekonstrüksiyon seçenekleri hasta ile tartışıldı. Eksiyonal cerrahi ve serbest TRAM flep transferi ile sol meme rekonstrüksiyonu aynı seansta yapıldı. Mikroanastomozlar torakodorsal arter ve vene ucuca yapıldı. Ameliyat 4.5 saat sürdü, hastaya transfüzyon gerekmmedi. Ameliyattan bir hafıta sonra hasta komplikasyonsuz taburcu edildi (Resim 3.4).

BULGULAR

Ameliyattan dört hafta sonra yara iyileşmesi tamamlanmış olarak adjuvan terapiye başlandı. Hasta adjuvan tedaviye rağmen iki yıl yedi ay sonra metastatik hastalık nedeniyle kaybedildi. Hastanın yaşıntısı boyunca yapılan yakın takibinde biraz küçük olmakla birlikte, rekonstrüksiyonu yapılan meyeyi ameliyattan itibaren kendi memesi olarak algıladığı, çok memnun olduğu, psikolojik olarak kendini eksik hissetmediği, sosyal ve aile yaşıntısında olumsuz bir etkilenimi olmadığı ve hatta ilk sene içinde bikini giyerek denize girdiği bilinmektedir. Hastanın yaşıntısı süresince, transfer edilen fleple ilgili hiçbir problemi olmadığı gibi regional nüks görülmemiştir.

Resim 4. Postoperatif dördüncü ayda rekonstrüksiyon yapılan memenin görünümü

Resim 3. Serbest TRAM flebi ile rekonstrüksiyon sonrası postoperatorif bir ay sonraki görünüm.



Sonuç olarak hastada bu kısa süre içinde, daha mutlu ve daha kalitesi yüksek bir yaşam elde edilmiştir. Meme başı rekonstrüksiyonu veya diğer memeye ait yapılabilecek sekonder ameliyatların yapı-



ması bu kısa süre içinde mümkün olamamıştır.

TARTIŞMA

Mastektomi sırasında tek seansta meme rekonstrüksiyonu yapılması rekonstrüktif cerrah ve hasta için büyük avantajlar taşımaktadır. Bu avantajlar, azalmış psikososyal morbidite, üstün kozmetik sonuç elde edilmesi, azalmış cerrahi morbidite ve tek hospitalizasyonla daha az maaliyet olarak sayılabilir (2,7).

Adjuvan kemoterapi veya radyoterapinin başlanması ile cerrahi arasında geçen zaman genellikle 14-21 gündür. Hemen meme rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda adjuvan terapi verilmesi ertelenmez, ayrıca kemoterapinin bu hastalarda ilave morbiditeye neden olduğu gösterilememiştir. Radioterapi de meme rekonstrüksiyonu sonrası rahatlıkla uygulanabilir. TRAM flebi radyasyonu iyi tolere eder. Stage I veya II hastalar genellikle aynı seansta meme rekonstrüksiyonunda genellikle 3 seçenek vardır: 1- Doku genişletici ve sonra kalıcı meme implantı yerleştirilmesi, 2- Kombine doku flepleri ve meme implantları, 3- Sadece otojen doku ile rekonstrüksiyon. Bu seçenekler içinde günümüzde en avantajlı ve en seçkin yöntem otojen doku kullanımı ile meme rekonstrüksiyonu yapmaktadır. Otojen doku hastanın kendi parçasıdır, yabancı cisim reaksiyonu ve kapsüler kontraktür oluşmaz. Bu doku içine sünirler rejenerasyonla girer ve daha iyi deri duyusu oluşur, onarılan meme deri ve yağ dokusunda olmuştur, doğal yoğunluktur ve yürüken, koşarken, sırtüstü yatarken gerçek meme gibi davranışır. Otojen doku rekonstrüksiyonu bu nedenle genç, uzun yaşam beklenen hastalarda tercih edilmelidir. Tüm bu özellikleri yanında daha kompleks rekonstrüksiyon olması ve deneyimli cerrah gerektirmesi de dezavantajları olarak bilinmelidir (6).

TRAM flebi otojen meme rekonstrüksiyonu için en iyi seçeneklerden biridir. Pediküllü TRAM flebi uygulamalarında karşılaşılan en önemli sorun parsiyel flap kaybıdır, parsiyel deri kaybı ve yağ nekrozu ile belirgindir, literatürde % 25 oranında bildirilmektedir (9). Bu komplikasyonun superior pedikül ile beslenmeye bağlı olarak kanın alt abdominal deriye ulaşılabilme için çok yol katetmesi, bu seviyede kan akımının ters olması nedeniyle oluştuğu bilinmektedir (1). Flebin dolasımını artırbilmek için bipedikül TRAM flap şeklinde kullanılmıştır. Burada ise daha fazla abdominal duvar feda edildiği için donor alan komplikasyon oranı artmaktadır. Aynı seansta meme rekonstrüksiyonda, parsiyel flap kaybı gibi adjuvant kemoterapinin başlanması geciktiren tüm cerrahi komplikasyonlardan kaçınılmalıdır. Böylece komplike fakat en güvenilir yöntem olarak TRAM flebinin serbest transferi meme rekonstrüksiyonunda tercih edilir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır (9).

Serbest TRAM flepte, derin inferior epigastrik sistem kullanılır, böylece abdominal duvar daha az zarar görürken, flap vaskülarizasyonu maksimum olur. Transfer, aksiller disseksiyon sırasında torakodorsal damarların aksillada ekspozisyonu ile daha kolaylaşır (9).

Genç, ince karılı atletik kadınlar, serbest TRAM flebi için en uygun hasta grubudur. Ayrıca sigara içen, obes olan ve diabetli hastalarda da pediküllü TRAM flebi kullanılması riskli olduğu için serbest TRAM flebi tercih edilmelidir. Serbest TRAM flebi uygulamaları için kontrendikasyonlar ise, fizyolojik olarak yaşlı hastalar, vasospastik hastalıkların varlığı, yetersiz veya uygun olmayan alıcı damarlar, kötü motive hastalar, deneyimsiz mikrocerrahi ekip, normal vasküler anatomiyi bozmuş eski abdominal skarlarının varlığı şeklinde bildirilmiştir (3).

Serbest TRAM flebinin en önemli üstünlüğü yüksek estetik kalitede doğal meme rekons-

träksiyonudur. Meme rekonstrüksiyonu için diğer serbest flep seçenekleri, derin inferior epigastrik arter (DIEA) perforator flebi, superior gluteal serbest flebi, inferior gluteal serbest flebi, Rubens flebi (Derin Circumflex İliak arter Flebi) ve son yıllarda tanımlanan superior gluteal arter perforator flebidir. Bu fleplerin transferi için alıcı damarlar olarak, torakodorsal sistem damarlar veya internal mammarial vasküler sistem kullanılabilir.

Kadın memesi annelik, seksüalite ve kadınlığın potent sembolüdür. Amaç kısa zamanda normal yaşama dönmek ve tedaviyi tamamlamaktır. Aynı seanslı meme rekonstrüksiyonu, psikososyal morbiditeyi azaltır. Gelişmiş ülkelerde mastektomili hastalarının yaklaşık %10 una meme rekonstrüksiyonu yapılmaktadır (7,9). Bizim ülkemizde ise bu oranın sıfıra yakın olduğu düşünülmektedir. Plastik cerrahlar, multidisipliner kanser tedavisindeki yerlerini almalı, tümör cerrahisi öncesi rekonstrüksiyon seçenekleri tüm detayları ile hastalarla tartışılmalıdır. Amacın hastanın bütünlüğünün sağlanması, maliniteyi kontrol ederken yaşam kalitesinin olası en

üst düzeye taşınması olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde bunun en iyi sağlandığı yöntem ise TRAM flebinin tek seanslı serbest transferi ile yapılan meme rekonstrüksiyonudur.

KAYNAKLAR

1. Boyd JB, Taylor I, Corlett R: The vascular territories of the superior epigastric and the deep inferior epigastric systems. *Plast Reconstr Surg* 73:1 (1984).
2. Dean C, Chetty V, Forrest AP: Effects of immediate breast reconstruction on psychosocial morbidity after mastectomy. *Lancet* 1:459 (1983).
3. Grotting JC: Immediate breast reconstruction using the free TRAM flap. *Clin Plast Surg* 21:207 (1994).
4. Hartrampf CR, Scheflin M, Black PW: Breast reconstruction following mastectomy with a transverse abdominal island flap. Anatomical and clinical observations. *Plast Reconstr Surg* 69:216 (1982).
5. Kesim SN, Topalan M, Görgün B: The use of transverse rectus abdominis musculocutaneous (TRAM) flap in chest wall reconstruction (Report of two cases). *Med Bull Istanbul* 24:161 (1991).
6. Kroll SS: Why autologous tissue?. *Clin Plast Surg* 25:135 (1998).
7. Miller MJ: Immediate breast reconstruction. *Clin Plast Surg* 25:145 (1998).
8. Schustermann M.A.: The free tram flap. *Clin Plast Surg* 25:191 (1998).
9. Serafin D: *Atlas of Microsurgical Composite Tissue Transplantation*, WB Saunders Corp, Philadelphia (1996) s.221.