

Düzeltilme

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinin 2018;11(3):355-365'de yayımlanan "Sigara bırakma başarısını etkileyen faktörler" başlıklı araştırma makalesi ile ilgili Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD'dan Prof.Dr. İbrahim Koruk'tan gelen geri bildirim üzerine, makale içinde Tablo 7'de düzeltme yapılmıştır.

Makalenin Bulgular bölümünde sayfa 360'da Tablo 5'de "Sigara bırakma tedavisini tamamlamanın" 6. Ayda sigara bırakmayı artırdığı ve farkında istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir ($p<0.001$). Tablo 7'de altıncı ayda sigara bırakmayı etkileyen faktörler Logistik Regresyon Modeli ile analiz edilmiş ve burada Sigara bırakma tedavisini tamamlamış olmanın

sigara bırakmayı 0.39 kat artırdığı, diğer bir ifadeyle düşürdüğü görülmektedir.

Geri bildirim editör tarafından değerlendirilmiş ve yazara bildirilmiştir. Yazar tarafından Logistik Regresyon analizi yeniden yapılmıştır. Analiz sonrasında Sigara bırakma tedavisini tamamlamış olmanın altıncı ayda sigarayı bırakmayı 2.60 kat artırdığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Tablo 7'de ilgili satırda düzeltme yapılmıştır. Aşağıda yayımlanan ve düzeltme yapılan Tablo 7 görülmektedir. Sayın Prof.Dr. İbrahim Koruk'a bilimsel geri bildirim için teşekkür ederim.

Prof.Dr. C. Tayyar Şaşmaz

Editör

Yayımlanan Tablo 7.

Tablo 7. Altı aylık sigara bırakma başarısını etkileyen faktörlerin lojistik regresyon modeli

	OR	%95 GA	p
Psikiyatrik hastalık olmaması	1.87	0.83-4.24	0.132
Sigara bırakma tedavisini tamamlamış olmak	0.39	0.24-0.62	<0.001
SB sigara bırakma kampanyası ile ilaç almış olmak	0.92	0.48-1.78	0.811
Tedavi			0.100
Vareniklin ve davranışsal eğitim	4.79	1.02-22.45	0.047
Nikotin replasman tedavisi ve davranışsal eğitim	2.05	0.25-16.61	0.500
Bupropion ve davranışsal eğitim	4.40	0.84-23.38	0.079
Davranışsal eğitim	1.00		

OR: odds ratio, GA: güven aralığı, SB: Sağlık Bakanlığı

Düzeltilme yapılan Tablo 7.

Tablo 7. Altı aylık sigara bırakma başarısını etkileyen faktörlerin lojistik regresyon modeli

	OR	%95 GA	p
Psikiyatrik hastalık olmaması	1.87	0.83-4.24	0.132
Sigara bırakma tedavisini tamamlamış olmak	2.60	1.61-4.19	<0.001
SB sigara bırakma kampanyası ile ilaç almış olmak	0.92	0.48-1.78	0.811
Tedavi			0.100
Vareniklin ve davranışsal eğitim	4.79	1.02-22.45	0.047
Nikotin replasman tedavisi ve davranışsal eğitim	2.05	0.25-16.61	0.500
Bupropion ve davranışsal eğitim	4.40	0.84-23.38	0.079
Davranışsal eğitim	1.00		

OR: odds ratio, GA: güven aralığı, SB: Sağlık Bakanlığı